

Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 0 842 945 B1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des  
Hinweises auf die Patenterteilung:  
**19.02.2003 Patentblatt 2003/08**

(51) Int Cl.7: **C07K 5/117, A61K 38/07**

(21) Anmeldenummer: **97119636.5**

(22) Anmeldetag: **10.11.1997**

(54) **Heterocyklen als Inhibitoren der Leukozytenadhäsion und VLA-4-Antagonisten**

Heterocycles as inhibitors of leukocyte adhesion and as antagonists of VLA-4

Hétérocycles à titre d'inhibiteurs d'adhésion des leucocytes et d'antagonistes de VLA-4

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU NL  
PT SE**  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
**SI**

(30) Priorität: **15.11.1996 DE 19647381**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**20.05.1998 Patentblatt 1998/21**

(73) Patentinhaber: **HOECHST  
AKTIENGESELLSCHAFT  
65929 Frankfurt am Main (DE)**

(72) Erfinder:  
• **Stilz, Hans Ulrich, Dr.  
65929 Frankfurt (DE)**  
• **Wehner, Volkmar, Dr.  
97657 Sandberg (DE)**  
• **Hüls, Christoph, Dr.  
55263 Wackernheim (DE)**  
• **Seiffge, Dirk, Dr.  
55246 Mainz-Kostheim (DE)**

(56) Entgegenhaltungen:  
**EP-A- 0 580 008 WO-A-95/14008**  
**WO-A-95/15973 WO-A-96/22966**

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

**EP 0 842 945 B1**


## EP 0 842 945 B1

## Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Verbindungen der Formel I,

5

10



15

20

25

30

35

40

45

50

55

die Inhibitoren der Adhäsion und Migration von Leukozyten und/oder Antagonisten des zur Gruppe der Integrine gehörenden Adhäsionsrezeptors VLA-4 sind. Die Erfindung betrifft auch Verfahren zur Herstellung, die Verwendung von Verbindungen der Formel I zur Behandlung oder Prophylaxe von Krankheiten, die durch ein unerwünschtes Ausmaß an Leukozytenadhäsion und/oder Leukozytenmigration verursacht werden oder die damit verbunden sind oder bei denen Zell-Zell- oder Zell-Matrix-Interaktionen eine Rolle spielen, die auf Wechselwirkungen von VLA-4-Rezeptoren mit ihren Liganden beruhen, beispielsweise von Entzündungsprozessen, der rheumatoiden Arthritis oder von allergischen Erkrankungen, sowie die Verwendung von Verbindungen der Formel I zur Herstellung von Arzneimitteln zur Anwendung bei solchen Krankheiten und pharmazeutische Zubereitungen, die Verbindungen der Formel I enthalten.

[0002] Die Integrine sind eine Gruppe von Adhäsionsrezeptoren, die bei Zell-Zellbindenden und Zell-Extrazelluläre Matrix-bindenden Prozessen eine wesentliche Rolle spielen. Sie weisen eine  $\alpha\beta$ -heterodimere Struktur auf und zeigen eine weite zelluläre Verbreitung und ein hohes Maß an evolutiver Konservierung. Zu den Integrinen gehört zum Beispiel der Fibrinogen-Rezeptor auf Thrombozyten, der vor allem mit der RGD-Sequenz des Fibrinogens interagiert, oder der Vitronectin-Rezeptor auf Osteoclasten, der vor allem mit der RGD-Sequenz des Vitronectins oder des Osteopontins interagiert. Man teilt die Integrine in drei Großgruppen ein, die  $\beta 2$ -Unterfamilie mit den Vertretern LFA-1, Mac-1 und p150/95, die insbesondere für Zell-Zell-Interaktionen des Immunsystems verantwortlich sind, und die Unterfamilien  $\beta 1$  und  $\beta 3$ , deren Vertreter hauptsächlich die Zellanheftung an Komponenten der extrazellulären Matrix vermitteln (Ruoslahti, Annu. Rev. Biochem. 1988, 57, 375). Die Integrine der  $\beta 1$ -Unterfamilie, auch VLA-Proteine (very late (activation) antigen) genannt, umfassen mindestens sechs Rezeptoren, die spezifisch mit Fibronektin, Kollagen und/oder Laminin als Liganden interagieren. Innerhalb der VLA-Familie ist das Integrin VLA-4 ( $\alpha 4\beta 1$ ) insofern untypisch, als es hauptsächlich auf lymphoide und myeloide Zellen begrenzt ist und bei diesen verantwortlich ist für Zell-Zell-Interaktionen mit einer Vielzahl von anderen Zellen. VLA-4 vermittelt zum Beispiel die Interaktion von T- und B-Lymphozyten mit dem Heparin II-Bindungsfragment von humanem Plasmafibronektin (FN). Die Bindung von VLA-4 mit dem Heparin II-Bindungsfragment des Plasmafibronektins beruht vor allem auf einer Interaktion mit einer LDVP-Sequenz. Im Unterschied zum Fibrinogen- oder Vitronectin-Rezeptor ist VLA-4 kein typisches RGD-bindendes Integrin (Kilger und Holzmann, J. Mol. Meth. 1995, 73, 347).

[0003] Die im Blut zirkulierenden Leukozyten zeigen normalerweise nur eine geringe Affinität zu den vaskulären endothelialen Zellen, die die Blutgefäße auskleiden. Zytokine, die von entzündetem Gewebe abgegeben werden, bewirken die Aktivierung von Endothelzellen und damit die Expression einer Vielzahl von Zelloberflächenantigenen. Diese umfassen zum Beispiel die Adhäsionsmoleküle ELAM-1 (endothelial cell adhesion molecule-1; auch als E-Selektin bezeichnet), das unter anderem Neutrophile bindet, ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1), das mit LFA-1 (leucocyte function-associated antigen 1) auf Leukozyten interagiert, und VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1), das verschiedene Leukozyten, unter anderem Lymphozyten, bindet (Osborn et al., Cell 1989, 59, 1203). VCAM-1 ist, wie ICAM-1, ein Mitglied der Immunglobulin-Gen-Überfamilie. Identifiziert wurde VCAM-1 (zuerst bekannt als INCAM-110) als ein Adhäsionsmolekül, daß auf endothelialen Zellen durch Entzündungs-Zytokine wie TNF und IL-1 und Lipopolysaccharide (LPS) induziert wird. Elices et al. (Cell 1990, 60, 577) zeigten, daß VLA-4 und VCAM-1 ein Rezeptor-Ligand-Paar bilden, das die Anheftung von Lymphozyten an aktiviertes Endothel vermittelt. Die Bindung von VCAM-1 an VLA-4 erfolgt dabei nicht durch eine Interaktion des VLA-4 mit einer RGD-Sequenz, eine solche ist im VCAM-1 nicht enthalten (Bergelson et al., Current Biology 1995, 5, 615). VLA-4 tritt aber auch auf anderen Leukozyten auf, und über den VCAM-1/VLA-4-Adhäsionsmechanismus wird auch die Anheftung von anderen Leukozyten als Lymphozyten vermittelt. VLA-4 repräsentiert somit ein einzelnes Beispiel eines  $\beta 1$ -Integrin-Rezeptors, der über die Liganden VCAM-1 bzw. Fibronektin sowohl bei Zell-Zell-Interaktionen als auch bei Zell-Extrazellulärer Matrix-Interaktionen eine wesentliche Rolle spielt.

[0004] Die Zytokin-induzierten Adhäsionsmoleküle spielen eine wichtige Rolle bei der Rekrutierung von Leukozyten in extravaskuläre Gewebereiche. Leukozyten werden in entzündliche Gewebereiche durch Zelladhäsionsmoleküle rekrutiert, die auf der Oberfläche von endothelialen Zellen exprimiert werden und als Liganden für Leukozyten-

## EP 0 842 945 B1

- Zelloberflächen-Proteine oder -Proteinkomplexe (Rezeptoren) dienen (die Begriffe Ligand und Rezeptor können auch vice versa verwendet werden). Leukozyten aus dem Blut müssen zunächst an endotheliale Zellen anheften, bevor sie in das Synovium auswandern können. Da VCAM-1 an Zellen bindet, die das Integrin VLA-4 ( $\alpha 4\beta 1$ ) tragen, wie Eosinophile, T- und B-Lymphozyten, Monozyten oder auch Neutrophile, kommt ihm und dem VCAM-1/VLA-4-Mechanismus die Funktion zu, derartige Zellen aus dem Blutstrom in Infektionsgebiete und Entzündungsherde zu rekrutieren (Elices et al., Cell 1990, 60, 577; Osborn, Cell 1990, 62, 3; Issekutz et al., J. Exp. Med. 1996, 183, 2175).
- [0005]** Der VCAM-1/VLA-4-Adhäsionsmechanismus wurde mit einer Reihe von physiologischen und pathologischen Prozessen in Verbindung gebracht. VCAM-1 wird außer von Zytokin-induziertem Endothel unter anderem noch von den folgenden Zellen exprimiert: Myoblasten, lymphoiden dendritischen Zellen und Gewebsmakrophagen, rheumatoidem Synovium, Zytokin-stimulierten Neuralzellen, parietalen Epithelzellen der Bowmans Kapsel, dem renalen Tubulärepihel, entzündetem Gewebe bei Herz- und Nieren-Transplantat-Abstoßung und von Intestinalgewebe bei Graft versus host-Krankheit. VCAM-1 findet man auch exprimiert auf solchen Gewebearealen des arteriellen Endotheliums, die frühen arteriosklerotischen Plaques eines Kaninchenmodells entsprechen. Zusätzlich wird VCAM-1 auf follikulären dendritischen Zellen von humanen Lymphknoten exprimiert und findet sich auf Stromazellen des Knochenmarks, zum Beispiel in der Maus. Letzterer Befund weist auf eine Funktion von VCAM-1 in der B-Zell-Entwicklung hin. VLA-4 wird, außer auf Zellen haematopoetischen Ursprunges, auch zum Beispiel auf Melanoma-Zelllinien gefunden, und der VCAM-1/VLA-4-Adhäsionsmechanismus wird mit der Metastasierung von solchen Tumoren in Verbindung gebracht (Rice et al., Science 1989, 246, 1303).
- [0006]** Die hauptsächliche Form, in der VCAM-1 in vivo auf endothelialen Zellen vorkommt und die die dominante Form in vivo ist, wird als VCAM-7D bezeichnet und trägt sieben Immunglobulin-Domänen. Die Domänen 4, 5 und 6 ähneln in ihren Aminosäuresequenzen den Domänen 1, 2 und 3. Die vierte Domäne ist bei einer weiteren, aus sechs Domänen bestehenden Form, hier als VCAM-6D bezeichnet, durch alternatives Splicing entfernt. Auch VCAM-6D kann VLA-4-exprimierende Zellen binden.
- [0007]** Weitere Angaben zu VLA-4, VCAM-1, Integrinen und Adhäsionsproteinen finden sich zum Beispiel in den Artikeln von Kilger und Holzmann, J. Mol. Meth. 1995, 73, 347; Elices, Cell Adhesion in Human Disease, Wiley, Chichester 1995, S. 79; Kuijpers, Springer Semin. Immunopathol. 1995, 16, 379.
- [0008]** Aufgrund der Rolle des VCAM-1/VLA-4-Mechanismus bei Zelladhäsionsprozessen, die von Bedeutung zum Beispiel bei Infektionen, Entzündungen oder Atherosklerose sind, wurde versucht, durch Eingriffe in diese Adhäsionsprozesse Krankheiten zu bekämpfen, insbesondere zum Beispiel Entzündungen (Osborn et al., Cell 1989, 59, 1203). Eine Methode hierzu ist die Verwendung von monoklonalen Antikörpern, die gegen VLA-4 gerichtet sind. Derartige monoklonale Antikörper (mAK), die als VLA-4-Antagonisten die Interaktion zwischen VCAM-1 und VLA-4 blockieren, sind bekannt. So inhibieren zum Beispiel die anti-VLA-4 mAK HP2/1 und HP1/3 die Anheftung von VLA-4 exprimierenden Ramos-Zellen (B-Zell-ähnlichen Zellen) an humane Nabelschnurendothelzellen und an VCAM-1-transfizierte COS-Zellen.
- [0009]** Ebenso inhibiert der anti-VCAM-1 mAK 4B9 die Adhäsion von Ramos-Zellen, Jurkat-Zellen (T-Zell-ähnlichen Zellen) und HL60-Zellen (Granulozyten-ähnlichen Zellen) an COS-Zellen transfiziert mit genetischen Konstrukten, die veranlassen, daß VCAM-6D und VCAM-7D exprimiert werden. In vitro-Daten mit Antikörpern, die gegen die  $\alpha 4$ -Untereinheit von VLA-4 gerichtet sind, zeigen, daß die Anheftung von Lymphozyten an synoviale Endothelzellen blockiert wird, eine Adhäsion, die bei der rheumatoiden Arthritis eine Rolle spielt (van Dinther-Janssen et al., J. Immunol. 1991, 147, 4207).
- [0010]** In vivo-Versuche haben gezeigt, daß eine experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis durch anti- $\alpha 4$  mAK gehemmt werden kann. Die Wanderung von Leukozyten in einen Entzündungsherd wird ebenfalls durch einen monoklonalen Antikörper gegen die  $\alpha 4$ -Kette von VLA-4 blockiert. Die Beeinflussung des VLA-4-abhängigen Adhäsionsmechanismus mit Antikörpern wurde auch in einem Asthma-Modell untersucht, um die Rolle von VLA-4 bei der Rekrutierung von Leukozyten in entzündetes Lungengewebe zu untersuchen (WO-A-93/13798; EP-A-626 861). Die Gabe von anti-VLA-4-Antikörpern inhibierte die Spätphasenreaktion und die Atemwegsüberreaktion in allergischen Schafen.
- [0011]** Der VLA-4 abhängige Zelladhäsionsmechanismus wurde ebenfalls in einem Primatenmodell der inflammatory bowel disease (IBD) untersucht. In diesem Modell, das der ulcerativen Colitis im Menschen entspricht, ergab die Gabe von anti-VLA-4-Antikörpern eine signifikante Reduktion der akuten Entzündung.
- [0012]** Darüber hinaus konnte gezeigt werden, daß die VLA-4-abhängige Zelladhäsion bei den folgenden klinischen Konditionen einschließlich der folgenden chronischen entzündlichen Prozesse eine Rolle spielt: Rheumatoide Arthritis (Cronstein und Weismann, Arthritis Rheum. 1993, 36, 147; Elices et al., J. Clin. Invest. 1994, 93, 405), Diabetes mellitus (Yang et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1993, 90, 10494), systemischer Lupus erythematosus (Takeuchi et al., J. Clin. Invest. 1993, 92, 3008), Allergien vom verzögerten Typ (Typ IV-Allergie) (Elices et al., Clin. Exp. Rheumatol. 1993, 11, S77), multiple Sklerose (Yednock et al., Nature 1992, 356, 63), Malaria (Ockenhouse et al., J. Exp. Med. 1992, 176, 1183), Arteriosklerose (Obrien et al., J. Clin. Invest. 1993, 92, 945), Transplantation (Isobe et al., Transplantation Proceedings 1994, 26, 867-868), verschiedene Malignitäten, zum Beispiel Melanom (Renkonen et al., Am. J. Pathol. 1992, 140, 763), Lymphom (Freedman et al., Blood 1992, 79, 206) und andere (Albelda et al., J. Cell Biol. 1991, 114, 1059).


## EP 0 842 945 B1

**[0013]** Eine VLA-4-Blockierung durch geeignete Antagonisten bietet danach effektive therapeutische Möglichkeiten, insbesondere zum Beispiel verschiedene entzündliche Konditionen einschließlich Asthma und IBD zu behandeln. Die besondere Relevanz von VLA-4-Antagonisten für die Behandlung der rheumatoiden Arthritis ergibt sich dabei, wie bereits gesagt, aus der Tatsache, daß Leukozyten aus dem Blut zunächst an endotheliale Zellen anheften müssen, ehe sie in das Synovium auswandern können, und daß bei dieser Anheftung der VLA-4-Rezeptor eine Rolle spielt. Darauf, daß durch Entzündungsagenzien auf endothelialen Zellen VCAM-1 induziert wird (Osborn, Cell 1990, 62, 3; Stoolman, Cell 1989, 56, 907), und auf die Rekrutierung verschiedener Leukozyten in Infektionsgebiete und Entzündungsherde wurde bereits oben eingegangen. T-Zellen adherieren dabei an aktiviertes Endothel hauptsächlich über die LFA-1/CAM-1- und VLA-4/CAM-1-Adhäsionsmechanismen (Springer, Cell 1994, 76, 301). Auf den meisten synovialen T-Zellen ist die Bindungskapazität von VLA-4 für VCAM-1 bei der rheumatoiden Arthritis erhöht (Postigo et al., J. Clin. Invest. 1992, 89, 1445). Zusätzlich wurde eine verstärkte Anheftung von synovialen T-Zellen an Fibronectin beobachtet (Laffon et al., J. Clin. Invest. 1991, 88, 546; Morales-Ducret et al., J. Immunol. 1992, 149, 1424). VLA-4 ist also hochreguliert sowohl im Rahmen seiner Expression als auch hinsichtlich seiner Funktion auf T-Lymphozyten der rheumatoiden Synovialmembran. Die Blockierung der Bindung von VLA-4 an seine physiologischen Liganden VCAM-1 und Fibronectin ermöglicht eine effektive Verhinderung oder Linderung von artikulären Entzündungsprozessen. Dies wird auch durch Experimente mit dem Antikörper HP2/1 an Lewis-Ratten mit Adjuvant-Arthritis bestätigt, bei denen eine effektive Krankheitsprävention beobachtet wurde (Barbadillo et al., Springer Semin. Immunopathol. 1995, 16, 427). VLA-4 stellt also ein wichtiges therapeutisches Zielmolekül dar.

**[0014]** Die oben erwähnten VLA-4-Antikörper und der Einsatz von Antikörpern als VLA-4-Antagonisten sind in den Patentanmeldungen WO-A-93/13798, WO-A-93/15764, WO-A-94/16094, WO-A-94/17828 und WO-A-95/19790 beschrieben. In den Patentanmeldungen WO-A-94/15958, WO-A-95/15973, WO-A-96/00581, WO-A-96/06108 und WO-A-96/20216 werden peptidische Verbindungen als VLA-4-Antagonisten beschrieben. Der Einsatz von Antikörpern und peptidischen Verbindungen als Arzneimitteln ist aber mit Nachteilen behaftet, zum Beispiel mangelnder oraler Verfügbarkeit, leichter Abbaubarkeit oder immunogener Wirkung bei längerfristiger Anwendung, und es besteht somit Bedarf nach VLA-4-Antagonisten mit einem günstigen Eigenschaftsprofil für einen Einsatz in der Therapie und Prophylaxe. Bestimmte nicht-peptidische Verbindungen mit VLA-4-inhibitorischer Wirkung sind bereits in der WO-A-96122966 beschrieben.

**[0015]** In der EP-A-580 008 sind Phenylimidazolidin-Derivate und in der WO-A-95/14008 substituierte 5-Ring-Heterocyclusen beschrieben, die am N-terminalen Ende des Moleküls eine Amino-, Amidino- oder Guanidinofunktion aufweisen und die Thrombozytenaggregationshemmende Wirkungen zeigen. In der DE-A-19635522 sind Heterocyclusen beschrieben, die Inhibitoren der Knochenresorption sind. In der WO-A-96/33976 und der DE-A-19515177 werden bestimmte Hydantoinderivate mit einem 4-Cyanophenylrest in der 4-Position der Hydantoinrings beschrieben, die Zwischenprodukte für die Herstellung von Wirkstoffen sind, die in der WO-A-95/14008 beschrieben sind. Pharmakologische Wirkungen dieser Cyanophenylhydantoinderivate werden aber nicht offenbart. Die vorliegende Erfindung betrifft weitere heterocyclische Verbindungen, die VLA-4-Antagonisten und/oder Inhibitoren der Leukozytenadhäsion sind.

**[0016]** Gegenstand der vorliegenden Anmeldung sind Verbindungen der Formel I,



worin

W für  $\text{R}^1\text{-A-C(R}^{13})$  oder  $\text{R}^1\text{-A-CH=C}$  steht;

Y für eine Carbonyl-, Thiocarbonyl- oder Methylengruppe steht;

Z für  $\text{N(R}^0)$ , Sauerstoff, Schwefel oder eine Methylengruppe steht;


A einen zweiwertigen Rest aus der Reihe  $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkylen,  $(\text{C}_3\text{-C}_{12})$ -Cycloalkylen,  $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkylen- $(\text{C}_3\text{-C}_{12})$ -cycloalkyl, Phenylen, Phenylen- $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -alkyl,  $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkylen-phenyl,  $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkylen-phenyl- $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -alkyl, Phenylen- $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ -alkenyl oder einen zweiwertigen Rest eines 5- oder 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Ringes, der 1 oder 2 Stickstoffatome enthalten und ein- oder zweifach durch  $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkyl oder doppelt gebundenen Sauerstoff oder Schwefel substituiert sein kann, bedeutet oder für eine direkte Bindung steht;

B einen zweiwertigen Rest aus der Reihe  $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkylen,  $(\text{C}_2\text{-C}_6)$ -Alkenylen, Phenylen, Phenylen- $(\text{C}_1\text{-C}_3)$ -alkyl,  $(\text{C}_1\text{-C}_3)$ -Alkylen-phenyl bedeutet, wobei der zweiwertige  $(\text{C}_1\text{-C}_6)$ -Alkylen-Rest unsubstituiert oder durch einen

## EP 0 842 945 B1

Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl und im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl substituiert sein kann;

- 5 D für C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>), N(R<sup>3</sup>) oder CH=C(R<sup>3</sup>) steht;  
 E Tetrazolyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), HOS(O)<sub>2</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> oder R<sup>10</sup>CO bedeutet;  
 R Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor ein- oder mehrfach substituiert sein können;  
 10 R<sup>0</sup> für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl,  
 15 CHO, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl-CO, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-CO, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-CO, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-CO, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-S(O)<sub>n</sub>, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-S(O)<sub>n</sub> oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub> steht, wobei n für 1 oder 2 steht;  
 25 R<sup>1</sup> einen der Reste -S-R<sup>21</sup>, -S-S-R<sup>21</sup>, -S(O)-R<sup>22</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -S-OR<sup>21</sup>, -S(O)-OR<sup>21</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -S-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(O)-R<sup>21</sup>, -S-C(O)-OR<sup>22</sup>, -S-C(S)-SR<sup>22</sup>, -S-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(S)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-R<sup>22</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-SR<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
 30 Cyano, Halogen, Nitro oder Methylendioxy bedeutet oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5-bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel



steht, in der

Q<sup>1</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- oder -S- steht;

Q<sup>2</sup> für -S(O)- oder -S(O)<sub>2</sub>- steht;

50 Q<sup>3</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- steht,

wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q<sup>3</sup> stehenden Gruppen -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- oder über ein beliebiges anderes Ring-Kohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;

- 55 R<sup>2</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;

R<sup>3</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenylcarbo-

## EP 0 842 945 B1

- nyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylcarbonyl, Pyridyl, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>15</sup> oder CONHR<sup>15</sup> bedeutet;
- 5 R<sup>4</sup> Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>28</sub>)-Alkyl bedeutet, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe Hydroxy, Hydroxycarbonyl, Aminocarbonyl, Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino-
- carbonyl, Amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, Amino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl-phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonylamino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylphenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonylamino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxycarbonyl, das im Arylrest auch substituiert sein kann, Amino, Mercapto, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxycarbonyl, Het-CO, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, HOS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, Tetra-
- 10 zolyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, Halogen, Nitro, Trifluormethyl und den Rest R<sup>5</sup> substituiert sein kann;
- R<sup>5</sup> gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, einen mono- oder bicyclischen 5- bis 12-gliedrigen heterocyclischen Ring, der aromatisch, teilhydriert oder vollständig hydriert sein kann und der ein, zwei oder drei gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann, einen Rest R<sup>6</sup> oder einen Rest R<sup>6</sup>CO- bedeutet,
- 15 wobei der Aryl- und unabhängig davon der Heterozyklus-Rest ein- oder mehrfach durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino oder Trifluormethyl substituiert sein können;
- R<sup>6</sup> für R<sup>7</sup>R<sup>8</sup>N, R<sup>7</sup>O oder R<sup>7</sup>S steht oder eine Aminosäureseitenkette, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu -NH-CH<sub>2</sub>- reduziert sein kann, sowie deren Ester und Amide bedeutet, wobei anstelle freier funktioneller Gruppen gegebenenfalls Wasserstoff oder Hydroxymethyl stehen kann und/oder wobei freie funktionelle Gruppen durch in der Peptidchemie übliche Schutzgruppen geschützt sein können;
- 20 R<sup>7</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxycarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylcarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylcarbonyl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyloxycarbonyl, wobei die Alkylgruppen gegebenenfalls durch eine Aminogruppe substituiert und/oder wobei die Arylreste ein- oder mehrfach, vorzugsweise einfach, durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino und Trifluormethyl substituiert sein können, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu -NH-CH<sub>2</sub>- reduziert sein kann, bedeutet;
- 30 R<sup>8</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, das im Arylrest auch substituiert sein kann, bedeutet;
- R<sup>9</sup> Wasserstoff, Aminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylaminocarbonyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkylaminocarbonyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;
- 35 R<sup>10</sup> Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, das im Arylrest auch substituiert sein kann, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryloxy, Amino oder Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino bedeutet;
- R<sup>11</sup> für Wasserstoff, R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, H-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO, R<sup>12b</sup>-CS, R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub> oder R<sup>12b</sup>-S(O)<sub>2</sub> steht;
- 40 R<sup>12a</sup> (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder den Rest R<sup>15</sup> bedeutet;
- R<sup>12b</sup> Amino, Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino oder R<sup>12a</sup>-NH bedeutet;
- 45 R<sup>13</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet;
- R<sup>15</sup> für R<sup>16</sup>-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder für R<sup>16</sup> steht;
- R<sup>16</sup> für einen 6- bis 24-gliedrigen bicyclischen oder tricyclischen Rest steht, der gesättigt oder teilweise ungesättigt ist und der auch ein, zwei, drei oder vier gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann und der auch durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Oxo substituiert sein kann;
- 50 R<sup>21</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste R<sup>21</sup> bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;
- 55 R<sup>22</sup> (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-

## EP 0 842 945 B1

- alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste R<sup>22</sup> bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;
- 5 R<sup>28</sup> für einen der Reste R<sup>21</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- oder R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))-steht;
- R<sup>29</sup> für einen der Reste R<sup>22</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- oder R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))-steht;
- 10 Het für den Rest eines über ein Stickstoffatom gebundenen 5- bis 10-gliedrigen, monocyclischen oder polycyclischen Heterocyclus steht, der aromatisch oder teilweise ungesättigt oder gesättigt sein kann und der ein, zwei, drei oder vier gleiche oder verschiedene zusätzliche Ring-Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel enthalten kann und der an Kohlenstoffatomen und an zusätzlichen Ring-Stickstoffatomen gegebenenfalls substituiert sein kann, wobei an zusätzlichen Ring-Stickstoffatomen gleiche oder verschiedene Reste R<sup>h</sup>, R<sup>h</sup>CO oder R<sup>h</sup>O-CO als Substituenten stehen können und R<sup>h</sup> für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl steht;
- 15 b, c, d und f unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen, aber nicht alle gleichzeitig 0 sein können;
- e, g und h unabhängig voneinander für 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 stehen;
- 20 in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze;
- wobei aber, wenn gleichzeitig W für 4-Cyanophenyl-C(R<sup>13</sup>) steht, Y für eine Carbonylgruppe steht, Z für NR<sup>0a</sup> steht, B für eine unsubstituierte Methylengruppe steht, R für R<sup>a</sup> steht, b, c und d für 1 stehen und e, f und g für 0 stehen, dann nicht
- 25 D für C(R<sup>2a</sup>)(R<sup>3a</sup>) stehen kann, wobei
- R<sup>0a</sup>, R<sup>a</sup> und R<sup>2a</sup> unabhängig voneinander für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl stehen und
- 30 R<sup>3a</sup> für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl oder 2-, 3- oder 4-Pyridyl steht.
- [0017] Alkylreste können geradkettig oder verzweigt sein. Dies gilt auch, wenn sie Substituenten tragen oder als Substituenten anderer Reste auftreten, beispielsweise in Alkoxy-, Alkoxycarbonyl- oder Aralkylresten. Entsprechendes gilt für Alkylreste. Beispiele für geeignete (C<sub>1</sub>-C<sub>28</sub>)-Alkylreste sind: Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl, Heptyl, Octyl, Decyl, Undecyl, Dodecyl, Tridecyl, Pentadecyl, Hexadecyl, Heptadecyl, Nonadecyl, Eicosyl, Docosyl, Tricosyl, Pentacosyl, Hexacosyl, Heptacosyl, Octacosyl, Isopropyl, Isobutyl, Isopentyl, Neopentyl, Isohexyl, 3-Methylpentyl, 2,3,5-Trimethylhexyl, sec-Butyl, tert-Butyl, tert-Pentyl. Bevorzugte Alkylreste sind Methyl, Ethyl, Propyl, Isopropyl, Butyl, Isobutyl, sec-Butyl und tert-Butyl. Beispiele für Alkylreste sind Methylen, Ethylen, Tri-, Tetra-, Penta- und Hexamethylen oder durch einen Alkylrest substituiertes Methylen, zum Beispiel Methylen, das durch eine Methylgruppe, eine Ethylgruppe, eine Isopropylgruppe, eine Isobutylgruppe oder eine tert-Butylgruppe substituiert ist.
- 40 [0018] Auch Alkenyl- und Alkenylenrest sowie Alkinylreste können geradkettig oder verzweigt sein. Beispiele für Alkenylreste sind Vinyl, 1-Propenyl, Allyl, Butenyl, 3-Methyl-2-butenyl, für Alkenylenreste Vinylen oder Propenylen, für Alkinylreste Ethinyl, 1-Propinyl oder Propargyl.
- 45 [0019] Cycloalkylreste sind insbesondere Cyclopropyl, Cyclobutyl, Cyclopentyl, Cyclohexyl, Cycloheptyl, Cyclooctyl, Cyclononyl, Cyclodecyl, Cycloundecyl und Cyclododecyl, die aber auch durch beispielsweise durch (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl substituiert sein können. Als Beispiele für substituierte Cycloalkylreste seien 4-Methylcyclohexyl und 2,3-Dimethylcyclopentyl genannt. Analoges gilt für Cycloalkylenreste.
- 50 [0020] Die für R<sup>16</sup> stehenden 6- bis 24-gliedrigen bicyclischen und tricyclischen Reste werden formal durch Abstraktion eines Wasserstoffatoms aus Bicyclen bzw. Tricyclen erhalten. Die zugrunde liegenden Bicyclen und Tricyclen können als Ringglieder nur Kohlenstoffatome enthalten, es kann sich also um Bicycloalkane oder Tricycloalkane handeln, sie können aber auch ein, zwei, drei oder vier gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten, es kann sich also um Aza-, Oxa- und Thiabicyclo- und -tricycloalkane handeln. Sind Heteroatome enthalten, so sind bevorzugt ein oder zwei Heteroatome, insbesondere Stickstoff- oder Sauerstoffatome, enthalten. Die Heteroatome können beliebige Positionen im bi- bzw. tricyclischen Gerüst einnehmen, sie können sich in den Brücken oder im Falle von Stickstoffatomen auch an den Brückenköpfen befinden. Sowohl die Bicyclo- und Tricycloalkane als auch ihre Hetero-Analoga können vollständig gesättigt sein oder eine oder mehrere Doppelbindungen enthalten; bevorzugt enthalten sie eine oder zwei Doppelbindungen oder sind insbesondere vollständig gesättigt.
- 55

## EP 0 842 945 B1

Sowohl die Bicycloaden Tricycloalkane als auch die Hetero-Analoga und sowohl die gesättigten als auch die ungesättigten Vertreter können unsubstituiert sein oder in beliebigen geeigneten Positionen durch eine oder mehrere Oxo-  
gruppen und/oder eine oder mehrere gleiche oder verschiedene (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylgruppen, zum Beispiel Methyloder Iso-  
propylgruppen, bevorzugt Methylgruppen, substituiert sein. Die freie Bindung des bi- oder tricyclischen Restes kann  
sich in einer beliebigen Position des Moleküls befinden, der Rest kann also über ein Brückenkopfatom oder ein Atom  
in einer Brücke gebunden sein. Die freie Bindung kann sich auch in einer beliebigen stereochemischen Position be-  
finden, beispielsweise in einer exo- oder einer endo-Position.

**[0021]** Beispiele für Grundkörper bicyclischer Ringsysteme, von denen sich ein bicyclischer Rest ableiten kann, sind  
das Norbornan (= Bicyclo[2.2.1]heptan), das Bicyclo[2.2.2]octan und das Bicyclo[3.2.1]octan, Beispiele für Heteroato-  
me enthaltende Systeme, ungesättigte oder substituierte Systeme sind das 7-Azabicyclo[2.2.1]heptan, das Bicyclo  
[2.2.2]oct-5-en und der Campher (= 1,7,7-Trimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan).

**[0022]** Beispiele für Systeme, von denen sich ein tricyclischer Rest ableiten kann, sind das Twistan (= Tricyclo  
[4.4.0.0<sup>3,8</sup>]decan), das Adamantan (= Tricyclo[3.3.1.1<sup>3,7</sup>]decan), das Noradamantan (= Tricyclo[3.3.1.0<sup>3,7</sup>]nonan), das  
Tricyclo[2.2.1.0<sup>2,6</sup>]heptan, das Tricyclo[5.3.2.0<sup>4,9</sup>]dodecan, das Tricyclo[5.4.0.0<sup>2,9</sup>]undecan oder das Tricyclo  
[5.5.1.0<sup>3,11</sup>]tridecan.

**[0023]** Bevorzugt leiten sich für R<sup>16</sup> stehende bicyclische oder tricyclische Reste von verbrückten Bicyclen bzw.  
Tricyclen ab, also von Systemen, in denen Ringe zwei oder mehr als zwei Atome gemeinsam haben. Bevorzugt sind  
weiterhin auch bicyclische oder tricyclische Reste mit 6 bis 18 Ringgliedern, besonders bevorzugt solche mit 7 bis 12  
Ringgliedern.

**[0024]** Im einzelnen besonders bevorzugte bi- und tricyclische Reste sind der 2-Norbornylrest, sowohl derjenige mit  
der freien Bindung in der exo-Position als auch derjenige mit der freien Bindung in der endo-Position, der 2-Bicyclo  
[3.2.1]octylrest, der 1-Adamantylrest, der 2-Adamantylrest und der Noradamantylrest, zum Beispiel der 3-Noradaman-  
tylrest. Darüber hinaus bevorzugt sind der 1- und der 2-Adamantylrest.

**[0025]** (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylgruppen sind beispielsweise Phenyl, Naphthyl, Biphenyl, Anthryl oder Fluorenyl, wobei 1-Naph-  
thyl, 2-Naphthyl und insbesondere Phenyl bevorzugt sind. Arylreste, insbesondere Phenylreste, können ein- oder mehr-  
fach, bevorzugt ein-, zwei- oder dreifach, durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, insbe-  
sondere (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, insbesondere (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino, Trifluormethyl, Hydroxy,  
Methylenedioxy, Ethylenedioxy, Cyano, Hydroxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl, Phenyl, Phenoxy,  
Benzyl, Benzyloxy, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-O-, Tetrazolyl substituiert sein. Entsprechendes gilt beispielsweise für  
Reste wie Aralkyl oder Arylcarbonyl. Aralkylreste sind insbesondere Benzyl sowie 1- und 2-Naphthylmethyl, 2-, 3- und  
4-Biphenylmethyl und 9-Fluorenylmethyl, die auch substituiert sein können. Substituierte Aralkylreste sind beispiels-  
weise durch einen oder mehrere (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylreste, insbesondere (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylreste, im Arylteil substituiertes Benzyl  
und Naphthylmethyl, zum Beispiel 2-, 3- und 4-Methylbenzyl, 4-Isobutylbenzyl, 4-tert-Butylbenzyl, 4-Octylbenzyl,  
3,5-Dimethylbenzyl, Pentamethylbenzyl, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- und 8-Methyl-1-naphthylmethyl, 1-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7- und  
8-Methyl-2-naphthylmethyl, durch einen oder mehrere (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxyreste, insbesondere (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxyreste, im  
Arylteil substituiertes Benzyl und Naphthylmethyl, zum Beispiel 4-Methoxybenzyl, 4-Neopentylloxybenzyl, 3,5-Dime-  
thoxybenzyl, 3,4-Methylenedioxybenzyl, 2,3,4-Trimethoxybenzyl, weiter 2-, 3- und 4-Nitrobenzyl, Halobenzyl, zum Bei-  
spiel 2-, 3- und 4-Chlor- und 2-, 3-, und 4-Fluorbenzyl, 3,4-Dichlorbenzyl, Pentafluorbenzyl, Trifluormethylbenzyl, zum  
Beispiel 3- und 4-Trifluormethylbenzyl oder 3,5-Bis(trifluormethyl)benzyl. Substituierte Aralkylreste können aber auch  
unterschiedliche Substituenten aufweisen. Beispiele für Pyridyl sind 2-Pyridyl, 3-Pyridyl und 4-Pyridyl.

**[0026]** In monosubstituierten Phenylresten kann sich der Substituent in der 2-, der 3- oder der 4-Position befinden,  
wobei die 3- und die 4-Position bevorzugt sind. Ist Phenyl zweifach substituiert, können die Substituenten in 1,2-, 1,3-  
oder 1,4-Position zueinander stehen. Zweifach substituiertes Phenyl kann also in der 2,3-Position, der 2,4-Position,  
der 2,5-Position, der 2,6-Position, der 3,4-Position oder der 3,5-Position, bezogen auf die Verknüpfungstelle, substi-  
tuiert sein. Bevorzugt sind in zweifach substituierten Phenylresten die beiden Substituenten in der 3-Position und der  
4-Position, bezogen auf die Verknüpfungstelle, angeordnet. In dreifach substituierten Phenylresten können sich die  
Substituenten beispielsweise in der 2,3,4-Position, der 2,3,5-Position, der 2,4,5-Position, der 2,4,6-Position, der  
2,3,6-Position oder der 3,4,5-Position befinden. Entsprechendes gilt für Phenylreste, die zum Beispiel als 1,4-Phe-  
nylen oder als 1,3-Phenyl vorliegen können.

**[0027]** Phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl ist insbesondere Phenylmethyl (-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-CH<sub>2</sub>-) und Phenyläthyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-  
phenyl insbesondere Methylenphenyl (-CH<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>-). Phenyl-(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl ist insbesondere Phenyläthylen und  
Phenylpropenyl.


**[0028]** Heteroaryl steht für einen mono- oder polycyclischen aromatischen Rest mit 5 bis 14 Ringgliedern, der 1 bis  
5 Heteroatome als Ringglieder enthält. Beispiele für Heteroatome sind N, O und S. Sind mehrere Heteroatome ent-  
halten, können diese gleich oder verschieden sein. Heteroarylreste können ebenfalls ein- oder mehrfach, bevorzugt  
ein-, zwei- oder dreifach, durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, insbesondere (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-  
Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, insbesondere (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino, Trifluormethyl, Hydroxy, Methylenedioxy,  
Ethylenedioxy, Cyano, Hydroxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl, Phenyl, Phenoxy, Benzyl, Benzyloxy,






## EP 0 842 945 B1

(R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-O-, Tetrazolyl substituiert sein. Bevorzugt steht Heteroaryl für einen mono- oder bicyclischen aromatischen Rest, der 1, 2, 3, oder 4, insbesondere 1 bis 3, gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe N, O und S enthält und der durch 1, 2, 3 oder 4, insbesondere 1 bis 3, gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkoxy, Fluor, Chlor, Nitro, Amino, Trifluormethyl, Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy-carbonyl, Phenyl, Phenoxy, Benzyloxy und Benzyl substituiert sein kann. Besonders bevorzugt steht Heteroaryl für einen mono- oder bicyclischen aromatischen Rest mit 5 bis 10 Ringgliedern, insbesondere einen 5-bis 6-gliedrigen mono-cyclischen aromatischen Rest, der 1, 2 oder 3, insbesondere 1 oder 2, gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe N, O und S enthält und durch 1 oder 2 gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Phenyl, Phenoxy, Benzyloxy und Benzyl substituiert sein kann.

[0029] Heterocyclische Ringe der Formel



die für die Gruppe R<sup>1</sup> stehen können, können im Ring vollständig gesättigt sein oder eine oder mehrere Doppelbindungen enthalten. Neben den Substituenten in den Gruppen Q<sup>1</sup> und Q<sup>3</sup> können diese heterocyclischen Ringe noch einen oder mehrere weitere, gleiche oder verschiedene Reste R<sup>21</sup> und/oder Halogenatome als Substituenten tragen. Die in der Definition von Q<sup>3</sup> enthaltenen Bedeutungen —C(R<sup>21</sup>)(—)— und —N(—)— sind so zu verstehen, daß zwei der drei freien Bindungen des Kohlenstoffatoms bzw. des Stickstoffatoms zu den benachbarten Ringgliedern gerichtet sind und die dritte freie Bindung zur Gruppe A gerichtet ist, so daß in diesem Fall also der heterocyclische Ring über die Gruppe Q<sup>3</sup> an die Gruppe A gebunden ist. Ist der heterocyclische Ring über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert, so liegt ein kondensiertes Ringsystem vor. Die Anellierung kann über die Gruppe Q<sup>3</sup> und das benachbarte Kohlenstoffatom oder über zwei beliebige benachbarte Kohlenstoffatome erfolgen. Beispiele für derartige kondensierte Ringsysteme sind die Reste



die dann für die Gruppierung R<sup>1</sup>-A in der Formel I stehen.

[0030] Heterocyclen, die für die in der Definition von R<sup>5</sup> aufgeführten mono- oder bicyclischen 5- bis 12-gliedrigen heterocyclischen Ringe stehen, können aromatisch oder teilweise oder vollständig gesättigt sein und können insbesondere an einem Stickstoffatom durch (C<sub>1</sub>-C<sub>7</sub>)-Alkyl, zum Beispiel Methyl oder Ethyl, Phenyl oder Phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, zum Beispiel Benzyl, und/oder an einem oder mehreren Kohlenstoffatomen durch (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Halogen, Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, zum Beispiel Methoxy, Phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkoxy, zum Beispiel Benzyloxy, oder Oxo substituiert sein.

[0031] Beispiele für Heterocyclen, die der Gruppe Heteroaryl oder dem mono- oder bicyclischen 5- bis 12-gliedrigen heterocyclischen Ring zugrunde liegen können, sind Pyrrol, Furan, Thiophen, Imidazol, Pyrazol, Oxazol, Isoxazol, Thiazol, Isothiazol, Tetrazol, Pyridin, Pyrazin, Pyrimidin, Indol, Isoindol, Indazol, Phthalazin, Chinolin, Isochinolin, Chinoxalin, Chinazolin, Cinnolin, β-Carbolin oder benzanellierte, cyclopenta-, cyclohexa- oder cyclohepta-anellierte Derivate dieser Heterocyclen. Stickstoffheterocyclen können auch als N-Oxide vorliegen.

[0032] Reste, die für Heteroaryl oder den Rest eines mono- oder bicyclischen 5- bis 12-gliedrigen heterocyclischen Rings stehen können, sind beispielsweise 2- oder 3-Pyrrolyl, Phenylpyrrolyl, zum Beispiel 4- oder 5-Phenyl-2-pyrrolyl, 2-Furyl, 2-Thienyl, 4-Imidazolyl, Methylimidazolyl, zum Beispiel 1-Methyl-2-, -4- oder -5-imidazolyl, 1,3-Thiazol-2-yl, 2-, 3- oder 4-Pyridyl, 2-, 3- oder 4-Pyridyl-N-oxid, 2-Pyrazinyl, 2-, 4- oder 5-Pyrimidinyl, 2-, 3- oder 5-Indolyl, substituiertes 2-Indolyl, zum Beispiel 1-Methyl-, 5-Methyl-, 5-Methoxy-, 5-Benzyloxy-, 5-Chlor- oder 4,5-Dimethyl-2-indolyl, 1-Benzyl-2- oder -3-indolyl, 4,5,6,7-Tetrahydro-2-indolyl, Cyclohepta[b]-5-pyrrolyl, 2-, 3- oder 4-Chinoly, 1-, 3- oder 4-Isochinoly, 1-Oxo-1,2-dihydro-3-isochinoly, 2-Chinoxaliny, 2-Benzofuranyl, 2-Benzothiényl, 2-Benzoxazolyl oder

## EP 0 842 945 B1

Benzothiazolyl oder, als Reste von teilhydrierten oder vollständig hydrierten heterocyclischen Ringen, beispielsweise auch Dihydropyridinyl, Pyrrolidinyl, zum Beispiel 2- oder 3-(N-Methylpyrrolidinyl), Piperazinyl, Morpholinyl, Thiomorpholinyl, Tetrahydrothienyl, Benzodioxolanyl.

**[0033]** Für den Rest Het stehende heterocyclische Reste können an Kohlenstoffatomen und/oder Ring-Stickstoffatomen unsubstituiert oder einfach oder mehrfach, zum Beispiel zweifach, dreifach, vierfach oder fünffach, durch gleiche oder verschiedene Substituenten substituiert sein. Kohlenstoffatome können zum Beispiel durch (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, insbesondere (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, insbesondere (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino, Trifluormethyl, Hydroxy, Oxo, Methylendioxy, Cyano, Hydroxycarbonyl, Aminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl, Phenyl, Phenoxy, Benzyl, Benzyloxy, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-O-, Tetrazolyl substituiert sein. Schwefelatome können zum Sulfoxid oder zum Sulfon oxidiert sein. Beispiele für den Rest Het sind 1-Pyrrolyl, 1-Imidazolyl, 1-Pyrazolyl, 1-Tetrazolyl, Dihydropyridin-1-yl, Tetrahydropyridin-1-yl, 1-Pyrrolidinyl, 1-Piperidinyl, 1-Piperazinyl, 4-substituiertes 1-Piperazinyl, 4-Morpholinyl, 4-Thiomorpholinyl, 1-Oxo-4-Thiomorpholinyl, 1,1-Dioxo-4-Thiomorpholinyl, Perhydroazepin-1-yl, 2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl, 2,6-Dimethyl-1-piperidinyl, 3,3-Dimethyl-4-morpholinyl, 4-Isopropyl-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperazinyl, 4-Acetyl-1-piperazinyl, 4-Ethoxycarbonyl-1-piperazinyl,

**[0034]** Halogen steht für Fluor, Chlor, Brom oder Iod, insbesondere für Fluor oder Chlor.

**[0035]** Natürliche oder unnatürliche Aminosäuren können in allen stereochemischen Formen vorliegen, falls chiral, beispielsweise in der D- oder L-Form oder in Form einer Mischung von Stereoisomeren, zum Beispiel in Form eines Racemats. Bevorzugt sind α-Aminosäuren und β-Aminosäuren, besonders bevorzugt α-Aminosäuren. Als in Betracht kommende Aminosäuren seien beispielsweise genannt (vgl. Houben-Weyl, Methoden der organischen Chemie, Band 15/1 und 15/2, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1974):

Aad, Abu, yAbu, ABz, 2ABz, eAca, Ach, Acp, Adpd, Ahb, Aib, βAib, Ala, βAla, ΔAla, Alg, All, Ama, Amt, Ape, Apm, Apr, Arg, Asn, Asp, Asu, Aze, Azi, Bai, Bph, Can, Cit, Cys, (Cys)<sub>2</sub>, Cyta, Daad, Dab, Dadd, Dap, Dapm, Dasu, Djen, Dpa, Dtc, Fel, Gln, Glu, Gly, Guv, hAla, hArg, hCys, hGln, hGlu, His, hIle, hLeu, hLys, hMet, hPhe, hPro, hSer, hThr, hTrp, hTyr, Hyl, Hyp, 3Hyp, Ile, Ise, Iva, Kyn, Lant, Lcn, Leu, Lsg, Lys, βLys, ΔLys, Met, Mim, Min, nArg, Nle, Nva, Oly, Orn, Pan, Pec, Pen, Phe, Phg, Pic, Pro, ΔPro, Pse, Pya, Pyr, Pza, Qin, Ros, Sar, Sec, Sem, Ser, Thi, βThi, Thr, Thy, Thx, Tia, Tle, Tly, Trp, Trta, Tyr, Val, tert-Butylglycin (Tbg), Neopentylglycin (Npg), Cyclohexylglycin (Chg), Cyclohexylalanin (Cha), 2-Thienylalanin (Thia), 2,2-Diphenylaminoessigsäure, 2-(p-Tolyl)-2-phenylaminoessigsäure, 2-(p-Chlorphenyl)-aminoessigsäure.







**[0036]** Der Rest einer Aminosäure, Iminosäure oder Azaaminosäure oder eines Dipeptids wird wie in der Peptidchemie üblich aus der entsprechenden Aminosäure, Iminosäure oder Azaaminosäure oder dem Dipeptid erhalten, indem von der N-terminalen Aminogruppe oder von der Iminogruppe formal ein Wasserstoffatom entfernt wird bzw. von der Carbonsäuregruppe formal die Hydroxygruppe entfernt wird. Unter Aminosäureseitenketten werden Seitenketten von natürlichen oder unnatürlichen Aminosäuren verstanden. Azaaminosäuren sind natürliche oder unnatürliche Aminosäuren, in denen eine CH-Einheit durch ein Stickstoffatom ersetzt ist, zum Beispiel in α-Aminosäuren der Zentralbaustein



ersetzt ist.


**[0037]** Als Rest einer Iminosäure kommen insbesondere Reste von Heterocyclen aus der folgenden Gruppe in Betracht: Pyrrolidin-2-carbonsäure; Piperidin-2-carbonsäure; 1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure; Decahydroisochinolin-3-carbonsäure; Octahydroindol-2-carbonsäure; Decahydrochinolin-2-carbonsäure; Octahydrocyclopenta[b]pyrrol-2-carbonsäure; 2-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-carbonsäure; 2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-3-carbonsäure; 2-Azabicyclo[3.1.0]hexan-3-carbonsäure; 2-Azaspiro[4.4]nonan-3-carbonsäure; 2-Azaspiro[4.5]decan-3-carbonsäure; Spiro(bicyclo[2.2.1]heptan)-2,3-pyrrolidin-5-carbonsäure; Spiro(bicyclo[2.2.2]octan)-2,3-pyrrolidin-5-carbonsäure; 2-Azatricyclo[4.3.0.1<sup>6,9</sup>]decan-3-carbonsäure; Decahydrocyclohepta[b]pyrrol-2-carbonsäure; Decahydrocycloocta[c]pyrrol-2-carbonsäure; Octahydrocyclopenta[c]pyrrol-2-carbonsäure; Octahydroisindol-1-carbonsäure; 2,3,3a,4,6a-Hexahydrocyclopenta[b]pyrrol-2-carbonsäure; 2,3,3a,4,5,7a-Hexahydroindol-2-carbonsäure; Tetrahydrothiazol-4-carbonsäure; Isoxazolidin-3-carbonsäure; Pyrazolidin-3-carbonsäure, Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure, die alle gegebenenfalls substituiert sein können (siehe folgende Formeln):

## EP 0 842 945 B1



55

## EP 0 842 945 B1



**[0038]** Die oben genannten Resten zugrundeliegenden Heterocyclen sind beispielsweise bekannt aus US-A-4,344,949; US-A 4,374,847; US-A 4,350,704; EP-A 29,488; EP-A 31,741; EP-A 46,953; EP-A 49,605; EP-A 49,658; EP-A 50,800; EP-A 51,020; EP-A 52,870; EP-A 79,022; EP-A 84,164; EP-A 89,637; EP-A 90,341; EP-A 90,362; EP-A 105,102; EP-A 109,020; EP-A 111,873, EP-A 271,865 und EP-A 344,682.

**[0039]** Dipeptide können als Bausteine natürliche oder unnatürliche Aminosäuren, Iminosäuren sowie Azaaminosäuren enthalten. Ferner können die natürlichen oder unnatürlichen Aminosäuren, Iminosäuren, Azaaminosäuren und Dipeptide auch als Ester bzw. Amide vorliegen, wie zum Beispiel als Methylester, Ethylester, Isopropylester, Isobutylester, tert-Butylester, Benzylester, unsubstituiertes Amid, Ethylamid, Semicarbazid oder  $\omega$ -Amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylamid.

**[0040]** Funktionelle Gruppen der Aminosäuren, Iminosäuren und Dipeptide können geschützt vorliegen. Geeignete Schutzgruppen wie zum Beispiel Urethanschutzgruppen, Carboxylschutzgruppen und Seitenkettenschutzgruppen sind bei Hubbuch, Kontakte (Merck) 1979, Nr. 3, Seiten 14 bis 23, und bei Büllsbach, Kontakte (Merck) 1980, Nr. 1, Seiten 23 bis 35, beschrieben. Insbesondere seien genannt: Alloc, Pyoc, Fmoc, Tcboc, Z, Boc, Ddz, Bpoc, Adoc, Msc, Moc, Z(NO<sub>2</sub>), Z(Hal<sub>n</sub>), Bobz, Iboc, Adpoc, Mboc, Acn, tert-Butyl, OBzl, ONbz, OMBzl, Bzl, Mob, Pic, Trt.

**[0041]** Physiologisch verträgliche Salze der Verbindungen der Formel I sind insbesondere pharmazeutisch verwendbare oder nicht-toxische Salze.

**[0042]** Solche Salze werden beispielsweise von Verbindungen der Formel I, welche saure Gruppen enthalten, zum Beispiel Carbonsäure- oder Sulfonsäure- oder Phosphonsäuregruppen, mit anorganischen Basen, zum Beispiel Alkali- oder Erdalkalimetallverbindungen oder Ammoniak, gebildet. Die Salze der Verbindungen der Formel I können also zum Beispiel Natrium-, Kalium-, Magnesium-, Calcium- oder Ammoniumsalze sein. Ebenso können Salze von Verbindungen der Formel I mit physiologisch verträglichen organischen Basen gebildet werden, zum Beispiel mit physiologisch verträglichen organischen Aminen wie Triethylamin, Ethanolamin oder Tris-(2-hydroxy-ethyl)-amin.

**[0043]** Verbindungen der Formel I, welche basische Gruppen enthalten, zum Beispiel eine Aminogruppe oder eine Guanidinogruppe, bilden mit anorganischen Säuren, wie zum Beispiel Salzsäure, Schwefelsäure oder Phosphorsäure, und mit organischen Carbon- oder Sulfonsäuren, wie zum Beispiel Essigsäure, Citronensäure, Benzoesäure, Maleinsäure, Fumarsäure, Weinsäure, Methansulfonsäure oder p-Toluolsulfonsäure Salze.

**[0044]** Salze können aus den Verbindungen der Formel I nach üblichen, dem Fachmann bekannten Verfahren erhalten werden, beispielsweise durch Vereinigung mit einer organischen oder anorganischen Säure oder Base in einem Lösungsmittel oder Dispergiemittel, oder auch durch Anionenaustausch oder Kationenaustausch aus anderen Salzen.

**[0045]** Die Verbindungen der Formel I können in stereoisomeren Formen vorliegen. Enthalten die Verbindungen der Formel I ein oder mehrere Asymmetriezentren, so können diese unabhängig voneinander die S-Konfiguration oder die R-Konfiguration aufweisen. Zur Erfindung gehören alle möglichen Stereoisomeren, zum Beispiel Enantiomere und Diastereomere, und Mischungen von zwei oder mehr stereoisomeren Formen, zum Beispiel Mischungen von Enantiomeren und/oder Diastereomeren, in allen Verhältnissen. Enantiomere sind also in enantiomerenreiner Form, sowohl als links- als auch als rechtsdrehende Antipoden, in Form von Racematen und in Form von Mischungen der beiden Enantiomeren in allen Verhältnissen Gegenstand der Erfindung. Bei Vorliegen einer cis/trans-Isomerie sind sowohl die cis-Form als auch die trans-Form und Mischungen dieser Formen Gegenstand der Erfindung.

**[0046]** Die erfindungsgemäßen Verbindungen der Formel I können darüber hinaus bewegliche Wasserstoffatome enthalten, also in verschiedenen tautomeren Formen vorliegen. Auch diese alle Tautomeren sind Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Die vorliegende Erfindung umfaßt weiterhin alle Solvate von Verbindungen der Formel I, zum Beispiel Hydrate oder Addukte mit Alkoholen, sowie Derivate der Verbindungen der Formel I, zum Beispiel Ester, Pro-Drugs und Metabolite, die wie die Verbindungen der Formel I wirken.

## EP 0 842 945 B1

**[0047]** Die einzelnen Strukturelemente in der Formel I haben bevorzugt die folgenden Bedeutungen.

**[0048]** W steht bevorzugt für  $R^1-A-C(R^{13})$ .

A steht bevorzugt für Methylen, Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, Cyclohexylen, Phenylen, Methylenphenyl, Methylenphenylmethyl, Phenylenmethyl oder Phenylenethyl.

Y steht bevorzugt für eine Carbonylgruppe.

Z steht bevorzugt für  $N(R^0)$ .

B steht bevorzugt für Methylen, Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Vinylen, Phenylen oder für substituiertes Methylen oder Ethylen. Besonders bevorzugt steht B für einen zweiwertigen Methylenrest oder Ethylenrest (= 1,2-Ethylen) wobei jeder dieser Reste unsubstituiert oder substituiert sein kann und insbesondere substituiert ist. Ganz besonders bevorzugt steht B für einen substituierten oder unsubstituierten Methylenrest, insbesondere für einen substituierten Methylenrest. Ist ein für B stehender zweiwertiger Methylenrest oder Ethylenrest (= 1,2-Ethylen) substituiert, so ist er bevorzugt substituiert durch einen Rest aus der Reihe  $(C_1-C_8)$ -Alkyl,  $(C_2-C_6)$ -Alkenyl,  $(C_2-C_6)$ -Alkynyl,  $(C_3-C_8)$ -Cycloalkyl, insbesondere  $(C_5-C_6)$ -Cycloalkyl,  $(C_3-C_8)$ -Cycloalkyl- $(C_1-C_4)$ -alkyl, insbesondere  $(C_5-C_6)$ -Cycloalkyl- $(C_1-C_4)$ -alkyl, gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{10})$ -Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{10})$ -Aryl- $(C_1-C_4)$ -alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl- $(C_1-C_4)$ -alkyl, und ist er besonders bevorzugt substituiert durch  $(C_1-C_8)$ -Alkyl, also durch einen geradkettigen oder verzweigten Alkylrest mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8 Kohlenstoffatomen.

D steht bevorzugt für  $C(R^2)(R^3)$ .

E steht bevorzugt für  $R^{10}CO$ .

**[0049]** R steht bevorzugt für Wasserstoff,  $(C_1-C_6)$ -Alkyl oder Benzyl, insbesondere Wasserstoff, Methyl oder Ethyl.  $R^0$  steht bevorzugt für  $(C_1-C_6)$ -Alkyl,  $(C_3-C_{12})$ -Cycloalkyl,  $(C_3-C_{12})$ -Cycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl, gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl, besonders bevorzugt für gegebenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl, ganz besonders bevorzugt für im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl- $(C_1-C_4)$ -alkyl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl- $(C_1-C_4)$ -alkyl, darüber hinaus bevorzugt für im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl- $(C_1-C_4)$ -alkyl. Speziell bevorzugt ist es, wenn  $R^0$  für unsubstituiertes oder im Arylrest einfach oder mehrfach substituiertes Biphenylylmethyl, Naphthylmethyl oder Benzyl steht.

$R^1$  steht bevorzugt für einen der Reste  $-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,

$-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,  $-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,

$-O-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,


$-N(R^{29})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-R^{21}$ ,

$-N(R^{28})-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,

$-N(R^{28})-S(O)_2-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)_2-OR^{21}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-OR^{21}$ ,

$-N(R^{28})-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,

$-C(S)-R^{21}$ ,  $-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$  oder Cyano oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel



in der

$Q^1$  für  $-C(R^{21})_2$ ,  $=C(R^{21})$ ,  $-N(R^{28})$ ,  $-O$ - oder  $-S$ - steht;

$Q^2$  für  $-S(O)$ - oder  $-S(O)_2$ - steht;

$Q^3$  für  $-C(R^{21})_2$ ,  $=C(R^{21})$ ,  $-N(R^{28})$ ,  $-O$ -,  $-S$ -,  $-C(R^{21})(-)$ - oder  $-N(-)$ - steht,

wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für  $Q^3$  stehenden Gruppen  $-C(R^{21})(-)$ - oder  $-N(-)$ - oder über ein beliebiges anderes Ringkohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann.

Besonders bevorzugt steht  $R^1$  für einen der Reste  $-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,

$-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{29})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,

$-N(R^{28})-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$  oder Cyano.


**[0050]**  $R^2$  steht bevorzugt für Wasserstoff oder  $(C_1-C_8)$ -Alkyl.

## EP 0 842 945 B1

- R<sup>3</sup> steht bevorzugt für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Pyridyl, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>15</sup> oder CONHR<sup>15</sup>, besonders bevorzugt für gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, R<sup>11</sup>NH, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup> oder CONHR<sup>4</sup>.
- 5 R<sup>4</sup> steht bevorzugt für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, das gegebenenfalls wie in der Definition von R<sup>4</sup> angegeben substituiert sein kann, besonders bevorzugt für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, das durch einen oder zwei der in der Definition von R<sup>4</sup> angegebenen Reste substituiert ist;
- R<sup>11</sup> steht bevorzugt für Wasserstoff, R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, H-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO, R<sup>12b</sup>-CS oder R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub>, besonders bevorzugt für Wasserstoff, R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO, R<sup>12b</sup>-CS oder R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub>, insbesondere für einen
- 10 Rest aus der Reihe Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, R<sup>12c</sup>CO, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-S(O)<sub>2</sub>, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>2</sub>, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> und R<sup>15</sup>, wobei R<sup>c</sup> für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, das im Arylrest auch substituiert sein kann, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryloxy, Amino oder Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino, den Rest R<sup>15</sup> oder den Rest R<sup>15</sup>-O- steht. Ganz besonders
- 15 bevorzugt steht R<sup>11</sup> für R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO, R<sup>12b</sup>-CS oder R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub>, darüber hinaus besonders bevorzugt für R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO oder R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub>.
- R<sup>12a</sup> steht bevorzugt für (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder den Rest R<sup>15</sup>.
- 20 R<sup>12b</sup> steht bevorzugt für R<sup>12a</sup>-NH.
- R<sup>13</sup> steht bevorzugt für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, besonders bevorzugt für Wasserstoff oder insbesondere für (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl oder Benzyl, wobei ein ganz besonders bevorzugter Alkylrest, für den R<sup>13</sup> steht, der Methylrest ist.
- 25 R<sup>15</sup> steht bevorzugt für R<sup>16</sup>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl oder für R<sup>16</sup>, besonders bevorzugt für R<sup>16</sup>-(C<sub>1</sub>)-alkyl oder R<sup>16</sup>. Darüber hinaus bevorzugt steht R<sup>15</sup> dann, wenn R<sup>3</sup> für COOR<sup>15</sup> steht, für den exo-2-Norbornylrest, den endo-2-Norbornylrest oder den Bicyclo[3.2.1]octylrest, und steht R<sup>15</sup> dann, wenn R<sup>3</sup> für CONHR<sup>15</sup> steht, für den exo-2-Norbornylrest, den endo-2-Norbornylrest, den 3-Noradamantylrest und insbesondere den 1-Adamantylrest, den 2-Adamantylrest, den
- 30 1-Adamantylmethylrest oder den 2-Adamantylmethylrest.
- R<sup>16</sup> steht bevorzugt für einen 7- bis 12-gliedrigen verbrückten bicyclischen oder tricyclischen Rest, der gesättigt oder teilweise ungesättigt ist und der auch ein bis vier gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann und der auch durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Oxo substituiert sein kann.
- 35 Het steht bevorzugt für den Rest eines über ein Stickstoffatom gebundenen 5- bis 10-gliedrigen, gesättigten monocyclischen oder polycyclischen Heterocyclus, der ein oder zwei gleiche oder verschiedene zusätzliche Ring-Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel enthalten kann und an Kohlenstoffatomen und an Ring-Stickstoffatomen gegebenenfalls substituiert sein kann, wobei an zusätzlichen Ring-Stickstoffatome gleiche oder verschiedene Reste R<sup>h</sup>, R<sup>h</sup>CO oder R<sup>h</sup>O-CO als Substituenten stehen können. Besonders bevorzugt steht Het für einen derartigen Heterocyclus, der kein zusätzliches Ring-Heteroatom enthält oder der ein zusätzliches Ring-Heteroatom aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthält, ganz besonders bevorzugt steht Het für den Rest eines über ein Stickstoffatom gebundenen 5-, 6- oder 7-gliedrigen, gesättigten monocyclischen Heterocyclus, der kein zusätzliches Ring-Heteroatom enthält oder der ein zusätzliches Ring-Heteroatom aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthält, wobei auch in diesen Fällen der Rest Het unsubstituiert sein kann oder an Kohlenstoffatomen und/
- 40 oder an zusätzlichen Ring-Stickstoffatomen substituiert sein kann.
- 45 b, c und d stehen bevorzugt unabhängig voneinander für 1.
- e, g und h stehen bevorzugt unabhängig voneinander für die Zahlen 0, 1, 2 oder 3.
- [0051]** Bevorzugte Verbindungen der Formel I sind solche, worin gleichzeitig
- 50 W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) oder R<sup>1</sup>-A-CH=C steht;
- Y für eine Carbonyl-, Thiocarbonyl- oder Methylengruppe steht;
- Z für N(R<sup>0</sup>), Sauerstoff, Schwefel oder eine Methylengruppe steht;
- A einen zweiwertigen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkylen, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen-(C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, Phenylen, Phenylen-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen-phenyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen-phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, Phenylen-(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl oder einen zweiwertigen Rest eines 5- oder 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Ringes, der 1 oder 2 Stickstoffatome enthalten und ein- oder zweifach durch (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl oder doppelt gebundenen Sauerstoff oder Schwefel substituiert sein kann, bedeutet oder für eine direkte
- 55 Bindung steht;

## EP 0 842 945 B1

- B einen zweiwertigen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkenyl, Phenyl, Phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-Alkyl-phenyl bedeutet;
- D für C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>), N(R<sup>3</sup>) oder CH=C(R<sup>3</sup>) steht;
- E Tetrazolyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), HOS(O)<sub>2</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> oder R<sup>10</sup>CO bedeutet;
- 5 R und R<sup>0</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeuten, wobei Alkylreste durch Fluor ein- oder mehrfach substituiert sein können;
- 10 R<sup>1</sup> einen der Reste -S-R<sup>21</sup>, -S-S-R<sup>21</sup>, -S(O)-R<sup>22</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -S-OR<sup>21</sup>, -S(O)-OR<sup>21</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -S-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(O)-R<sup>21</sup>, -S-C(O)-OR<sup>22</sup>, -S-C(S)-SR<sup>22</sup>, -S-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(S)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -O-S(O)-R<sup>22</sup>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-SR<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, Cyano, Halogen, Nitro oder Methylendioxy bedeutet oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel



- steht, in der
- Q<sup>1</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- oder -S- steht;
- Q<sup>2</sup> für -S(O)- oder -S(O)<sub>2</sub>- steht;
- 35 Q<sup>3</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- steht, wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q<sup>3</sup> stehenden Gruppen -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- oder über ein beliebiges anderes Ring-Kohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;
- 40 R<sup>2</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;
- R<sup>3</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkynyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkenylcarbonyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkynylcarbonyl, Pyridyl, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>15</sup> oder CONHR<sup>15</sup> bedeutet;
- 45 R<sup>4</sup> Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>28</sub>)-Alkyl bedeutet, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe Hydroxy, Hydroxycarbonyl, Aminocarbonyl, Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-aminocarbonyl, Amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, Amino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl-phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonylamino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxycarbonyl, das im Arylrest auch substituiert sein kann, Amino, Mercapto, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxycarbonyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, HOS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, Tetrazolyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, Halogen, Nitro, Trifluormethyl und den Rest R<sup>5</sup> substituiert sein kann;
- 50 R<sup>5</sup> gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, einen mono- oder bicyclischen 5- bis 12-gliedrigen heterocyclischen Ring, der aromatisch, teilhydriert oder vollständig hydriert sein kann und der ein, zwei oder drei gleiche oder verschiedene

## EP 0 842 945 B1

- Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann, einen Rest R<sup>6</sup> oder einen Rest R<sup>6</sup>CO- bedeutet, wobei der Aryl- und unabhängig davon der Heterozyklus-Rest ein- oder mehrfach durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino oder Trifluormethyl substituiert sein können;
- 5 R<sup>6</sup> für R<sup>7</sup>R<sup>8</sup>N, R<sup>7</sup>O oder R<sup>7</sup>S steht oder eine Aminosäureseitenkette, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu -NH-CH<sub>2</sub>- reduziert sein kann, sowie deren Ester und Amide bedeutet, wobei anstelle freier funktioneller Gruppen gegebenenfalls Wasserstoff oder Hydroxymethyl stehen kann und/oder wobei
- 10 R<sup>7</sup> freie funktionelle Gruppen durch in der Peptidchemie übliche Schutzgruppen geschützt sein können; Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxycarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylcarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylcarbonyl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyloxycarbonyl, wobei die Alkylgruppen gegebenenfalls durch eine Aminogruppe substituiert und/oder wobei die Arylreste ein- oder mehrfach, vorzugsweise einfach, durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe
- 15 (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino und Trifluormethyl substituiert sein können, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu -NH-CH<sub>2</sub>- reduziert sein kann, bedeutet;
- R<sup>8</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, das im Arylrest auch substituiert sein kann, bedeutet;
- 20 R<sup>9</sup> Wasserstoff, Aminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylaminocarbonyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkylaminocarbonyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;
- R<sup>10</sup> Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, das im Arylrest auch substituiert sein kann, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryloxy, Amino oder Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino bedeutet;
- 25 R<sup>11</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, R<sup>12</sup>CO, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-S(O)<sub>2</sub>, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>2</sub>, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> oder den Rest R<sup>15</sup> bedeutet;
- R<sup>12</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, das im Arylrest auch substituiert sein kann, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryloxy, Amino oder Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino, den Rest R<sup>15</sup> oder den Rest R<sup>15</sup>-O- bedeutet;
- 30 R<sup>13</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;
- 35 R<sup>15</sup> für R<sup>16</sup>-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder für R<sup>16</sup> steht;
- R<sup>16</sup> für einen 6- bis 24-gliedrigen bicyclischen oder tricyclischen Rest steht, der gesättigt oder teilweise ungesättigt ist und der auch ein bis vier gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann und der auch durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Oxo substituiert sein kann;
- 40 R<sup>21</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste R<sup>21</sup> bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;
- 45 R<sup>22</sup> (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste R<sup>22</sup> bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;
- 50 R<sup>28</sup> für einen der Reste R<sup>21</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- oder R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))- steht;
- R<sup>29</sup> für einen der Reste R<sup>22</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- oder R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))- steht;
- 55

b, c, d und f unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen, aber nicht alle gleichzeitig 0 sein können;

e, g und h unabhängig voneinander für 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 stehen;

in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträg-



## EP 0 842 945 B1

lichen Salze,

wobei, wenn gleichzeitig W für 4-Cyanophenyl-C(R<sup>13</sup>) steht, Y für eine Carbonylgruppe steht, Z für NR<sup>0a</sup> steht, B für eine unsubstituierte Methylengruppe steht, R für R<sup>a</sup> steht, b, c und d für 1 stehen und e, f und g für 0 stehen, dann nicht D für C(R<sup>2a</sup>)(R<sup>3a</sup>) stehen kann, wobei

R<sup>0a</sup>, R<sup>a</sup> und R<sup>2a</sup> unabhängig voneinander für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl stehen und

R<sup>3a</sup> für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl oder 2-, 3- oder 4-Pyridyl steht.

**[0052]** Besonders bevorzugte Verbindungen der Formel I sind solche, worin gleichzeitig W für R<sup>1</sup>-A-CH=C und darin A für einen Phenylrest oder einen Methylenphenylrest steht oder W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) und darin A für einen zweiwertigen Rest aus der Reihe Methylen, Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, Cyclohexylen, Phenylen, Phenylenmethyl, Methylenphenyl, Methylenphenylmethyl steht;

B für einen zweiwertigen Rest aus der Reihe Methylen, Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Vinylen, Phenylen oder für substituiertes Methylen oder Ethylen steht;

E R<sup>10</sup>CO bedeutet;

R Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl oder Benzyl bedeutet;

R<sup>0</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl steht;

R<sup>1</sup> für einen der Reste -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,


-N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>29</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>,

-N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

-N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>,

-N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

-C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> oder Cyano steht oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel



steht, in der

Q<sup>1</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- oder -S- steht;

Q<sup>2</sup> für -S(O)- oder -S(O)<sub>2</sub>- steht;

Q<sup>3</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- steht,

wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q<sup>3</sup> stehenden Gruppen -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- oder über ein beliebiges anderes Ringkohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;

R<sup>2</sup> für Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl steht;

R<sup>3</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynyl, Pyridyl, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup> und CONHR<sup>15</sup> steht;

und e, g und h unabhängig voneinander für die Zahlen 0, 1, 2 oder 3 stehen;

in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.

**[0053]** Ganz besonders bevorzugt sind Verbindungen der Formel I, worin W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) und R<sup>13</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl steht;


in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.

**[0054]** Eine Reihe speziell bevorzugter Verbindungen der Formel I bilden solche, worin R<sup>3</sup> für gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, für COOR<sup>4</sup>, für R<sup>11</sup>NH oder für CONHR<sup>4</sup> steht, wobei -NHR<sup>4</sup> für den Rest einer α-Aminosäure,

## EP 0 842 945 B1

- für deren  $\omega$ -Amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylamid, für deren (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylester, für deren (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylester oder für deren Derivat steht, in dem die Carbonsäuregruppe in die Gruppe Het-CO überführt ist, in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze. Der für -NHR<sup>4</sup> stehende Rest einer  $\alpha$ -Aminosäure wird formal durch Abstraktion eines Wasserstoffatoms von der Aminogruppe der Aminosäure erhalten. Speziell bevorzugt ist es in dieser Reihe, wenn R<sup>3</sup> für CONHR<sup>4</sup> steht, wobei -NHR<sup>4</sup> für den Rest der  $\alpha$ -Aminosäuren Valin, Lysin, Phenylglycin, Phenylalanin oder Tryptophan oder deren (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylester, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylester oder Het-CO-Derivat steht.
- [0055]** Darüber hinaus bevorzugte Verbindungen der Formel I in dieser Reihe sind solche, worin gleichzeitig
- W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) steht;
- Y für eine Carbonylgruppe steht;
- Z für N(R<sup>0</sup>) steht;
- A für Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, Cyclohexylen, Phenylen, Phenylenmethyl, Methylenphenyl oder Methylenphenylmethyl steht;
- B für einen unsubstituierten oder substituierten Methylenrest steht;
- D für C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>) steht;
- E für R<sup>10</sup>CO steht;
- R für Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, insbesondere Wasserstoff, Methyl oder Ethyl, steht;
- R<sup>0</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl steht;
- R<sup>1</sup> für einen der Reste -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> oder Cyano steht;
- R<sup>2</sup> für Wasserstoff steht;
- R<sup>3</sup> für den Rest CONHR<sup>4</sup> steht;
- R<sup>4</sup> für Methyl steht, das durch Hydroxycarbonyl und einen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Phenyl und Benzyl substituiert ist, oder für Methyl steht, das durch (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxycarbonyl, bevorzugt (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl, und einen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Phenyl und Benzyl substituiert ist, oder für Methyl steht, das durch Het-CO und einen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, Phenyl und Benzyl substituiert ist;
- R<sup>10</sup> für Hydroxy oder (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, bevorzugt (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, steht;
- R<sup>13</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl oder Benzyl, insbesondere Methyl, steht;
- b, c und d für 1 stehen und e, f und g für 0 stehen;
- h für 1 oder 2, bevorzugt für 1, steht;
- in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.
- [0056]** Steht -NHR<sup>4</sup> für einen (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylester einer  $\alpha$ -Aminosäure bzw. enthält R<sup>4</sup> einen Alkoxycarbonylrest, so ist der Methyl-, Ethyl-, Isopropyl-, Isobutyl- oder tert-Butylester bevorzugt, steht -NHR<sup>4</sup> für einen (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylester einer  $\alpha$ -Aminosäure, so ist der Benzylester bevorzugt.
- [0057]** Eine weitere Reihe speziell bevorzugter Verbindungen der Formel I bilden solche, worin gleichzeitig
- W für R<sup>1</sup>-A-CH=C und darin A für einen Phenylenrest oder einen Methylenphenylrest steht oder W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) und darin A für einen zweiwertigen Rest aus der Reihe Methylen, Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, Cyclohexylen, Phenylen, Phenylenmethyl, Methylenphenyl, Methylenphenylmethyl steht;
- B für einen zweiwertigen Rest aus der Reihe Methylen, Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Vinylen, Phenylen oder für substituiertes Methylen oder Ethylen steht;
- E R<sup>10</sup>CO bedeutet;
- R Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl bedeutet;
- R<sup>0</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl steht;
- R<sup>1</sup> für einen der Reste -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> oder Cyano steht oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel

## EP 0 842 945 B1



5

- steht, in der
- 10 Q<sup>1</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- oder -S- steht;  
 Q<sup>2</sup> für -S(O)- oder -S(O)<sub>2</sub>- steht;  
 Q<sup>3</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- steht,  
 wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q<sup>3</sup> stehenden Gruppen -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- oder  
 über ein beliebiges anderes Ringkohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der hetero-  
 15 cyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei  
 benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;  
 R<sup>2</sup> für Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl steht;  
 R<sup>3</sup> für CONHR<sup>15</sup> oder CONHR<sup>4</sup> steht, wobei R<sup>4</sup> hierin für einen unsubstituierten oder durch einen oder mehrere  
 (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylreste substituierten (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylrest steht;  
 20 R<sup>15</sup> für R<sup>16</sup>-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl oder R<sup>16</sup> steht, wobei R<sup>16</sup> für einen 7- bis 12-gliedrigen verbrückten bicyclischen oder tri-  
 cyclischen Rest steht, der gesättigt oder teilweise ungesättigt ist und der auch ein bis vier gleiche oder verschiedene  
 Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann und der auch durch einen oder mehrere  
 gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Oxo substituiert sein kann, und insbesondere  
 R<sup>15</sup> für einen Adamantylrest oder einen Adamantylmethylrest steht;  
 25 und e, g und h unabhängig voneinander für die Zahlen 0, 1, 2 oder 3 stehen und b, c und d für 1 stehen;  
 in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträg-  
 lichen Salze.
- [0058]** Darüber hinaus bevorzugte Verbindungen der Formel I in dieser Reihe sind solche, worin gleichzeitig
- W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) steht;
- 30 Y für eine Carbonylgruppe steht;  
 Z für N(R<sup>0</sup>) steht;  
 A für Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, Cyclohexylen, Phenylen, Phenylenmethyl, Methylenphenyl  
 oder Methylenphenylmethyl steht;  
 B für einen unsubstituierten oder substituierten Methylenrest steht;
- 35 D für C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>) steht;  
 E für R<sup>10</sup>CO steht;  
 R für Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, insbesondere Wasserstoff, Methyl oder Ethyl, steht;  
 R<sup>0</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls  
 substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl steht;
- 40 R<sup>1</sup> für einen der Reste -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)  
 -R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> oder Cyano steht;  
 R<sup>2</sup> für Wasserstoff steht;  
 R<sup>3</sup> für CONHR<sup>15</sup> oder CONHR<sup>4</sup> steht, wobei R<sup>4</sup> hierin für einen unsubstituierten oder durch einen oder mehrere  
 (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Arylreste substituierten (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylrest steht;
- 45 R<sup>10</sup> für Hydroxy oder (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, bevorzugt (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, steht;  
 R<sup>13</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl oder Benzyl, insbesondere Methyl, steht;  
 R<sup>15</sup> für einen Adamantylrest oder einen Adamantylmethylrest steht;  
 b, c und d für 1 stehen und e, f und g für 0 stehen;  
 h für 1 oder 2, bevorzugt für 1, steht;
- 50 in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträg-  
 lichen Salze.
- [0059]** Weiterhin bilden eine Reihe speziell bevorzugter Verbindungen der Formel I solche, in denen gleichzeitig
- W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) steht;
- Y für eine Carbonylgruppe steht;
- 55 Z für N(R<sup>0</sup>) steht;  
 A für Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, Cyclohexylen, Phenylen, Phenylenmethyl, Methylenphenyl,  
 Methylenphenylmethyl steht;  
 B für einen unsubstituierten oder substituierten Methylenrest oder Ethylenrest steht;

## EP 0 842 945 B1

D für C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>) steht;

E für R<sup>10</sup>CO steht;


R für Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, insbesondere Wasserstoff, Methyl oder Ethyl, steht;

R<sup>0</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl steht;

R<sup>1</sup> für einen der Reste -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
-O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
-O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
-N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>,

-N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
-N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>,  
-N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
-C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> oder Cyano steht oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-glied-

rigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel



steht, in der

Q<sup>1</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- oder -S- steht;

Q<sup>2</sup> für -S(O)- oder -S(O)<sub>2</sub>- steht;

Q<sup>3</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- steht,

wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q<sup>3</sup> stehenden Gruppen -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- oder über ein beliebiges anderes Ringkohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;

R<sup>2</sup> für Wasserstoff steht;

R<sup>3</sup> für einen unsubstituierten Phenylrest oder Naphthylrest, einen durch einen, zwei oder drei gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Hydroxy, Halogen, Trifluormethyl, Nitro, Methylendioxy, Ethylendioxy, Hydroxycarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxycarbonyl, Aminocarbonyl, Cyan, Phenyl, Phenoxy und Benzylloxy substituierten Phenylrest oder Naphthylrest, einen Pyridylrest, einen (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylrest, einen (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenylrest, einen (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkynylrest oder einen (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-Cycloalkylrest steht, und insbesondere R<sup>3</sup> für einen unsubstituierten oder substituierten Phenylrest oder Naphthylrest steht;

R<sup>10</sup> für Hydroxy oder (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, insbesondere (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, steht und bevorzugt R<sup>10</sup> für einen Rest aus der Reihe Hydroxy, Methoxy, Ethoxy, Propoxy und Isopropoxy steht;

R<sup>13</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl oder Benzyl, insbesondere Methyl, steht;

b, c und d für 1 stehen und e, f und g für 0 stehen;

h für 1 oder 2, bevorzugt für 1, steht;

in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.

**[0060]** Schließlich bilden eine Reihe speziell bevorzugter Verbindungen der Formel I solche Verbindungen, in denen gleichzeitig

W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) steht;

Y für eine Carbonylgruppe steht;

Z für N(R<sup>0</sup>) steht;

A für Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, Cyclohexylen, Phenylen, Phenylenmethyl, Methylenphenyl, Methylenphenylmethyl steht;

B für einen unsubstituierten oder substituierten Methylenrest oder Ethylenrest steht;

D für C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>) steht;


E für R<sup>10</sup>CO steht;

R für Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, insbesondere Wasserstoff, Methyl oder Ethyl, steht;

R<sup>0</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl steht;

## EP 0 842 945 B1

R<sup>1</sup> für einen der Reste -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
 -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
 -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
 -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>,  
 -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
 -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>,  
 -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
 -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> oder Cyano steht oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-glied-  
 rigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel



steht, in der

Q<sup>1</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- oder -S- steht;

Q<sup>2</sup> für -S(O)- oder -S(O)<sub>2</sub>- steht;

Q<sup>3</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- steht,

wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q<sup>3</sup> stehenden Gruppen -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- oder über ein beliebiges anderes Ringkohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;

R<sup>2</sup> für Wasserstoff steht;

R<sup>3</sup> für R<sup>11</sup>NH steht;

R<sup>10</sup> für Hydroxy oder (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, insbesondere (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, steht und bevorzugt R<sup>10</sup> für einen Rest aus der Reihe Hydroxy, Methoxy, Ethoxy, Propoxy und Isopropoxy steht;

R<sup>13</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl oder Benzyl, insbesondere Methyl, steht;

b, c, d und e für 1 stehen und f und g für 0 stehen;

h für 0 steht;

in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.

**[0061]** In dieser Reihe sind darüber hinaus bevorzugt solche Verbindungen der Formel I, worin R<sup>11</sup> für R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO, R<sup>12b</sup>-CS oder R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub>, insbesondere für R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO oder R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub>, steht;

R<sup>12a</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder den Rest R<sup>15</sup> steht;

R<sup>12b</sup> für R<sup>12a</sup>-NH steht;


in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.

**[0062]** Ganz speziell bevorzugte Verbindungen der Formel I sind solche, worin ein für die Gruppe B stehender substituiertes Methylenrest oder substituiertes Ethylenrest als Substituenten einen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkynyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, insbesondere (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, insbesondere (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl und im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl trägt, in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze. Noch spezieller bevorzugte Verbindungen der Formel I sind solche, worin B für einen unsubstituierten Methylenrest steht oder für einen Methylenrest steht, der durch einen (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylrest, insbesondere durch einen (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylrest, substituiert ist, in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.


**[0063]** Generell sind Verbindungen der Formel I bevorzugt, die an Chiralitätszentren, z. B. an dem für D stehenden chiralen Kohlenstoffatom und an dem Zentrum W im 5-Ring-Heterocyclus in der Formel I, eine einheitliche Konfiguration aufweisen.

## EP 0 842 945 B1

[0064] Die Verbindungen der Formel I können beispielsweise hergestellt werden durch Fragmentkondensation einer Verbindung der Formel II




mit einer Verbindung der Formel III,




wobei W, Y, Z, B, D, E, R sowie b, d, e, f, g, und h wie oben angegeben definiert sind und G für Hydroxycarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkoxycarbonyl, aktivierte Carbonsäurederivate, wie Säurechloride oder Aktivester, oder Isocyanato steht.

[0065] Zur Kondensation der Verbindungen der Formel II mit denen der Formel III verwendet man vorteilhafterweise die an sich bekannten Kupplungsmethoden der Peptidchemie (siehe zum Beispiel Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Band 15/1 und 15/2, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1974). Dazu ist es in der Regel nötig, daß vorhandene, nicht reagierende Aminogruppen durch reversible Schutzgruppen während der Kondensation geschützt werden. Gleiches gilt für nicht an der Reaktion beteiligte Carboxylgruppen, die bevorzugt als (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-, Benzyl- oder tert-Butylester vorliegen. Ein Aminogruppen-Schutz erübrigt sich, wenn die zu generierenden Aminogruppen noch als Nitro- oder Cyanogruppen vorliegen und erst nach der Kupplung zum Beispiel durch Hydrierung gebildet werden. Nach der Kupplung werden die vorhandenen Schutzgruppen in geeigneter Weise abgespalten. Beispielsweise können NO<sub>2</sub>-Gruppen (Guanidinoschutz), Benzylloxycarbonylgruppen und Benzylester abhydriert werden. Die Schutzgruppen vom tert-Butyltyp werden sauer abgespalten, während der 9-Fluorenylmethyloxycarbonylrest durch sekundäre Amine entfernt wird.

[0066] Verbindungen der Formel II, in der W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>), Y für eine Carbonylgruppe und Z für NR<sup>0</sup> steht, können beispielsweise hergestellt werden, indem man zunächst Verbindungen der Formel IV




in einer Bucherer-Reaktion zu Verbindungen der Formel V,



in der ebenso wie in der Formel IV R<sup>1</sup>, R<sup>13</sup> und A wie oben angegeben definiert sind, umsetzt (H. T. Bucherer, V. A. Lieb, J. Prakt. Chem. 141(1934), 5). Verbindungen der Formel VI,

**EP 0 842 945 B1**




in der R<sup>1</sup>, R<sup>13</sup>, A, B und G wie oben angegeben definiert sind, können dann erhalten werden, indem man die Verbindungen der Formel V beispielsweise zunächst mit einem alkylierenden Reagenz umsetzt, das den Rest -B-G in das Molekül einführt. Die Umsetzung von Verbindungen der Formel VI mit einem zweiten Reagenz der Formel R<sup>0</sup>-LG, in der R<sup>0</sup> die oben angegebenen Bedeutungen hat und LG eine nucleophil substituierbare Abgangsgruppe, zum Beispiel Halogen, insbesondere Chlor oder Brom, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, gegebenenfalls substituiertes Phenoxy oder eine heterocyclische Abgangsgruppe wie zum Beispiel Imidazolyl, darstellt, führt zu den entsprechenden Verbindungen der Formel II. Diese Umsetzungen können analog bekannten, dem Fachmann geläufigen Methoden durchgeführt werden. Je nach dem Einzelfall kann es hierbei, wie bei allen Schritten in der Synthese der Verbindungen der Formel I, angebracht sein, funktionelle Gruppen die zu Nebenreaktionen oder unerwünschten Reaktionen führen könnten, durch eine dem Syntheseprobem angepasste Schutzgruppenstrategie temporär zu blockieren, was dem Fachmann bekannt ist.


**[0067]** Steht W für R<sup>1</sup>-A-CH=C, so kann dieses Strukturelement beispielsweise eingeführt werden, indem analog bekannten Methoden ein Aldehyd mit einem 5-Ring-Heterocyclus kondensiert wird, der eine Methylengruppe in der der Gruppe W entsprechenden Position enthält.

**[0068]** Verbindungen der Formel I, in denen der 5-Ring-Heterocyclus einen Dioxo- oder Thioxo-oxo-substituierten Imidazolidinring darstellt, in dem W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) steht, können auch wie folgt erhalten werden:

Durch Reaktion von  $\alpha$ -Aminosäuren oder N-substituierten  $\alpha$ -Aminosäuren oder bevorzugt deren Ester, zum Beispiel der Methyl-, Ethyl-, tert-Butyl- oder Benzylester, beispielsweise einer Verbindung der Formel VII,




worin  $R^0$ ,  $R^1$ ,  $R^{13}$  und A wie oben angegeben definiert sind, mit einem Isocyanat oder Isothiocyanat beispielsweise der Formel VIII.




worin B, D, E und R sowie b, c, d, e, f, g und h wie oben angegeben definiert sind und U für Isocyanato oder Isothiocyanato steht, erhält man Harnstoff- oder Thioharnstoffderivate, beispielsweise der Formel IX,

## EP 0 842 945 B1



für die die oben angegebenen Definitionen gelten und in der V Sauerstoff oder Schwefel bedeutet, und die durch Erhitzen mit Säure unter Verseifung der Esterfunktionen zu Verbindungen der Formel Ia



cyclisiert werden, in der V Sauerstoff oder Schwefel bedeutet, W für  $\text{R}^1-\text{A}-\text{C}(\text{R}^{13})$  steht und für die ansonsten die oben angegebenen Bedeutungen gelten. Die Cyclisierung der Verbindungen der Formel IX zu den Verbindungen der Formel Ia kann auch durch Behandlung mit Basen in inerten Lösungsmittel durchgeführt werden, zum Beispiel durch Behandlung mit Natriumhydrid in einem aprotischen Lösungsmittel wie Dimethylformamid.

[0069] Während der Cyclisierung können Guanidinogruppen durch Schutzgruppen, zum Beispiel  $\text{NO}_2$ , blockiert werden. Aminogruppen in der Seitenkette können in geschützter Form oder noch als  $\text{NO}_2$ - oder Cyanofunktion vorliegen, die später zur Aminogruppe reduziert oder im Falle der Cyanogruppe auch in die Formamidinogruppe umgewandelt werden kann.


[0070] Verbindungen der Formel I, in denen der 5-Ring-Heterocyclus einen Dioxo- oder Thioxo-oxo-substituierten Imidazolidinring darstellt, in dem W für  $\text{R}^1-\text{A}-\text{C}(\text{R}^{13})$  und c für 1 steht, können auch erhalten werden, indem man eine Verbindung der Formel VII mit einem Isocyanat oder Isothiocyanat der Formel X




umsetzt, in der B, U und b wie oben für die Formel VIII angegeben definiert sind und L eine Alkoxygruppe, zum Beispiel eine  $(\text{C}_1-\text{C}_4)$ -Alkoxygruppe wie Methoxy, Ethoxy oder tert-Butoxy, eine  $(\text{C}_6-\text{C}_{14})$ -Aryloxygruppe, zum Beispiel Phenoxy, oder eine  $(\text{C}_6-\text{C}_{14})$ -Aryl- $(\text{C}_1-\text{C}_4)$ -alkoxygruppe, zum Beispiel Benzyloxy, bedeutet. Dabei wird eine Verbindung der Formel XI



**EP 0 842 945 B1**




erhalten, in der A, B, V, L, R<sup>0</sup>, R<sup>1</sup>, R<sup>13</sup> und b wie oben für die Formeln IX und X angegeben definiert sind, die dann unter dem Einfluß einer Säure oder einer Base, wie oben für die Cyclisierung der Verbindungen der Formel IX beschrieben, zu einer Verbindung der Formel XII,



in der B, L, V, W, R<sup>0</sup> und b wie oben für die Formeln Ia und X angegeben definiert sind, cyclisiert wird. Aus der Verbindung der Formel XII wird dann durch Hydrolyse der Gruppe CO-L zur Carbonsäure COOH und nachfolgende Kupplung mit einer Verbindung der Formel III, wie oben für die Kupplung der Verbindungen der Formeln II und III beschrieben, eine Verbindung der Formel Ia erhalten. Auch hier können während der Cyclisierung funktionelle Gruppen in geschützter Form vorliegen oder in Form von Vorstufen vorliegen, zum Beispiel Guanidinogruppen durch NO<sub>2</sub> blockiert werden oder Aminogruppen in geschützter Form oder noch als NO<sub>2</sub>- oder Cyanofunktion vorliegen, die später zur Aminogruppe reduziert oder im Falle der Cvanogruppe auch in die Formamidinogruppe umgewandelt werden kann.

**[0071]** Eine weitere Methode zur Herstellung von Verbindungen der Formel Ia ist beispielsweise die Umsetzung von Verbindungen der Formel XIII,



**[0072]** in der W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) steht und für die ansonsten die oben angegebenen Definitionen gelten, mit Phosgen, Thiophosgen oder entsprechenden Äquivalenten (analog S. Goldschmidt und M. Wick, Liebigs Ann. Chem. 575 (1952), 217-231 und C. Tropp, Chem. Ber. 61 (1928), 1431-1439).

**[0073]** Eine Überführung einer Aminofunktion in eine Guanidinofunktion kann mit folgenden Reagenzien durchgeführt werden:

1. O-Methylisoharnstoff (S. Weiss und H. Krommer, Chemiker Zeitung 98 (1974), 617-618)
2. S-Methylisothioharnstoff (R.F. Borne, M.L. Forrester und I.W. Waters, J. Med. Chem. 20 (1977), 771-776)

## EP 0 842 945 B1

3. Nitro-S-methylisothioharnstoff (L.S. Hafner und R.E. Evans, J. Org. Chem. 24 (1959)57)
4. Formamidinosulfonsäure (K. Kim, Y.-T. Lin und H.S. Mosher, Tetrah. Lett. 29 (1988), 3183-3186)
5. 3,5-Dimethyl-1-pyrazolyl-formamidinium-nitrat (F.L. Scott, D.G. O'Donovan und J. Reilly, J. Amer. Chem. Soc. 75 (1953), 4053-4054)
6. N,N'-Di-tert-butyloxycarbonyl-S-methyl-isothioharnstoff (R. J. Bergeron und J. S. McManis, J. Org. Chem. 52 (1987), 1700-1703)
7. N-Alkoxycarbonyl-, N,N'-Dialkoxycarbonyl-, N-Alkylcarbonyl- und N,N'dialkylcarbonyl-S-methyl-isothioharnstoff (H. Wollweber, H. Kölling, E. Niemers, A. Widdig, P. Andrews, H.-P. Schulz und H. Thomas, Arzneim. Forsch./Drug Res. 34 (1984), 531-542).

**[0074]** Hinsichtlich der Herstellung der Verbindungen der Formel I wird weiterhin Bezug genommen auf die Angaben zum Aufbau des Molekülgerüsts, die in der WO-A-95/14008, der DE-A-19515177 und in der ihr entsprechenden WO-A-96/33976, und in der DE-A-19635522 und den ihr entsprechenden Patentdokumenten, zum Beispiel der EP-A-796 855 (europäische Patentanmeldung 97103712.2) und der US-B-6218415 (US-Patentanmeldung 08/821253), enthalten sind und die Bestandteil der vorliegenden Offenbarung sind.

**[0075]** Zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S-R<sup>21</sup> steht, kann von den entsprechenden Verbindungen der Formel IV ausgegangen werden, in der R<sup>1</sup> für -S-R<sup>21</sup> steht. Setzt man in die Bucherer-Reaktion Verbindungen der Formel IV ein, in der R<sup>1</sup> für eine geschützte SH-Gruppe steht, so gelangt man nach der Abspaltung der Schutzgruppe zu Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -SH steht. Diese Verbindungen können wiederum durch Einführung des Restes R<sup>21</sup> in Verbindungen der Formel I überführt werden, in der R<sup>1</sup> für -S-R<sup>21</sup> (mit anderen Bedeutungen von R<sup>21</sup> als Wasserstoff) steht, oder auch als Zwischenprodukte für die Herstellung anderer Verbindungen der Formel I dienen, in denen das an die Gruppe A gebundene Atom des Restes R<sup>21</sup> ein Schwefelatom ist.

**[0076]** Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>21</sup> steht, können beispielsweise hergestellt werden, indem man Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S-R<sup>21</sup> steht, gemäß literaturbekannten Verfahren (vgl. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Bd. E12/2, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1985, S. 1058 ff.) zu den Sulfonen oxidiert, d. h. zu den Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>21</sup> steht. Entsprechend können Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S-R<sup>21</sup> steht, unter geeigneten, dem Fachmann geläufigen Reaktionsbedingungen gemäß an sich bekannten Verfahren (vgl. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Bd. E11/1, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1985, S. 702 ff.) zu den Sulfoxiden oxidiert werden, d. h. zu den Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S(O)-R<sup>21</sup> steht. Falls erforderlich, werden bei den Oxidationen zu den Sulfoxiden oder zu den Sulfonen oxidationsempfindliche Gruppen im Molekül vor der Durchführung der Oxidation durch geeignete Schutzgruppen geschützt.

**[0077]** Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup> oder -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> steht, können beispielsweise hergestellt werden, indem man Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -SH steht, gemäß literaturbekannten Verfahren (vgl. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Bd. E12/2, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1985, S. 1058 ff.) für die Herstellung von Sulfonsäurederivaten zu Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S(O)<sub>2</sub>-OH steht, oxidiert. Aus diesen Sulfonsäuren können dann direkt oder über entsprechende Sulfonsäurehalogenide durch Veresterung oder Knüpfung einer Amidbindung die Verbindungen der Formel I erhalten werden, in der R<sup>1</sup> für -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup> oder -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> steht.

**[0078]** Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S(O)-OR<sup>21</sup> oder -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> steht, können beispielsweise hergestellt werden, indem man Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -SH steht, in die entsprechenden Sulfide überführt, d. h. in die Salze, in denen R<sup>1</sup> für -S<sup>-</sup> steht und das Gegenion zum Beispiel ein Alkalimetallion oder ein Erdalkalimetallion ist, und diese Salze anschließend zum Beispiel mit meta-Chlorperbenzoesäure zu den Sulfinensäuren oxidiert, d. h. zu den Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S(O)-OH steht (vgl. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Bd. E11/1, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1985, S. 618 f.). Aus den Sulfinensäuren können nach an sich bekannten Verfahren die entsprechenden Sulfinensäureester und Sulfinensäureamide hergestellt werden, d. h. die Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S(O)-OR<sup>21</sup> oder -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> steht.

**[0079]** Falls erforderlich, werden auch bei der Herstellung von Sulfonsäurederivaten und Sulfinensäurederivaten durch eine Oxidation oxidationsempfindliche Gruppen im Molekül vor der Durchführung der Oxidation durch geeignete Schutzgruppen geschützt.

**[0080]** Außer den erwähnten Methoden können zur Herstellung der Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S(O)-R<sup>22</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -S(O)-OR<sup>21</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> oder -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> steht, generell auch andere in der Literatur beschriebene Verfahren zu Herstellung solcher Verbindungstypen Anwendung finden (vgl. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, Bd. E11/1, 1985, S. 618 ff. oder Bd. E11/2, 1985, S. 1055 ff.).


**[0081]** Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für weitere schwefelhaltige Gruppen steht, zum Beispiel für -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -O-S(O)-R<sup>22</sup>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, können

## EP 0 842 945 B1

- nach an sich bekannten, in der Literatur beschriebenen Verfahren (vgl. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Bd. E11/1 und E11/2, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1985) aus geeigneten Vorstufen aufgebaut werden, wobei die Anpassung der gewählten Synthesemethode an das jeweilige Zielmolekül dem Fachmann kein Probleme bereitet. Dies gilt auch für weitere Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S-R<sup>21</sup> steht.
- 5 **[0082]** Letzteres gilt auch für die Herstellung der Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für einen der in der Definition von R<sup>1</sup> aufgeführten phosphorhaltigen Reste steht, zum Beispiel ein Phosphonsäure-Derivat oder ein Phosphorsäure-Derivat. Diese Verbindungen können analog literaturbekannten Verfahren (vgl. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Bd. E1 und E2, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1982) für die Herstellung solcher Verbindungen aus geeigneten Vorstufen aufgebaut werden.
- 10 **[0083]** Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-NH-R<sup>28</sup> steht, können beispielsweise hergestellt werden, indem man die entsprechenden Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -NH-R<sup>28</sup> steht, mit Isocyanaten der Formel O=C=N-R<sup>28</sup> gemäß literaturbekannten Verfahren umsetzt (vgl. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Bd. VIII, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1952, S. 132). Analog können Verbindungen der Formel I, in R<sup>1</sup> für -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-NH-R<sup>28</sup> steht, hergestellt werden, indem man zum Beispiel die entsprechenden Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -NHR<sup>28</sup> steht, mit Isothiocyanaten der Formel S=C=N-R<sup>28</sup> umsetzt. Generell können zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> oder -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> steht, literaturbekannte Methoden zur Herstellung von Harnstoffen bzw. Thioharnstoffen Anwendung finden (vgl. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Bd. VIII, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1952).
- 15 **[0084]** Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup> steht, können beispielsweise hergestellt werden, indem man Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -NHR<sup>29</sup> steht, mit Chlorkohlensäureestern der Formel Cl-C(O)-OR<sup>22</sup> gemäß literaturbekannten Verfahren (vgl. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Bd. VIII, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1952, S. 138) umsetzt. Generell können auch andere literaturbekannte Methoden zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup> steht, Anwendung finden (vgl.
- 20 **[0085]** Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Bd. VIII, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1952). Analog können Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-SR<sup>22</sup> steht, hergestellt werden.
- 25 **[0086]** Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -O-C(O)-NH-R<sup>28</sup> steht, können beispielsweise hergestellt werden, indem man Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -OH steht, mit Isocyanaten der Formel O=C=N-R<sup>28</sup> gemäß literaturbekannten Verfahren (vgl. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Bd. VIII, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1952, S. 141) umsetzt. Analog können Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -S-C(O)-NH-R<sup>28</sup> steht, beispielsweise hergestellt werden, indem man Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -SH steht, mit Isocyanaten der Formel O=C=N-R<sup>28</sup> umsetzt. Analog können Isothiocyanate der Formel S=C=N-R<sup>28</sup> umgesetzt werden. Generell können zur Herstellung von Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> oder -S-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> steht, literaturbekannte Methoden zur Herstellung solcher Kohlensäurederivate Anwendung finden, beispielsweise Umsetzungen mit Carbamidsäurehalogeniden.
- 30 **[0087]** Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -O-C(O)-R<sup>21</sup> steht, können beispielsweise hergestellt werden, indem Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -OH steht, nach an sich bekannten, in der Literatur beschriebenen Verfahren (vgl. Houben-Weyl, Methoden der Organischen Chemie, Bd. VIII, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1952, S. 508 ff.) umsetzt, beispielsweise mit reaktiven Carbonsäurederivaten. Entsprechend können beispielsweise Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -O-C(O)-OR<sup>22</sup> steht, aus Verbindungen der Formel I, in der R<sup>1</sup> für -OH steht, mit geeigneten Kohlensäurederivaten wie zum Beispiel Chlorkohlensäureestern erhalten werden.
- 35 **[0088]** Gemäß den vorstehenden Ausführungen können die Verbindungen der Formel I, in der die Reste W, Z, Y, B, R, D, E und b, c, d, e, f, g, und h die eingangs angegebenen Bedeutungen haben, auch als Zwischenprodukte für die Herstellung anderer Verbindungen, insbesondere weiterer Arzneimittelwirkstoffe, eingesetzt werden, die aus den Verbindungen der Formel I beispielsweise durch Abwandlung oder Einführung von Resten oder funktionellen Gruppen erhältlich sind.
- 40 **[0089]** Die Verbindungen der Formel I, in der die Reste W, Z, Y, B, R, D, E und b, c, d, e, f, g, und h die eingangs angegebenen Bedeutungen haben, sind Antagonisten des Adhäsionsrezeptors VLA-4 und/oder Inhibitoren der Leukozytenadhäsion. Dies gilt in gleichem Maße auch für die bereits in der WO-A-96/33976 beschriebenen Verbindungen, die nach der eingangs angegebenen Definition derjenigen Verbindungen, die per se in der vorliegenden Anmeldung beansprucht werden, ausgeschlossen sind, für die aber in der WO-A-96/33976 keine pharmakologische Wirkung oder pharmazeutische Verwendung beschrieben ist. Die folgenden Ausführungen zur pharmakologischen Wirkung und Verwendung gelten auch für die letztgenannten Verbindungen. Zur Herstellung der letztgenannten Verbindungen wird auf die WO-A-96/33976 bzw. die deutsche Patentanmeldung 19515177.1 verwiesen, deren Inhalt insofern Bestandteil der vorliegenden Offenbarung ist. Hinsichtlich der Verwendung von Verbindungen und hinsichtlich pharmazeutischer Zubereitungen betrifft die vorliegende Erfindung damit zum einen die Verbindungen der Formel I, in der die Reste W, Z, Y, B, R, D, E und b, c, d, e, f, g, und h die eingangs angegebenen Bedeutungen haben, zum aber ebenso die nach der eingangs angegebenen Definition der beanspruchten Verbindungen ausgeschlossenen, in der WO-A-96/33976 beschriebenen Verbindungen. Hinsichtlich der im folgenden beschriebenen Verwendung und pharmazeutischer Zu-
- 45 50 55

## EP 0 842 945 B1

bereitung sind also Gegenstand der vorliegenden Erfindung Verbindungen der Formel Ib,




worin

- W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) oder R<sup>1</sup>-A-CH=C steht;
- 15 Y für eine Carbonyl-, Thiocarbonyl- oder Methylengruppe steht;
- Z für N(R<sup>0</sup>), Sauerstoff, Schwefel oder eine Methylengruppe steht;
- A einen zweiwertigen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-(C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, Phenyl, Phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-phenyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, Phenyl-(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl oder einen zweiwertigen Rest eines 5- oder 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Ringes, der 1 oder 2 Stickstoffatome enthalten und ein- oder zweifach durch (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl oder doppelt gebundenen Sauerstoff oder Schwefel substituiert sein kann, bedeutet oder für eine direkte Bindung steht;
- 20 B einen zweiwertigen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkenyl, Phenyl, Phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-Alkyl-phenyl bedeutet, wobei der zweiwertige (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-Rest unsubstituiert oder durch einen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl und im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl substituiert sein kann;
- 25 D für C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>), N(R<sup>3</sup>) oder CH=C(R<sup>3</sup>) steht;
- E Tetrazolyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), HOS(O)<sub>2</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> oder R<sup>10</sup>CO bedeutet;
- 30 R Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor ein- oder mehrfach substituiert sein können;
- R<sup>0</sup> für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, CHO, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl-CO, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-CO, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-CO, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-CO, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-S(O)<sub>n</sub>, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-S(O)<sub>n</sub> oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub> steht, wobei n für 1 oder 2 steht;
- 45 R<sup>1</sup> einen der Reste -S-R<sup>21</sup>, -S-S-R<sup>21</sup>, -S(O)-R<sup>22</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -S-OR<sup>21</sup>, -S(O)-OR<sup>21</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -S-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(O)-R<sup>21</sup>, -S-C(O)-OR<sup>22</sup>, -S-C(S)-SR<sup>22</sup>, -S-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(S)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -O-S(O)-R<sup>22</sup>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-SR<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,
- 55

## EP 0 842 945 B1

Cyano, Halogen, Nitro oder Methylendioxy bedeutet oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel



steht, in der

Q<sup>1</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- oder -S- steht;

Q<sup>2</sup> für -S(O)- oder -S(O)<sub>2</sub>- steht;

Q<sup>3</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- steht,

wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q<sup>3</sup> stehenden Gruppen -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- oder über ein beliebiges anderes Ring-Kohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;

R<sup>2</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;

R<sup>3</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenylcarbonyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynylcarbonyl, Pyridyl, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>15</sup> oder CONHR<sup>15</sup> bedeutet;

R<sup>4</sup> Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>28</sub>)-Alkyl bedeutet, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe Hydroxy, Hydroxycarbonyl, Aminocarbonyl, Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-aminocarbonyl, Amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, Amino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl-phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonylamino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylphenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonylamino-Amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxycarbonyl, das im Arylrest auch substituiert sein kann, Amino, Mercapto, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxycarbonyl, Het-CO, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, HOS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, -alkyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, -alkyl, Tetrazolyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, Halogen, Nitro, Trifluormethyl und den Rest R<sup>5</sup> substituiert sein kann;

R<sup>5</sup> gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, einen mono- oder bicyclischen 5- bis 12-gliedrigen heterocyclischen Ring, der aromatisch, teilhydriert oder vollständig hydriert sein kann und der ein, zwei oder drei gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann, einen Rest R<sup>6</sup> oder einen Rest R<sup>6</sup>CO- bedeutet, wobei der Aryl- und unabhängig davon der Heterozyklus-Rest ein- oder mehrfach durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino oder Trifluormethyl substituiert sein können;

R<sup>6</sup> für R<sup>7</sup>R<sup>8</sup>N, R<sup>7</sup>O oder R<sup>7</sup>S steht oder eine Aminosäureseitenkette, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu -NH-CH<sub>2</sub>- reduziert sein kann, sowie deren Ester und Amide bedeutet, wobei anstelle freier funktioneller Gruppen gegebenenfalls Wasserstoff oder Hydroxymethyl stehen kann und/oder wobei freie funktionelle Gruppen durch in der Peptidchemie übliche Schutzgruppen geschützt sein können;

R<sup>7</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxycarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylcarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylcarbonyl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylloxycarbonyl, wobei die Alkylgruppen gegebenenfalls durch eine Aminogruppe substituiert und/oder wobei die Arylreste ein- oder mehrfach, vorzugsweise einfach, durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino und Trifluormethyl substituiert sein können, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu -NH-CH<sub>2</sub>- reduziert sein kann, bedeutet;

R<sup>8</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, das im Arylrest auch substituiert sein kann, bedeutet;

R<sup>9</sup> Wasserstoff, Aminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylaminocarbonyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkylaminocarbonyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder

## EP 0 842 945 B1

- (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;
- R<sup>10</sup> Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, das im Arylrest auch substituiert sein kann, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryloxy, Amino oder Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino bedeutet;
- R<sup>11</sup> für Wasserstoff, R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, H-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO, R<sup>12b</sup>-CS, R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub> oder R<sup>12b</sup>-S(O)<sub>2</sub> steht;
- 5 R<sup>12a</sup> (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder den Rest R<sup>15</sup> bedeutet;
- R<sup>12b</sup> Amino, Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino oder R<sup>12a</sup>-NH bedeutet;
- 10 R<sup>13</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet;
- R<sup>15</sup> für R<sup>16</sup>-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl oder für R<sup>16</sup> steht;
- R<sup>16</sup> für einen 6- bis 24-gliedrigen bicyclischen oder tricyclischen Rest steht, der gesättigt oder teilweise ungesättigt ist und der auch ein, zwei, drei oder vier gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann und der auch durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Oxo substituiert sein kann;
- 15 R<sup>21</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste R<sup>21</sup> bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;
- 20 R<sup>22</sup> (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste R<sup>22</sup> bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;
- 25 R<sup>28</sup> für einen der Reste R<sup>21</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- oder R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))-steht;
- R<sup>29</sup> für einen der Reste R<sup>22</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- oder R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))-steht;
- 30 Het für den Rest eines über ein Stickstoffatom gebundenen 5- bis 10-gliedrigen, monocyclischen oder polycyclischen Heterocyclus steht, der aromatisch oder teilweise ungesättigt oder gesättigt sein kann und der ein, zwei, drei oder vier gleiche oder verschiedene zusätzliche Ring-Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel enthalten kann und der an Kohlenstoffatomen und an zusätzlichen Ring-Stickstoffatomen gegebenenfalls substituiert sein kann, wobei an zusätzlichen Ring-Stickstoffatomen gleiche oder verschiedene Reste R<sup>h</sup>, R<sup>h</sup>CO oder R<sup>h</sup>O-CO als Substituenten stehen können und R<sup>h</sup> für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl steht;
- 35 b, c, d und f unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen, aber nicht alle gleichzeitig 0 sein können;
- e, g und h unabhängig voneinander für 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 stehen;
- in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.
- 45 **[0090]** Alle obigen Erläuterungen zu den Verbindungen der Formel 1, zum Beispiel hinsichtlich Alkylresten, Arylresten, usw. gelten für die Verbindungen der Formel Ib entsprechend. Auch hier werden alle Stereoisomeren umfaßt. Ebenso gelten alle oben angegebenen bevorzugten Bedeutungen und bevorzugten Verbindungen ausdrücklich auch hier für die Verbindungen der Formel Ib entsprechend. Hinsichtlich der Verwendung und der pharmazeutischen Zubereitungen sind bevorzugte Verbindungen der Formel Ib zum Beispiel also wiederum solche Verbindungen, worin
- 50 W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) oder R<sup>1</sup>-A-CH=C steht;
- Y für eine Carbonyl-, Thiocarbonyl- oder Methylengruppe steht;
- Z für N(R<sup>0</sup>), Sauerstoff, Schwefel oder eine Methylengruppe steht;
- 55 A einen zweiwertigen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkylen, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen-(C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, Phenylen, Phenylen-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen-phenyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen-phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, Phenylen-(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl oder einen zweiwertigen Rest eines 5- oder 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Ringes, der 1 oder 2 Stickstoffatome enthalten und ein- oder zweifach durch (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl oder doppelt gebundenen Sauerstoff oder Schwefel substituiert sein kann, bedeutet oder für eine direkte

## EP 0 842 945 B1

Bindung steht;

B einen zweiwertigen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkenyl, Phenyl, Phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-Alkyl-phenyl bedeutet;


D für C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>), N(R<sup>3</sup>) oder CH=C(R<sup>3</sup>) steht;

5 E Tetrazolyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), HOS(O)<sub>2</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> oder R<sup>10</sup>CO bedeutet;

R und R<sup>0</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeuten, wobei Alkylreste durch Fluor ein- oder mehrfach substituiert sein können;

10 R<sup>1</sup> einen der Reste -S-R<sup>21</sup>, -S-S-R<sup>21</sup>, -S(O)-R<sup>22</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -S-OR<sup>21</sup>, -S(O)-OR<sup>21</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -S-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(O)-R<sup>21</sup>, -S-C(O)-OR<sup>22</sup>, -S-C(S)-SR<sup>22</sup>, -S-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(S)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-M(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>,  
15 -O-S(O)-R<sup>22</sup>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, (R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>,  
20 -P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-SR<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
Cyano, Halogen, Nitro oder Methylendioxy bedeutet oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel

25



30

steht, in der

Q<sup>1</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- oder -S- steht;

35 Q<sup>2</sup> für -S(O)- oder -S(O)<sub>2</sub>- steht;

Q<sup>3</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- steht, wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q<sup>3</sup> stehenden Gruppen -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- oder über ein beliebiges anderes Ring-Kohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;

40

R<sup>2</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;

R<sup>3</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenylcarbonyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylcarbonyl, Pyridyl, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>15</sup> oder CONHR<sup>15</sup> bedeutet;

45

R<sup>4</sup> Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>28</sub>)-Alkyl bedeutet, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe Hydroxy, Hydroxycarbonyl, Aminocarbonyl, Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-aminocarbonyl, Amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, Amino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl-phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonylamino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxycarbonyl, das im Arylrest auch substituiert sein kann, Amino, Mercapto, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxycarbonyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, HOS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, Tetrazolyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, Halogen, Nitro, Trifluormethyl und den Rest R<sup>5</sup> substituiert sein kann;

55

R<sup>5</sup> gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, einen mono- oder bicyclischen 5- bis 12-gliedrigen heterocyclischen Ring, der aromatisch, teilhydriert oder vollständig hydriert sein kann und der ein, zwei oder drei gleiche oder verschie-

## EP 0 842 945 B1

- dene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann, einen Rest R<sup>6</sup> oder einen Rest R<sup>6</sup>CO- bedeutet, wobei der Aryl- und unabhängig davon der Heterozyklus-Rest ein- oder mehrfach durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino oder Trifluormethyl substituiert sein können;
- 5 R<sup>6</sup> für R<sup>7</sup>R<sup>8</sup>N, R<sup>7</sup>O oder R<sup>7</sup>S steht oder eine Aminosäureseitenkette, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu -NH-CH<sub>2</sub>- reduziert sein kann, sowie deren Ester und Amide bedeutet, wobei anstelle freier funktioneller Gruppen gegebenenfalls Wasserstoff oder Hydroxymethyl stehen kann und/oder wobei
- 10 R<sup>7</sup> freie funktionelle Gruppen durch in der Peptidchemie übliche Schutzgruppen geschützt sein können; Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxycarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylcarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylcarbonyl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyloxycarbonyl, wobei die Alkylgruppen gegebenenfalls durch eine Aminogruppe substituiert und/oder wobei die Arylreste ein- oder mehrfach, vorzugsweise einfach, durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe
- 15 (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino und Trifluormethyl substituiert sein können, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu -NH-CH<sub>2</sub>- reduziert sein kann, bedeutet;
- 20 R<sup>8</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, das im Arylrest auch substituiert sein kann, bedeutet;
- R<sup>9</sup> Wasserstoff, Aminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylaminocarbonyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkylaminocarbonyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;
- 25 R<sup>10</sup> Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, das im Arylrest auch substituiert sein kann, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryloxy, Amino oder Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino bedeutet;
- 30 R<sup>11</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, R<sup>12</sup>CO, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-S(O)<sub>2</sub>, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>2</sub>, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> oder den Rest R<sup>15</sup> bedeutet;
- R<sup>12</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, das im Arylrest auch substituiert sein kann, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryloxy, Amino oder Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino, den Rest R<sup>15</sup> oder den Rest R<sup>15</sup>-O- bedeutet;
- 35 R<sup>13</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;
- R<sup>15</sup> für R<sup>16</sup>-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder für R<sup>16</sup> steht;
- 40 R<sup>16</sup> für einen 6- bis 24-gliedrigen bicyclischen oder tricyclischen Rest steht, der gesättigt oder teilweise ungesättigt ist und der auch ein bis vier gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann und der auch durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Oxo substituiert sein kann;
- 45 R<sup>21</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste R<sup>21</sup> bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;
- 50 R<sup>22</sup> (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste R<sup>22</sup> bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;
- 55 R<sup>28</sup> für einen der Reste R<sup>21</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- oder R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))- steht;
- R<sup>29</sup> für einen der Reste R<sup>22</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- oder R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))- steht;

b, c, d und f unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen, aber nicht alle gleichzeitig 0 sein können;

e, g und h unabhängig voneinander für 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 stehen;

in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträg-



## EP 0 842 945 B1

lichen Salze.

5 **[0091]** Die Verbindungen der Formel Ib gemäß der vorstehenden Definition haben die Fähigkeit, den VLA-4-Adhäsionsrezeptor zu inhibieren und Zell-Zell- und Zell-Matrix-Interaktionsprozesse zu inhibieren, bei denen Wechselwirkungen zwischen VLA-4 mit seinen Liganden eine Rolle spielen. Die Wirksamkeit der Verbindungen der Formel Ib kann beispielsweise in einem Assay nachgewiesen werden, in dem die Bindung von Zellen, die den VLA-4-Rezeptor aufweisen, zum Beispiel von Leukozyten, an Liganden dieses Rezeptors gemessen wird, zum Beispiel an VCAM-1, das dafür vorteilhafterweise auch gentechnisch hergestellt werden kann. Einzelheiten eines solchen Assay sind weiter unten beschrieben. Insbesondere vermögen die Verbindungen der Formel Ib die Adhäsion und die Migration von Leukozyten inhibieren, etwa die Anheftung von Leukozyten an endotheliale Zellen, die - wie oben erläutert - über den VCAM-1/VLA-4-Adhäsionsmechanismus gesteuert wird.

10 **[0092]** Die Verbindungen der Formel Ib und ihre physiologisch verträglichen Salze eignen sich daher zur Behandlung und Prophylaxe von Krankheiten, die auf der Wechselwirkung zwischen dem VLA-4-Rezeptor und seinen Liganden beruhen oder durch eine Hemmung dieser Wechselwirkung beeinflusst werden können, und insbesondere eignen sie sich für die Behandlung und Prophylaxe von Krankheiten, die zumindest teilweise durch ein unerwünschtes Ausmaß an Leukozytenadhäsion und/oder Leukozytenmigration verursacht werden oder damit verbunden sind, und zu deren Vorbeugung, Linderung oder Heilung die Adhäsion und/oder Migration von Leukozyten verringert werden soll. Sie können somit zum Beispiel bei entzündlichen Erscheinungen unterschiedlichster Ursache als Entzündungshemmer eingesetzt werden. Anwendung finden die Verbindungen der Formel Ib gemäß der vorliegenden Erfindung beispielsweise zur Behandlung oder Prophylaxe der rheumatoiden Arthritis, der inflammatorischen bowel disease (ulcerativen Colitis), des systemischen Lupus erythematosus oder zur Behandlung oder Prophylaxe von inflammatorischen Erkrankungen des zentralen Nervensystems, wie zum Beispiel der multiplen Sklerose, zur Behandlung oder Prophylaxe von Asthma oder von Allergien, z. B. Allergien vom verzögerten Typ (Typ IV-Allergie), weiterhin zur Behandlung oder Prophylaxe von kardiovaskulären Erkrankungen, der Arteriosklerose, von Restenosen, zur Behandlung oder Prophylaxe von Diabetes, zur Verhinderung der Schädigung von Organtransplantaten, zur Hemmung von Tumorwachstum oder Tumormetastasierung bei verschiedenen Malignitäten, zur Therapie der Malaria, sowie von weiteren Krankheiten, bei denen eine Blockierung des Integrins VLA-4 und/oder eine Beeinflussung der Leukozytenaktivität zur Vorbeugung, Linderung oder Heilung angebracht erscheint. Die Verbindungen der Formel Ib und ihre Salze können weiterhin für diagnostische Zwecke, zum Beispiel bei in vitro-Diagnosen, und als Hilfsmittel in biochemischen Untersuchungen eingesetzt werden, bei denen eine VLA-4-Blockierung oder eine Beeinflussung von Zell-Zell- oder Zell-Matrix-Interaktionen angestrebt wird.

30 **[0093]** Die Verbindungen der Formel Ib und ihre physiologisch verträglichen Salze können erfindungsgemäß am Tier, bevorzugt am Säugetier, und insbesondere am Menschen als Arzneimittel zur Therapie oder Prophylaxe verabreicht werden. Sie können für sich allein, in Mischungen untereinander oder in Form von pharmazeutischen Zubereitungen verabreicht werden, die eine enterale oder parenterale Anwendung gestatten und die als aktiven Bestandteil eine wirksame Dosis mindestens einer Verbindung der Formel Ib und/oder ihrer physiologisch verträglichen Salze neben üblichen pharmazeutisch einwandfreien Trägerstoffen und/oder Zusatzstoffen enthalten. Die pharmazeutischen Zubereitungen enthalten normalerweise etwa 0,5 bis 90 Gew.-% der therapeutisch wirksamen Verbindungen der Formel Ib und/oder ihrer physiologisch verträglichen Salze.

40 **[0094]** Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind die Verbindungen der Formel Ib und/oder ihre physiologisch verträglichen Salze zur Verwendung als Arzneimittel, die Verwendung der Verbindungen der Formel Ib und/oder ihrer physiologisch verträglichen Salze zur Herstellung von Arzneimitteln zur Hemmung der Adhäsion und/oder Migration von Leukozyten oder zur Hemmung des VLA-4-Rezeptors, also von Arzneimitteln zur Behandlung oder Prophylaxe von Krankheiten, bei denen die Leukozytenadhäsion und/oder Leukozytenmigration ein unerwünschtes Ausmaß aufweist, oder von Krankheiten, bei denen VLA-4-abhängige Adhäsionsvorgänge eine Rolle spielen, insbesondere zur Herstellung von Arzneimitteln zur Entzündungshemmung, sowie die Verwendung der Verbindungen der Formel Ib und/oder ihrer physiologisch verträglichen Salze bei der Behandlung und Prophylaxe derartiger Krankheiten. Weiterhin sind Gegenstand der vorliegenden Erfindung pharmazeutische Zubereitungen, die eine wirksame Dosis mindestens einer Verbindung der Formel Ib und/oder ihrer physiologisch verträglichen Salze neben üblichen pharmazeutisch einwandfreien Trägerstoffen und/oder Zusatzstoffen enthalten.

50 **[0095]** Die Arzneimittel können oral, zum Beispiel in Form von Pillen, Tabletten, Filmtabletten, Dragees, Granulaten, Hart- und Weichgelatine kapseln, Lösungen, Sirupen, Emulsionen oder Suspensionen verabreicht werden. Die Verabreichung kann aber auch rektal, zum Beispiel in Form von Suppositorien, oder parenteral, zum Beispiel in Form von Injektions- oder Infusionslösungen, Mikrokapseln oder Rods, oder perkutan, zum Beispiel in Form von Salben oder Tinkturen, oder auf anderem Wege, zum Beispiel in Form von Nasalsprays oder Aerosolmischungen, erfolgen.

55 **[0096]** Die Herstellung der erfindungsgemäß einzusetzenden pharmazeutischen Zubereitungen erfolgt in an sich bekannter Weise, wobei neben der oder den Verbindungen der Formel Ib und/oder ihren physiologisch verträglichen Salzen pharmazeutisch inerte anorganische oder organische Trägerstoffe verwendet werden. Für die Herstellung von Pillen, Tabletten, Dragees und Hartgelatine kapseln kann man zum Beispiel Lactose, Maisstärke oder Derivate davon,

**EP 0 842 945 B1**

Talk, Stearinsäure oder deren Salze etc. verwenden. Trägerstoffe für Weichgelatinekapselformen und Suppositorien sind zum Beispiel Fette, Wachse, halbfeste und flüssige Polyole, natürliche oder gehärtete Öle etc. Als Trägerstoffe für die Herstellung von Lösungen, zum Beispiel Injektionslösungen, oder von Emulsionen oder Sirupen eignen sich zum Beispiel Wasser, Alkohole, Glycerin, Polyole, Saccharose, Invertzucker, Glukose, pflanzliche Öle etc. Als Trägerstoffe für

Mikrokapseln, Implantate oder Rods eignen sich zum Beispiel Mischpolymerisate aus Glykolsäure und Milchsäure. **[0097]** Die pharmazeutischen Zubereitungen können neben den Wirk- und Trägerstoffen noch Zusatzstoffe, wie zum Beispiel Füllstoffe, Spreng-, Binde-, Gleit-, Netz-, Stabilisierungs-, Emulgier-, Konservierungs-, Süß-, Färbe-, Geschmacks- oder Aromatisierungs-, Dickungs-, Verdünnungsmittel, Puffersubstanzen, ferner Lösungsmittel oder Lösungsvermittler oder Mittel zur Erzielung eines Depoteffekts, sowie Salze zur Veränderung des osmotischen Drucks, Überzugsmittel oder Antioxidantien enthalten. Sie können auch zwei oder mehrere Verbindungen der Formel Ib und/oder deren physiologisch verträgliche Salze enthalten. Ferner können sie neben mindestens einer Verbindung der Formel Ib und/oder ihren physiologisch verträglichen Salzen noch einen oder mehrere andere therapeutisch oder prophylaktisch wirksame Stoffe enthalten, zum Beispiel Stoffe mit entzündungshemmender Wirkung.

**[0098]** Die Dosis kann innerhalb weiter Grenzen variieren und ist in jedem einzelnen Fall den individuellen Gegebenheiten anzupassen. Im allgemeinen ist bei der oralen Verabreichung eine Tagesdosis von etwa 0,01 bis 100 mg/kg, vorzugsweise 0,1 bis 10 mg/kg, insbesondere 0,3 bis 2 mg/kg Körpergewicht zur Erzielung wirksamer Ergebnisse angemessen. Bei intravenöser Applikation beträgt die Tagesdosis im allgemeinen etwa 0,01 bis 50 mg/kg, vorzugsweise 0,01 bis 10 mg/kg Körpergewicht. Die Tagesdosis kann, insbesondere bei der Applikation größerer Mengen, in mehrere, zum Beispiel 2, 3, oder 4, Teilverabreichungen aufgeteilt werden. Gegebenenfalls kann es, je nach individuellem Verhalten, erforderlich werden, von der angegebenen Tagesdosis nach oben oder nach unten abzuweichen. Pharmazeutische Zubereitungen enthalten normalerweise 0,2 bis 500 mg, vorzugsweise 1 bis 100 mg Wirkstoff der Formel Ib und/oder dessen physiologisch verträgliche Salze pro Dosis.

**Beispiele**

**[0099]** Die Produkte wurden über Massenspektren (MS) und/oder NMR-Spektren identifiziert. Verbindungen, die durch Chromatographie unter Verwendung eines Laufmittels gereinigt wurden, das beispielsweise Essigsäure oder Trifluoressigsäure enthielt, und anschließend gefriergetrocknet wurden, haben zum Teil je nach Durchführung der Gefrierdrying noch die aus dem Laufmittel stammende Säure enthalten, wurden also teilweise oder vollständig in Form eines Salzes, zum Beispiel in Form des Essigsäuresalzes oder Trifluoressigsäuresalzes, erhalten.

Es bedeuten:

**[0100]**


THF	Tetrahydrofuran
DMF	N,N-Dimethylformamid
DCC	N,N'-Dicyclohexylcarbodiimid
HOBt	1-Hydroxybenzotriazol

## EP 0 842 945 B1

## Beispiel 1

((R,S)-4-(4-Cyanophenyl)-4-methyl-3-((2-naphthyl)-methyl)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenyl-glycin

[0101]



1a) ((R,S)-4-(4-Cyanophenyl)-4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin

[0102] 20 g (138 mmol) p-Acetylbenzonitril, 115,6 g Ammoniumcarbonat (1,21 mol) und 11,6 g Kaliumcyanid (178 mmol) wurden in 600 ml einer Mischung aus 50 % Ethanol und 50 % Wasser gelöst. Das Gemisch wurde 5 Stunden bei 55 °C gerührt und über Nacht bei Raumtemperatur stehen gelassen. Die Lösung wurde mit 6 N HCl auf pH = 6,3 eingestellt und anschließend zwei Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Der Niederschlag wurde abgesaugt, mit Wasser gewaschen und über Phosphorpentoxid im Hochvakuum getrocknet. Ausbeute: 22,33 g (75 %).  
FAB-MS: 216,1 (M + H)<sup>+</sup>

1b) ((R,S)-4-(4-Cyanophenyl)-4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-essigsäuremethylester

[0103] 1,068 g Natrium (46,47 mmol) wurden unter Stickstoff in 110 ml abs. Methanol gelöst. Die klare Lösung wurde mit 10 g ((R,S)-4-(4-Cyanophenyl)-4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin (46,47 mmol) versetzt und das Gemisch wurde 2 h unter Rückfluß gekocht. Man gab 7,75 g (46,68 mmol) Kaliumiodid zu und tropfte innerhalb einer Stunde eine Lösung von 4,53 ml Chloressigsäuremethylester (51,3 mmol) in 5 ml Methanol zu. Es wurde 6 Stunden zum Sieden erhitzt, über Nacht bei Raumtemperatur stehen gelassen und eingengt. Der ölige Rückstand wurde über Kieselgel mit Methylenchlorid/Essigester (9:1) chromatographiert. Ausbeute: 8,81 g (66 %).  
FAB-MS: 288 (M + H)<sup>+</sup>

1c) ((R,S)-4-(4-Cyanophenyl)-4-methyl-3-((2-naphthyl)-methyl)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester

[0104] 5 g ((R,S)-4-(4-Cyanophenyl)-4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-essigsäuremethylester (17,4 mmol) wurden unter Argon in 20 ml wasserfreiem DMF gelöst. Im Argon-Gegenstrom wurden 920 mg einer Natriumhydrid-Dispersion in Mineralöl (19,14 mmol) zugegeben. Das Reaktionsgemisch wurde 15 Minuten bei Raumtemperatur gerührt. Anschließend setzte man eine Lösung von 3,85 g 2-Brommethylnaphthalin (19,14 mmol) in 10 ml wasserfreiem DMF zu. Es wurde 4 Stunden bei Raumtemperatur gerührt und dann über Nacht bei Raumtemperatur stehen gelassen. Die Lösung wurde konzentriert. Zur Reinigung wurde die Substanz über Kieselgel mit Methylenchlorid/Essigester (9,75:0,25) chromatographiert. Die Fraktionen mit der reinen Substanz wurden eingengt. Ausbeute: 5,15 g Öl (69 %).  
FAB-MS: 428,3 (M + H)<sup>+</sup>

1d) ((R,S)-4-(4-Cyanophenyl)-4-methyl-3-((2-naphthyl)-methyl)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-essigsäure

[0105] 1,1 g ((R,S)-4-(4-Cyanophenyl)-4-methyl-3-((2-naphthyl)-methyl)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-essigsäuremethylester (2,57 mmol) wurden in einer Mischung aus 20 ml 6 N HCl und 10 ml Dioxan gelöst. Die Lösung wurde 3

## EP 0 842 945 B1

Stunden bei 70 °C gerührt und dann eingengt. Ausbeute: 1,2 g Rohprodukt.

FAB-MS: 414,2 (M + H)<sup>+</sup>

1e) ((R,S)-4-(4-Cyanophenyl)-4-methyl-3-((2-naphthyl)-methyl)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin-di-tert-butylester

[0106] Zu einer Lösung von 1,2 g ((R,S)-4-(4-Cyanophenyl)-4-methyl-3-((2-naphthyl)-methyl)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-essigsäure (Rohprodukt), 0,97 g H-Asp(OBu<sup>t</sup>)-Phg-OBu<sup>t</sup>-Hydrochlorid (2,34 mmol) und 320 mg HOBt (2,34 mmol) in 25 ml DMF gab man bei 0 °C 515 mg DCC (2,34 mmol). Man ließ eine Stunde bei 0 °C und 3 Stunden bei Raumtemperatur rühren. Anschließend ließ man den Ansatz über Nacht bei Raumtemperatur stehen, saugte den Niederschlag ab und engte das Filtrat ein. Zur Reinigung wurde die Substanz über Kieselgel zuerst mit Methylenchlorid/Methanol/Eisessig (9,5:0,5:0,05) und dann mit Methylenchlorid/Essigester (8:2) chromatographiert. Ausbeute: 620 mg Öl (34,4 %).

FAB-MS: 774,3 (M + H)<sup>+</sup>

1f) ((R,S)-4-(4-Cyanophenyl)-4-methyl-3-((2-naphthyl)-methyl)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin


[0107] 250 mg ((R,S)-4-(4-Cyanophenyl)-4-methyl-3-((2-naphthyl)-methyl)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin-di-tert-butylester wurden in einer Mischung aus 2,25 ml Trifluoressigsäure und 0,25 ml Wasser gelöst. Man ließ eine Stunde bei Raumtemperatur stehen und engte im Wasserstrahlvakuum ein. Zur Reinigung wurde die Substanz über Sephadex LH20 mit einer Mischung aus Eisessig, n-Butanol und Wasser chromatographiert. Die Fraktionen mit der reinen Substanz wurden eingengt. Der Rückstand wurde in Wasser gelöst, gefriergetrocknet und zur weiteren Reinigung über Kieselgel mit Methylenchlorid/Methanol/Eisessig/Wasser (9:1:0,01:0,1) chromatographiert. Ausbeute: 78 mg (36,8 %).

FAB-MS: 662,2 (M + H)<sup>+</sup>

Beispiel 2

((R,S)-3-Benzyl-4-methyl-4-(4-nitro-phenyl)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin

[0108]



2a) (R,S)-4-Methyl-4-(4-nitro-phenyl)-2,5-dioxoimidazolidin

[0109] Ein Gemisch aus 20 g (121 mmol) 4-Nitroacetophenon, 101,65 g (1,06 mol) Ammoniumcarbonat und 10,2 g (156 mmol) Kaliumcyanid in 400 ml Ethanol/Wasser (1:1) wurden 5 h bei 50 °C erhitzt. Anschließend wurde die Lösung mit 6 N Salzsäure auf pH = 6,3 eingestellt und 2 h bei Raumtemperatur gerührt. Der Niederschlag wurde abgesaugt, mit Wasser gewaschen und über Phosphorpentoxid im Hochvakuum getrocknet. Ausbeute: 27,37 g (96 %) farbloser Feststoff.

2b) ((R,S)-3-Benzyl-4-methyl-4-(4-nitro-phenyl)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-essigsäure

[0110] Die Verbindung wurde analog Beispiel 1 durch Umsetzung von (R,S)-4-Methyl-4-(4-nitro-phenyl)-2,5-dioxoimidazolidin mit Bromessigsäuremethylester und anschließend Benzylbromid (an Stelle von 2-Brommethylnaphtha-

## EP 0 842 945 B1

lin) und Spaltung des Methylesters mit 6 N Salzsäure hergestellt.

2c) ((R,S)-3-Benzyl-4-methyl-4-(4-nitro-phenyl)-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin

5 **[0111]** Eine Lösung von 383 mg (1 mmol) ((R,S)-3-Benzyl-4-methyl-4-(4-nitro-phenyl)-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure, 414 mg (1 mmol) H-Asp(O<sup>t</sup>Bu)-Phg-(O<sup>t</sup>Bu) x HCl und 135 mg (1 mmol) HOBt in 5 ml absolutem DMF wurde bei 0 °C mit 220 mg (1,1 mmol) DCC versetzt. Nach 60 Minuten Rühren bei 0 °C und 60 Minuten bei Raumtemperatur wurde der Niederschlag abgesaugt, das Filtrat eingengt und der Rückstand in Essigester aufgenommen. Die Essigester-Lösung wurde nach Filtration nacheinander mit gesättigter NaHCO<sub>3</sub>-Lösung, KHSO<sub>4</sub>/K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lösung, gesättigter NaHCO<sub>3</sub>-Lösung und Wasser gewaschen. Nach Phasentrennung wurde die organische Phase über Natriumsulfat getrocknet. Das Trockenmittel wurde abfiltriert, das Lösungsmittel im Vakuum entfernt und der Rückstand mit Dichlormethan/Essigester (9:1) über Kieselgel chromatographiert. Nach Einengen der Produktfraktionen wurde der Rückstand mit 10 ml 90-%iger Trifluoressigsäure versetzt. Nach 1 h bei Raumtemperatur wurde die Trifluoressigsäure im Vakuum entfernt und der Rückstand mit Dichlormethan/Methanol/Essigsäure/Wasser (9:1:0,1:0,1) über Kieselgel und anschließend mit Wasser/Butanol/Essigsäure (43:4,3:3,5) über Sephadex LH20 chromatographiert. Nach Gefriertrocknen der Produktfraktionen erhielt man 23 mg (4 %) der Titelverbindung.  
ES(+)-MS: 632 (M+H)<sup>+</sup>

Beispiel 3


20 ((R,S)-3-Senzy-4-methyl-4-(4-(3-(2-methyl-phenyl)-ureido)-phenyl)-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin

**[0112]**

25

30

35



40

3a) ((R,S)-3-Benzyl-4-methyl-4-(4-nitro-phenyl)-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester

**[0113]** Die Verbindung wurde analog Beispiel 1 aus (R,S)-4-Methyl-(4-nitro-phenyl)-2,5-dioximidazolidin (synthetisiert aus 4-Nitroacetophenon wie in Beispiel 2 beschrieben) hergestellt.

45

3b) ((R,S)-4-(4-Amino-phenyl)-3-benzyl-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester

50 **[0114]** Eine Lösung von 8,92 g (22,45 mmol) an ((R,S)-3-Benzyl-4-methyl-4-(4-nitrophenyl)-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester in 280 ml absolutem Methanol wurde mit 17 g (90 mmol) Zinnchlorid und 3 Tropfen Essigsäure versetzt und bei 50 °C erhitzt. Nachdem laut HPLC-Kontrolle kein Edukt mehr nachweisbar war wurde das Reaktionsgemisch im Vakuum eingengt und der Rückstand mit Methanol über Kieselgel filtriert. Nach Einengen erhielt man 6,39 g (78 %) der Titelverbindung.

55 3c) ((R,S)-3-Benzyl-4-methyl-4-(4-(3-(2-methyl-phenyl)-ureido)-phenyl)-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester

**[0115]** Man gab zu einer Lösung von 2,5 g (6,8 mmol) an ((R,S)-4-(4-Amino-phenyl)-3-benzyl-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester in 20 ml THF 0,91 g (6,8 mmol) ortho-Tolylisocyanat in 2 ml THF. Nach 5 h

## EP 0 842 945 B1

Erhitzen unter Rückfluß ließ man das Reaktionsgemisch über Nacht bei Raumtemperatur stehen, gab weitere 0,18 g (1,36 mmol) ortho-Tolylisocyanat zu und ließ 3 h unter Rückfluß rühren. Das Reaktionsgemisch wurde eingengt und der Rückstand mit Heptan/Essigester (1:1) mittels MPLC über Kieselgel gereinigt. Nach Einengen der Produktfraktionen erhielt man 1,35 g (40 %) der Titelverbindung.

3d) ((R,S)-3-benzyl-4-methyl-4-(4-(3-(2-methyl-phenyl)-ureido)-phenyl)-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin


[0116] Die Synthese erfolgte analog Beispiel 2 durch Kupplung von ((R,S)-3-Benzyl-4-methyl-4-(4-(3-(2-methyl-phenyl)-ureido)-phenyl)-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure (hergestellt durch Spaltung von ((R,S)-3-Benzyl-4-methyl-4-(4-(3-(2-methyl-phenyl)-ureido)-phenyl)-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester mit 6 N Salzsäure analog Beispiel 1) und H-Asp(O<sup>t</sup>Bu)-Phg-(O<sup>t</sup>Bu) x HCl. Nach Spaltung des tert-Butylesters mit 90-%iger Trifluoressigsäure wurde das Rohprodukt durch präparative HPLC über RP-18 gereinigt.

ES(+)-MS: 735 (M+H)<sup>+</sup>

Beispiel 4

((R,S)-3-Benzyl-4-(4-(3-benzyl-ureido-methyl)-phenyl)-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin

[0117]



4a) ((R,S)-3-Benzyl-4-(4-cyanophenyl)-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester

[0118] 28,7 g (100 mmol) ((R,S)-4-(4-Cyanophenyl)-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester wurden unter Argon in 160 ml wasserfreiem DMF gelöst. Bei 0 °C wurden unter Rühren portionsweise 5,28 g (110 mmol) NaH zugegeben. Man rührte 30 Minuten bei 0 °C nach. Anschließend tropfte man langsam 13 ml Benzylbromid zu. Man rührte 5 Stunden bei Raumtemperatur und ließ über Nacht bei Raumtemperatur stehen. Die fast klare Lösung wurde abgesaugt und am Hochvakuum eingengt. Der Rückstand wurde in Essigester gelöst, mit Wasser gewaschen und die wässrige Phase mit Essigester gewaschen. Die vereinigten organischen Phasen wurden mit Wasser gewaschen, mit wasserfreiem Magnesiumsulfat getrocknet und eingengt. Zur Reinigung wurde das Rohprodukt über Kieselgel (70-200 µm) in n-Heptan/Essigester (1:1) chromatographiert. Man erhielt 35,7 g (94,6 %) der Titelverbindung als Öl.

4b) ((R,S)-4-(4-(Aminomethyl)-phenyl)-3-benzyl-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester

[0119] 15,2 g (40 mmol) ((R,S)-3-Benzyl-4-(4-cyanophenyl)-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester (4a) wurden in 160 ml eines Gemisches aus Ethanol und 50-%iger Essigsäure (8:2) gelöst, mit 3 g Pd/Kohle versetzt und 7 Stunden im Autoklaven bei 3 bar H<sub>2</sub> hydriert. Der Katalysator wurde abgesaugt und das Filtrat eingengt.

## EP 0 842 945 B1

Der Rückstand wurde in Dichlormethan gelöst und über Kieselgel (70-200 µm) unter Verwendung von Dichlormethan und anschließend Dichlormethan/Methanol (8:2) chromatographiert. Man erhielt 15,3 g (100 %) der Titelverbindung.

4c) ((R,S)-3-Benzyl-4-(4-(3-benzyl-ureido-methyl)-phenyl)-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester

[0120] 3,80 g (10 mmol) ((R,S)-4-(4-(Aminomethyl)-phenyl)-3-benzyl-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester (4b) wurden unter Argon in 20 ml wasserfreiem Dichlormethan gelöst. Dazu gab man 1,85 ml (2 g; 15mmol) Benzylisocyanat und 2 Tropfen Triethylamin zu. Man rührte bei Raumtemperatur 2 Stunden und engte die Lösung etwas ein. Es wurde mit Essigester verdünnt und 2x mit 5-%iger Zitronensäure, 2x mit gesättigter NaHCO<sub>3</sub>-Lösung und 1x mit Wasser/NaCl-Lösung gewaschen. Man trocknete über wasserfreiem Natriumsulfat und engte ein. Man erhielt 5,09 g (98,9 %) der Titelverbindung als Öl.

4d) ((R,S)-3-Benzyl-4-(4-(3-benzyl-ureido-methyl)-phenyl)-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure

[0121] 1 g (1,94 mmol) ((R,S)-3-Benzyl-4-(4-(3-benzyl-ureido-methyl)-phenyl)-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure-methylester (4c) wurden mit 20 ml konzentrierter Salzsäure 5 Stunden zum Rückfluß erhitzt. Anschließend engte man ein. Der Rückstand wurde mit Wasser verrieben, gekühlt und abgesaugt. Man erhielt 700 mg (72 %) der Titelverbindung.

4e) ((R,S)-3-Benzyl-4-(4-(3-benzyl-ureido-methyl)-phenyl)-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin-di-tert-butylester

[0122] 500 mg (1 mmol) ((R,S)-3-Benzyl-4-(4-(3-benzyl-ureido-methyl)-phenyl)-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-essigsäure (4d), 414,9 mg (1 mmol) H-Asp(O<sup>t</sup>Bu)-Phg-(O<sup>t</sup>Bu) x HCl und 135 mg (1 mmol) HOBt wurden in 10 ml absolutem DMF gelöst. Bei 0°C gab man 0,13 ml (1 mmol) N-Ethylmorpholin und 220 mg (1,1 mmol) DCC zu. Es wurde 1 Stunde bei 0°C und 3 Stunden bei Raumtemperatur gerührt. Man ließ über Nacht bei Raumtemperatur stehen, saugte den Harstoff-Niederschlag ab und engte am Hochvakuum ein. Der Rückstand wurde in Essigester aufgenommen, mit gesättigter NaHCO<sub>3</sub>-Lösung, KHSO<sub>4</sub>/K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-Lösung sowie mit Wasser/NaCl-Lösung gewaschen. Die organische Phase wurde mit wasserfreiem Natriumsulfat getrocknet, eingeeengt und der ölige Rückstand am Hochvakuum getrocknet. Man erhielt 800 mg (92,9 %) der Titelverbindung.

4f) ((R,S)-3-Benzyl-4-(4-(3-benzyl-ureido-methyl)-phenyl)-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin


[0123] 800 mg (0,93 mmol) ((R,S)-3-Benzyl-4-(4-(3-benzyl-ureido-methyl)-phenyl)-4-methyl-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin-di-tert-butylester (4e) wurden in 8 ml 90-%iger Trifluoressigsäure gelöst und 1 Stunde bei Raumtemperatur stehen gelassen. Anschließend wurde eingeeengt und der Rückstand mit Diethylether verrieben. Das Rohprodukt wurde durch Chromatographie über Kieselgel mit Dichlormethan/Methanol/Essigsäure/Wasser (9:1:0,1:0,1) gereinigt. Man erhielt 527 mg (76 %) der Titelverbindung.  
ES(+)-MS: 749,3 (M+H)<sup>+</sup>

## EP 0 842 945 B1

## Beispiel 5

((R,S)-3-Benzyl-4-methyl-4-(4-(3-(phenyl-ureido)-methyl)-phenyl)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin

[0124]




[0125] Die Synthese erfolgte analog Beispiel 4. Nach Spaltung des tert-Butylesters mit 90-%iger Trifluoressigsäure wurde das Rohprodukt durch Chromatographie über Kieselgel mit Dichlormethan/Methanol/Essigsäure/Wasser (9:1:0,1:0,1) gereinigt.

ES(+)-MS: 735,2 (M+H)<sup>+</sup>

## Beispiel 6

((R, S)-3-Benzyl-4-methyl-4-(4-(3-(2-methyl-phenyl)-ureido-methyl)-phenyl)-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin

[0126]



[0127] Die Synthese erfolgte analog Beispiel 4. Nach Spaltung des tert-Butylesters mit 90 %iger Trifluoressigsäure wurde das Rohprodukt durch Chromatographie über Kieselgel mit Dichlormethan/Methanol/Essigsäure/Wasser (9:1:0,1:0,1) gereinigt.

ES(+)-MS: 749,3 (M+H)<sup>+</sup>




## EP 0 842 945 B1

## Beispiel 7

((R,S)-3-Benzyl-4-methyl-4-(4-(3-(2-phenylethyl)-ureido-methyl)-phenyl)-2,5-dioximidazolidin-1-yl)-acetyl-L-aspartyl-L-phenylglycin

[0128]



[0129] Die Synthese erfolgte analog Beispiel 4. Nach Spaltung des tert-Butylesters mit 90-%iger Trifluoressigsäure wurde das Rohprodukt durch Chromatographie über Kieselgel mit Dichlormethan/Methanol/Essigsäure/Wasser (9:1:0,1:0,1) gereinigt.

ES(+)-MS: 763,3 (M+H)<sup>+</sup>

Untersuchung der biologischen Aktivität

[0130] Als Testmethode für die Wirksamkeit der Verbindungen der Formel Ib auf die Interaktion zwischen VCAM-1 und VLA-4 wird ein Assay verwendet, der für diese Interaktion spezifisch ist. Die zellulären Bindungspartner, d. h. die VLA-4-Integrine, werden in ihrer natürlichen Form als Oberflächenmoleküle auf humanen U937-Zellen (ATCC CRL 1593), die zur Gruppe der Leukozyten gehören, angeboten. Als spezifische Bindungspartner werden gentechnisch hergestellte rekombinante lösliche Fusionsproteine, bestehend aus der extrazytoplasmatischen Domäne von humanen VCAM-1 und der konstanten Region eines humanen Immunglobulins der Subklasse IgG1, verwendet.

Testmethode :

Assay zur Messung der Adhäsion von U937-Zellen (ATCC CRL 1593) an hVCAM-1(1-3)-IgG

[0131]

#### 1. Herstellung von humanem VCAM-1(1-3)-IgG und humanem CD4-IgG

Eingesetzt wurde ein genetisches Konstrukt zur Expression der extrazellulären Domäne des humanen VCAM-1, verbunden mit der genetischen Sequenz der schweren Kette des humanen Immunglobulins IgG1 (Hinge, CH2 und CH3 Regionen), von Dr. Brian Seed, Massachusetts General Hospital, Boston, USA. Das lösliche Fusionsprotein hVCAM-1(1-3)-IgG enthielt die drei aminoterminalen extrazellulären Immunglobulin-ähnlichen Domänen des humanen VCAM-1 (Damle und Aruffo, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 1991, 88, 6403). CD4-IgG (Zettlmeissl et al., DNA and Cell Biology 1990, 9, 347) diente als Fusionsprotein für negative Kontrollen. Die rekombinanten Proteine wurden als lösliche Proteine nach DEAE/Dextran-vermittelter DNA-Transfektion in COS-Zellen (ATCC CRL 1651) gemäß Standardprozeduren exprimiert (Ausubel et al., Current protocols in molecular biology, John Wiley & Sons, Inc., 1994).

#### 2. Assay zur Messung der Adhäsion von U937-Zellen an hVCAM-1(1-3)-IgG

**EP 0 842 945 B1**

2.1 96 well-Mikrotitertestplatten (Nunc Maxisorb) wurden mit 100 µl/well einer Ziege-anti-human-fgG-Antikörperlösung (10 µg/ml in 50 mM Tris, pH 9,5) 1 Stunde bei Raumtemperatur inkubiert. Nach Entfernen der Antikörperlösung wurde einmal mit PBS gewaschen.

2.2 150 µl/well eines Blockierungspuffers (1 % BSA in PBS) wurde 0,5 Stunden bei Raumtemperatur auf den Platten inkubiert. Nach Entfernen des Blockierungspuffers wurde einmal mit PBS gewaschen.

2.3 100 µl pro well eines Zellkulturüberstandes von transfektierten COS-Zellen wurde für 1,5 Stunden bei Raumtemperatur auf den Platten inkubiert. Die COS-Zellen waren mit einem Plasmid transfiziert, welches für die drei N-terminalen Immunglobulin-ähnlichen Domänen des VCAM-1, gekoppelt an den Fc-Teil von humanem IgG<sub>1</sub> (hVCAM-1(1-3)-IgG), codiert. Der Gehalt an hVCAM-1(1-3)-IgG betrug ca. 0,5 - 1 µg/ml. Nach Entfernen des Kulturüberstandes wurde einmal mit PBS gewaschen.

2.4 Die Platten wurden mit 100 µl/well Fc-Rezeptor-Blockpuffer (1 mg/ml γ-Globulin, 100 mM NaCl, 100 µM MgCl<sub>2</sub>, 100 µM MnCl<sub>2</sub>, 100 µM CaCl<sub>2</sub>, 1 mg/ml BSA in 50 mM HEPES, pH 7,5) für 20 Minuten bei Raumtemperatur inkubiert. Nach Entfernen des Fc-Rezeptor-Blockpuffers wurde einmal mit PBS gewaschen.

2.5 20 µl Bindungspuffer (100 mM NaCl, 100 µM MgCl<sub>2</sub>, 100 µM MnCl<sub>2</sub>, 100 µM CaCl<sub>2</sub>, 1 mg/ml BSA in 50 mM HEPES, pH 7,5) wurden vorgelegt, die zu testenden Substanzen in 10 µl Bindungspuffer zugegeben und für 20 Minuten inkubiert. Als Kontrollen dienten Antikörper gegen VCAM-1 (BBT, Nr. BBA6) und gegen VLA-4 (Immunotech, Nr. 0764).

2.6 U937-Zellen wurden 20 Minuten in Fc-Rezeptor-Blockpuffer inkubiert und anschließend in einer Konzentration von  $1 \times 10^6$ /ml und in einer Menge von 100 µl pro well zupipettiert (Endvolumen 125 µl/well).

2.7 Die Platten wurden in einem 45°-Winkel in Stoppuffer (100 mM NaCl, 100 µM MgCl<sub>2</sub>, 100 µM MnCl<sub>2</sub>, 100 µM CaCl<sub>2</sub> in 25 mM Tris, pH 7,5) langsam eingetaucht und ausgeschlagen. Der Vorgang wurde wiederholt.

2.8 Anschließend wurden 50 µl/well einer Färbelösung (16,7 µg/ml Hoechst Farbstoff 33258, 4 % Formaldehyd, 0,5 % Triton-X-100 in PBS) 15 Minuten auf den Platten inkubiert.

2.9 Die Platten wurden ausgeschlagen, in einem 45°-Winkel in Stoppuffer (100 mM NaCl, 100 µM MgCl<sub>2</sub>, 100 µM MnCl<sub>2</sub>, 100 µM CaCl<sub>2</sub> in 25 mM Tris, pH 7,5) langsam eingetaucht. Der Vorgang wurde wiederholt. Anschließend wurde mit der Flüssigkeit in einem Cytofluorimeter (Millipore) gemessen (Sensitivität: 5, Filter: Anregungswellenlänge: 360 nm, Emissionswellenlänge: 460 nm).

[0132] Die Intensität des von den angefärbten U937-Zellen emittierten Lichts ist ein Maß für die Zahl der an der Platte verbliebenen, an das hVCAM-1(1-3)-IgG adhären U937-Zellen und somit ein Maß für die Fähigkeit der zugesetzten Testsubstanz, diese Adhäsion zu hemmen. Aus der Hemmung der Adhäsion bei verschiedenen Konzentrationen der Testsubstanz wurde die Konzentration IC<sub>50</sub> berechnet, die zu einer Hemmung der Adhäsion um 50 % führt.


[0133] Es wurden die folgenden Testergebnisse erhalten:

Beispiel	U937/VCAM-1 Zelladhäsionstest IC <sub>50</sub> (µM)
1	30
2	27,7
3	2,8
4	14
5	9
6	6,5
7	20

**Patentansprüche**

1. Verbindungen der Formel I,

## EP 0 842 945 B1



10


worin

- W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) oder R<sup>1</sup>-A-CH=C steht;
- Y für eine Carbonyl-, Thiocarbonyl- oder Methylengruppe steht;
- 15 Z für N(R<sup>0</sup>), Sauerstoff, Schwefel oder eine Methylengruppe steht;
- A einen zweiwertigen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-(C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, Phenyl-, Phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-phenyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, Phenyl-(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl oder einen zweiwertigen Rest eines 5- oder 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Ringes, der 1 oder 2 Stickstoffatome enthalten und ein- oder zweifach durch (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl oder doppelt gebundenen Sauerstoff oder Schwefel substituiert sein kann, bedeutet oder für eine direkte
- 20 Bindung steht;
- B einen zweiwertigen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkenyl-, Phenyl-, Phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-Alkyl-phenyl bedeutet, wobei der zweiwertige (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-Rest unsubstituiert oder durch einen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl-, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl-, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl-, (C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>)-Cycloalkyl-, (C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl und im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl substituiert sein kann;
- 25 D für C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>), N(R<sup>3</sup>) oder CH=C(R<sup>3</sup>) steht;
- E Tetrazolyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), HOS(O)<sub>2</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> oder R<sup>10</sup>CO bedeutet;
- 30 R Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl-, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor ein- oder mehrfach substituiert sein können;
- R<sup>0</sup> für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl-, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, CHO, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl-CO, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-CO, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-CO, -(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-CO, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-CO, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-S(O)<sub>n</sub>, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-S(O)<sub>n</sub> oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub> steht, wobei n für 1 oder 2 steht;
- 35 R<sup>1</sup> einen der Reste -S-R<sup>21</sup>, -S-S-R<sup>21</sup>, -S(O)-R<sup>22</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -S-OR<sup>21</sup>, -S(O)-OR<sup>21</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -S-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(O)-R<sup>21</sup>, -S-C(O)-OR<sup>22</sup>, -S-C(S)-SR<sup>22</sup>, -S-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(S)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -O-S(O)-R<sup>22</sup>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>
- 50
- 55

## EP 0 842 945 B1

$-R^{28}$ ,  $-P(O)(R^{22})_2$ ,  $-C(S)-R^{21}$ ,  $-C(S)-SR^{21}$ ,  $-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,

Cyano, Halogen, Nitro oder Methylendioxy bedeutet oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel



steht, in der

Q<sup>1</sup> für  $-C(R^{21})_2$ ,  $=C(R^{21})$ ,  $-N(R^{28})$ ,  $-O$ - oder  $-S$ - steht;

Q<sup>2</sup> für  $-S(O)-$  oder  $-S(O)_2-$  steht;

Q<sup>3</sup> für  $-C(R^{21})_2$ ,  $=C(R^{21})$ ,  $-N(R^{28})$ ,  $-O$ -,  $-S$ -,  $-C(R^{21})(-)$ - oder  $-N(-)$ - steht,

wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q<sup>3</sup> stehenden Gruppen  $-C(R^{21})(-)$ - oder  $-N(-)$ - oder über ein beliebiges anderes Ring-Kohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und

wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;

R<sup>2</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;

R<sup>3</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenylcarbonyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynylcarbonyl, Pyridyl, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>15</sup> oder CONHR<sup>15</sup> bedeutet;

R<sup>4</sup> Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>28</sub>)-Alkyl bedeutet, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe Hydroxy, Hydroxycarbonyl, Aminocarbonyl, Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-aminocarbonyl, Amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, Amino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl-phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonylamino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylphenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonylamino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxycarbonyl, das im Arylrest auch substituiert sein kann, Amino, Mercapto, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxycarbonyl, Het-CO, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, HOS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (R<sup>9</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, Tetrazolyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, Halogen, Nitro, Trifluormethyl und den Rest R<sup>5</sup> substituiert sein kann;

R<sup>5</sup> gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, einen mono- oder bicyclischen 5- bis 12-gliedrigen heterocyclischen Ring, der aromatisch, teilhydriert oder vollständig hydriert sein kann und der ein, zwei oder drei gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann, einen Rest R<sup>6</sup> oder einen Rest R<sup>6</sup>CO- bedeutet, wobei der Aryl- und unabhängig davon der Heterozyklus-Rest ein- oder mehrfach durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino oder Trifluormethyl substituiert sein können;

R<sup>6</sup> für R<sup>7</sup>R<sup>8</sup>N, R<sup>7</sup>O oder R<sup>7</sup>S steht oder eine Aminosäureseitenkette, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu  $-NH-CH_2-$  reduziert sein kann, sowie deren Ester und Amide bedeutet, wobei anstelle freier funktioneller Gruppen gegebenenfalls Wasserstoff oder Hydroxymethyl stehen kann und/oder wobei freie funktionelle Gruppen durch in der Peptidchemie übliche Schutzgruppen geschützt sein können;

R<sup>7</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxycarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylcarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylcarbonyl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyloxycarbonyl, wobei die Alkylgruppen gegebenenfalls durch eine Aminogruppe substituiert und/oder wobei die Arylreste ein- oder mehrfach, vorzugsweise einfach, durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino und Trifluormethyl substituiert sein können, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu  $-NH-CH_2-$  reduziert sein kann, bedeutet;

R<sup>8</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl,

## EP 0 842 945 B1

- das im Arylrest auch substituiert sein kann, bedeutet;
- R<sup>9</sup> Wasserstoff, Aminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylaminocarbonyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkylaminocarbonyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;
- 5 R<sup>10</sup> Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, das im Arylrest auch substituiert sein kann, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryloxy, Amino oder Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino bedeutet;
- R<sup>11</sup> für Wasserstoff, R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, H-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO, R<sup>12b</sup>-CS, R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub> oder R<sup>12b</sup>-S(O)<sub>2</sub> steht;
- R<sup>12a</sup> (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder den Rest R<sup>15</sup> bedeutet;
- R<sup>12b</sup> Amino, Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino oder R<sup>12a</sup>-NH bedeutet;
- R<sup>13</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet;
- 15 R<sup>15</sup> für R<sup>16</sup>-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl oder für R<sup>16</sup> steht;
- R<sup>16</sup> für einen 6- bis 24-gliedrigen bicyclischen oder tricyclischen Rest steht, der gesättigt oder teilweise ungesättigt ist und der auch ein, zwei, drei oder vier gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann und der auch durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Oxo substituiert sein kann;
- 20 R<sup>21</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste R<sup>21</sup> bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;
- 25 R<sup>22</sup> (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, -alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste R<sup>22</sup> bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;
- 30 R<sup>28</sup> für einen der Reste R<sup>21</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- oder R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))- steht;
- R<sup>29</sup> für einen der Reste R<sup>22</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- oder R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))- steht;
- Het für den Rest eines über ein Stickstoffatom gebundenen 5- bis 10-gliedrigen, monocyclischen oder polycyclischen Heterocyclus steht, der aromatisch oder teilweise ungesättigt oder gesättigt sein kann und der ein, zwei, drei oder vier gleiche oder verschiedene zusätzliche Ring-Heteroatome aus der Reihe Sauerstoff, Stickstoff und Schwefel enthalten kann und der an Kohlenstoffatomen und an zusätzlichen Ring-Stickstoffatomen gegebenenfalls substituiert sein kann, wobei an zusätzlichen Ring-Stickstoffatomen gleiche oder verschiedene Reste R<sup>h</sup>, R<sup>h</sup>CO oder R<sup>h</sup>O-CO als Substituenten stehen können und R<sup>h</sup> für Wasserstoff,
- 40 (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl steht;

b, c, d und f unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen, aber nicht alle gleichzeitig 0 sein können;

e, g und h unabhängig voneinander für 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 stehen;

45 in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze;

wobei aber, wenn gleichzeitig W für 4-Cyanophenyl-C(R<sup>13</sup>) steht, Y für eine Carbonylgruppe steht, Z für NR<sup>0a</sup> steht, B für eine unsubstituierte Methylengruppe steht, R für R<sup>a</sup> steht, b, c und d für 1 stehen und e, f und g für 0 stehen, dann nicht D für C(R<sup>2a</sup>)(R<sup>3a</sup>) stehen kann, wobei

50

R<sup>0a</sup>, R<sup>a</sup> und R<sup>2a</sup> unabhängig voneinander für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl stehen und


55

R<sup>3a</sup> für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl oder 2-, 3- oder 4-Pyridyl steht.

## 2. Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, worin

## EP 0 842 945 B1

- W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) oder R<sup>1</sup>-A-CH=C steht;  
 Y für eine Carbonyl-, Thiocarbonyl- oder Methylengruppe steht;  
 Z für N(R<sup>0</sup>), Sauerstoff, Schwefel oder eine Methylengruppe steht;  
 A einen zweiwertigen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-  
 5 len-(C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, Phenyl, Phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-phenyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, Phenyl-(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl oder einen zweiwertigen Rest eines 5- oder 6-glied-  
 rigen gesättigten oder ungesättigten Ringes, der 1 oder 2 Stickstoffatome enthalten und ein- oder  
 zweifach durch (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl oder doppelt gebundenen Sauerstoff oder Schwefel substituiert sein  
 kann, bedeutet oder für eine direkte Bindung steht;  
 10 B einen zweiwertigen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkenyl, Phenyl, Phenyl-  
 len-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-Alkyl-phenyl bedeutet;  
 D für C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>), N(R<sup>3</sup>) oder CH=C(R<sup>3</sup>) steht;  
 E Tetrazolyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), HOS(O)<sub>2</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> oder R<sup>10</sup>CO bedeutet;  
 R und R<sup>0</sup> unabhängig voneinander Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloal-  
 15 kyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  
 (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest ge-  
 gebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl bedeuten, wobei Alkylreste durch Fluor ein- oder  
 mehrfach substituiert sein können;  
 R<sup>1</sup> einen der Reste -S-R<sup>21</sup>, -S-S-R<sup>21</sup>, -S(O)-R<sup>22</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -S-OR<sup>21</sup>, -S(O)-OR<sup>21</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -S-N  
 20 (R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(O)-R<sup>21</sup>, -S-C(O)-OR<sup>22</sup>, -S-C(S)-SR<sup>22</sup>, -S-C(O)-  
 -N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(S)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
 -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
 -O-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -O-S(O)-R<sup>22</sup>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N  
 25 (R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N  
 (R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S  
 (O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)  
 (OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -N  
 (R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)  
 (OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-SR<sup>21</sup>,  
 30 -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
 Cyano, Halogen, Nitro oder Methylendioxy bedeutet oder für den Rest eines gegebenenfalls substi-  
 tuierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocycli-  
 schen Rings der Formel



- steht, in der  
 Q<sup>1</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- oder -S- steht;  
 Q<sup>2</sup> für -S(O)- oder -S(O)<sub>2</sub>- steht;  
 45 Q<sup>3</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- steht,  
 wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q<sup>3</sup> stehenden Gruppen -C(R<sup>21</sup>)(-)-  
 oder -N(-)- oder über ein beliebiges anderes Ring-Kohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein  
 kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem  
 gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in  
 50 der Gruppe A anelliert sein kann;  
 R<sup>2</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls  
 substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;  
 R<sup>3</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls  
 substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>6</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl-,  
 55 (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkenylcarbonyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylcarbonyl, Pyridyl, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup>,  
 CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>15</sup> oder CONHR<sup>15</sup> bedeutet;  
 R<sup>4</sup> Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>28</sub>)-Alkyl bedeutet, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach durch gleiche oder  
 verschiedene Reste aus der Reihe Hydroxy, Hydroxycarbonyl, Aminocarbonyl, Mono- oder

## EP 0 842 945 B1

- Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-aminocarbonyl, Amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, Amino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl-phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonylamino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylphenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonylamino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxycarbonyl, das im Arylrest auch substituiert sein kann, Amino, Mercapto, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxycarbonyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, HOS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, Tetrazolyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, Halogen, Nitro, Trifluormethyl und den Rest R<sup>5</sup> substituiert sein kann;
- R<sup>5</sup> gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, einen mono- oder bicyclischen 5- bis 12-gliedrigen heterocyclischen Ring, der aromatisch, teilhydriert oder vollständig hydriert sein kann und der ein, zwei oder drei gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann, einen Rest R<sup>6</sup> oder einen Rest R<sup>6</sup>CO- bedeutet, wobei der Aryl- und unabhängig davon der Heterozyklus-Rest ein- oder mehrfach durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino oder Trifluormethyl substituiert sein können;
- R<sup>6</sup> für R<sup>7</sup>R<sup>8</sup>N, R<sup>7</sup>O oder R<sup>7</sup>S steht oder eine Aminosäureseitenkette, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu -NH-CH<sub>2</sub>- reduziert sein kann, sowie deren Ester und Amide bedeutet, wobei anstelle freier funktioneller Gruppen gegebenenfalls Wasserstoff oder Hydroxymethyl stehen kann und/oder wobei freie funktionelle Gruppen durch in der Peptidchemie übliche Schutzgruppen geschützt sein können;
- R<sup>7</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxycarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylcarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylcarbonyl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylloxycarbonyl, wobei die Alkylgruppen gegebenenfalls durch eine Aminogruppe substituiert und/oder wobei die Arylreste ein- oder mehrfach, vorzugsweise einfach, durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino und Trifluormethyl substituiert sein können, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu -NH-CH<sub>2</sub>- reduziert sein kann, bedeutet;
- R<sup>8</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, das im Arylrest auch substituiert sein kann, bedeutet;
- R<sup>9</sup> Wasserstoff, Aminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylaminocarbonyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkylaminocarbonyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;
- R<sup>10</sup> Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, das im Arylrest auch substituiert sein kann, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryloxy, Amino oder Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino bedeutet;
- R<sup>11</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, R<sup>12</sup>CO, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-S(O)<sub>2</sub>, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>2</sub>, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> oder den Rest R<sup>15</sup> bedeutet;
- R<sup>12</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, das im Arylrest auch substituiert sein kann, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryloxy, Amino oder Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino, den Rest R<sup>15</sup> oder den Rest R<sup>15</sup>-O- bedeutet;
- R<sup>13</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;
- R<sup>15</sup> für R<sup>16</sup>-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl oder für R<sup>16</sup> steht;
- R<sup>16</sup> für einen 6- bis 24-gliedrigen bicyclischen oder tricyclischen Rest steht, der gesättigt oder teilweise ungesättigt ist und der auch ein bis vier gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann und der auch durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Oxo substituiert sein kann;
- R<sup>21</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste R<sup>21</sup> bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;

## EP 0 842 945 B1

- $R^{22}$   $(C_1-C_8)$ -Alkyl, Hydroxy- $(C_1-C_8)$ -alkyl,  $(C_2-C_8)$ -Alkenyl,  $(C_3-C_{12})$ -Cycloalkyl,  $(C_3-C_{12})$ -Cycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl, gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste  $R^{22}$  bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;
- $R^{28}$  für einen der Reste  $R^{21}$ -,  $R^{21}N(R^{21})$ -,  $R^{21}C(O)$ -,  $R^{22}O-C(O)$ -,  $R^{21}N(R^{21})-C(O)$ - oder  $R^{21}N(R^{21})-C(=N(R^{21}))$ - steht;
- $R^{29}$  für einen der Reste  $R^{22}$ -,  $R^{21}N(R^{21})$ -,  $R^{21}C(O)$ -,  $R^{22}O-C(O)$ -,  $R^{21}N(R^{21})-C(O)$ - oder  $R^{21}N(R^{21})-C(=N(R^{21}))$ - steht;


b, c, d und f unabhängig voneinander für 0 oder 1 stehen, aber nicht alle gleichzeitig 0 sein können;

e, g und h unabhängig voneinander für 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 stehen;

in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.

3. Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1 und/oder 2, worin  $R^1$  für einen der Reste

- $-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,  $-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-O-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-N(R^{29})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-R^{21}$ ,  
 $-N(R^{28})-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-N(R^{28})-S(O)_2-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)_2-OR^{21}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-OR^{21}$ ,  
 $-N(R^{28})-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-C(S)-R^{21}$ ,  $-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$  oder Cyano steht oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel



steht, in der

$Q^1$  für  $-C(R^{21})_2$ -,  $=C(R^{21})$ -,  $-N(R^{28})$ -,  $-O$ - oder  $-S$ - steht;

$Q^2$  für  $-S(O)$ - oder  $-S(O)_2$ - steht;

$Q^3$  für  $-C(R^{21})_2$ -,  $=C(R^{21})$ -,  $-N(R^{28})$ -,  $-O$ -,  $-S$ -,  $-C(R^{21})(-)$ - oder  $-N(-)$ - steht,

wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für  $Q^3$  stehenden Gruppen  $-C(R^{21})(-)$ - oder  $-N(-)$ - oder über ein beliebiges anderes Ringkohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;

in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.

4. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, worin  $R^0$  für  $(C_1-C_8)$ -Alkyl,  $(C_3-C_{12})$ -Cycloalkyl,  $(C_3-C_{12})$ -Cycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl, gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl, bevorzugt für unsubstituiertes oder im Arylrest einfach oder mehrfach substituiertes Biphenylmethyl, Naphthylmethyl oder Benzyl steht;

in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.

5. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1, 3 und 4, worin gleichzeitig W für  $R^1-A-CH=C$  und darin A für einen Phenylrest oder einen Methylphenylrest steht oder W für  $R^1-A-C(R^{13})$  und darin A für einen zweiwertigen Rest aus der Reihe Methylen, Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, Cyclohexylen, Phenylen, Phenylenmethyl, Methylenphenyl, Methylenphenylmethyl steht; B für einen zweiwertigen Rest aus der Reihe Methylen, Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Vinylen, Phenylen



## EP 0 842 945 B1

oder für substituiertes Methylen oder Ethylen steht;

E R<sup>10</sup> CO bedeutet;

R Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl oder Benzyl bedeutet;

R<sup>0</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl steht;

R<sup>1</sup> für einen der Reste -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

-O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

-O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,


-N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>,

-N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

-N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>,

-N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

-C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> oder Cyano steht oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel



steht, in der

Q<sup>1</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- oder -S- steht;

Q<sup>2</sup> für -S(O)- oder -S(O)<sub>2</sub>- steht;

Q<sup>3</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- steht,

wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q<sup>3</sup> stehenden Gruppen -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- oder über ein beliebiges anderes Ringkohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;

R<sup>2</sup> für Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl steht;

R<sup>3</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Pyridyl, R<sup>11</sup> NH,

R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup> und CONHR<sup>15</sup> steht;

und e, g und h unabhängig voneinander für die Zahlen 0, 1, 2 oder 3 stehen;

in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.

6. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, worin W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) und R<sup>13</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl steht;

in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.

7. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 und 3 bis 6, worin R<sup>3</sup> für gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, für COOR<sup>4</sup>, für R<sup>11</sup>NH oder für CONHR<sup>4</sup> steht, wobei -NHR<sup>4</sup> für den Rest einer α-Aminosäure, für deren ω-Amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylamid, für deren (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylester, für deren (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylester oder für deren Derivat steht, in dem die Carbonsäuregruppe in die Gruppe Het-CO überführt ist, bevorzugt für den Rest der α-Aminosäuren Valin, Lysin, Phenylglycin, Phenylalanin oder Tryptophan oder deren (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkylester, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkylester oder Het-CO-Derivat, steht;

in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.

8. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 und 3 bis 7, worin gleichzeitig


W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) steht;

Y für eine Carbonylgruppe steht;

Z für N(R<sup>0</sup>) steht;

## EP 0 842 945 B1

- A für Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, Cyclohexylen, Phenylen, Phenylenmethyl, Methylenphenyl oder Methylenphenylmethyl steht;  
 B für einen unsubstituierten oder substituierten Methylenrest steht;  
 D für  $C(R^2)(R^3)$  steht;  
 5 E für  $R^{10}CO$  steht;  
 R für Wasserstoff oder  $(C_1-C_4)$ -Alkyl, insbesondere Wasserstoff, Methyl oder Ethyl, steht;  
 $R^0$  für  $(C_1-C_8)$ -Alkyl,  $(C_3-C_8)$ -Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl steht;  
 $R^1$  für einen der Reste  $-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,  $-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$  oder Cyano steht;  
 10  $R^2$  für Wasserstoff steht;  
 $R^3$  für den Rest  $CONHR^4$  steht;  
 $R^4$  für Methyl steht, das durch Hydroxycarbonyl und einen Rest aus der Reihe  $(C_1-C_4)$ -Alkyl, Phenyl und Benzyl substituiert ist, oder für Methyl steht, das durch  $(C_1-C_8)$ -Alkoxy, bevorzugt  $(C_1-C_4)$ -Alkoxy, und einen Rest aus der Reihe  $(C_1-C_4)$ -Alkyl, Phenyl und Benzyl substituiert ist, oder für Methyl steht, das durch Het-CO und einen Rest aus der Reihe  $(C_1-C_4)$ -Alkyl, Phenyl und Benzyl substituiert ist;  
 15  $R^{10}$  für Hydroxy oder  $(C_1-C_8)$ -Alkoxy, bevorzugt  $(C_1-C_4)$ -Alkoxy, steht;  
 $R^{13}$  für  $(C_1-C_8)$ -Alkyl,  $(C_3-C_7)$ -Cycloalkyl oder Benzyl, insbesondere Methyl, steht;  
 b, c und d für 1 stehen und e, f und g für 0 stehen;  
 20 h für 1 oder 2, bevorzugt für 1, steht;  
 in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.
9. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1, 3, 4 und 5, worin gleichzeitig  
 25 W für  $R^1-A-CH=C$  und darin A für einen Phenylenrest oder einen Methylenphenylrest steht oder W für  $R^1-A-C(R^{13})$  und darin A für einen zweiwertigen Rest aus der Reihe Methylen, Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, Cyclohexylen, Phenylen, Phenylenmethyl, Methylenphenyl, Methylenphenylmethyl steht;  
 B für einen zweiwertigen Rest aus der Reihe Methylen, Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Vinylen, Phenylen oder für substituiertes Methylen oder Ethylen steht;  
 30 E  $R^{10}CO$  bedeutet;  
 R Wasserstoff oder  $(C_1-C_8)$ -Alkyl bedeutet;  
 $R^0$  für  $(C_1-C_8)$ -Alkyl,  $(C_3-C_8)$ -Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl steht;  
 $R^1$  für einen der Reste  $-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 35  $-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,  $-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-O-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-N(R^{28})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-R^{21}$ ,  
 $-N(R^{28})-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-N(R^{28})-S(O)_2-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)_2-OR^{21}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-OR^{21}$ ,  
 40  $-N(R^{28})-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-C(S)-R^{21}$ ,  $-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$  oder Cyano steht oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel




- steht, in der  
 Q1 für  $-C(R^{21})_2-$ ,  $=C(R^{21})-$ ,  $-N(R^{28})-$ ,  $-O-$  oder  $-S-$  steht;  
 Q2 für  $-S(O)-$  oder  $-S(O)_2-$  steht;  
 Q3 für  $-C(R^{21})_2-$ ,  $=C(R^{21})-$ ,  $-NR(R^{28})-$ ,  $-O-$ ,  $-S-$ ,  $-C(R^{21})(-)-$  oder  $-N(-)-$  steht,  
 55 wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q3 stehenden Gruppen  $-C(R^{21})(-)-$  oder  $-N(-)-$  oder über ein beliebiges anderes Ringkohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;

## EP 0 842 945 B1

- $R^2$  für Wasserstoff oder  $(C_1-C_8)$ -Alkyl steht;  
 $R^3$  für  $CONHR^{15}$  oder  $CONHR^4$  steht, wobei  $R^4$  hierin für einen unsubstituierten oder durch einen oder mehrere  $(C_6-C_{14})$ -Arylreste substituierten  $(C_1-C_8)$ -Alkylrest steht;  
 $R^{15}$  für  $R^{16}$ - $(C_1-C_6)$ -Alkyl oder  $R^{16}$  steht, wobei  $R^{16}$  für einen 7- bis 12-gliedrigen verbrückten bicyclischen oder tricyclischen Rest steht, der gesättigt oder teilweise ungesättigt ist und der auch ein bis vier gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann und der auch durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe  $(C_1-C_4)$ -Alkyl und Oxo substituiert sein kann, und insbesondere  $R^{15}$  für einen Adamantylrest oder einen Adamantylmethylrest steht;  
 und e, g und h unabhängig voneinander für die Zahlen 0, 1, 2 oder 3 stehen und b, c und d für 1 stehen;  
 in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.
10. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1, 3, 4, 5, 6 und 9, worin gleichzeitig  
 W für  $R^1-A-C(R^{13})$  steht;  
 Y für eine Carbonylgruppe steht;  
 Z für  $N(R^0)$  steht;  
 A für Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, Cyclohexylen, Phenylen, Phenylenmethyl, Methylenphenyl oder Methylenphenylmethyl steht;  
 B für einen unsubstituierten oder substituierten Methylenrest steht;  
 D für  $C(R^2)(R^3)$  steht;  
 E für  $R^{10}CO$  steht;  
 R für Wasserstoff oder  $(C_1-C_4)$ -Alkyl, insbesondere Wasserstoff, Methyl oder Ethyl, steht;  
 $R^0$  für  $(C_1-C_8)$ -Alkyl,  $(C_3-C_8)$ -Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl steht;  
 $R^1$  für einen der Reste  $-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,  $-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{29})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$  oder Cyano steht;  
 $R^2$  für Wasserstoff steht;  
 $R^3$  für  $CONHR^{15}$  oder  $CONHR^4$  steht, wobei  $R^4$  hierin für einen unsubstituierten oder durch einen oder mehrere  $(C_6-C_{10})$ -Arylreste substituierten  $(C_1-C_6)$ -Alkylrest steht;  
 $R^{10}$  für Hydroxy oder  $(C_1-C_8)$ -Alkoxy, bevorzugt  $(C_1-C_4)$ -Alkoxy, steht;  
 $R^{13}$  für  $(C_1-C_6)$ -Alkyl,  $(C_3-C_7)$ -Cycloalkyl oder Benzyl, insbesondere Methyl, steht;  
 $R^{15}$  für einen Adamantylrest oder einen Adamantylmethylrest steht;  
 b, c und d für 1 stehen und e, f und g für 0 stehen;  
 h für 1 oder 2, bevorzugt für 1, steht;  
 in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.
11. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 und 3 bis 6, worin gleichzeitig  
 W für  $R^1-A-C(R^{13})$  steht;  
 Y für eine Carbonylgruppe steht;  
 Z für  $N(R^0)$  steht;  
 A für Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, Cyclohexylen, Phenylen, Phenylenmethyl, Methylenphenyl, Methylenphenylmethyl steht;  
 B für einen unsubstituierten oder substituierten Methylenrest oder Ethylenrest steht;  
 D für  $C(R^2)(R^3)$  steht;  
 E für  $R^{10}CO$  steht;  
 R für Wasserstoff oder  $(C_1-C_4)$ -Alkyl, insbesondere Wasserstoff, Methyl oder Ethyl, steht;  
 $R^0$  für  $(C_1-C_8)$ -Alkyl,  $(C_3-C_8)$ -Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl steht;  
 $R^1$  für einen der Reste  $-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,  $-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{29})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-R^{21}$ ,  $-N(R^{28})-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)_2-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)_2-OR^{21}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-R^{21}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-C(S)-R^{21}$ ,  $-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$  oder Cyano steht oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel

## EP 0 842 945 B1



steht, in der

Q<sup>1</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- oder -S- steht;

Q<sup>2</sup> für -S(O)- oder -S(O)<sub>2</sub>- steht;

Q<sup>3</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- steht,

wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q<sup>3</sup> stehenden Gruppen -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- oder über ein beliebiges anderes Ringkohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;

R<sup>2</sup> für Wasserstoff steht;

R<sup>3</sup> für einen unsubstituierten Phenylrest oder Naphthylrest, einen durch einen, zwei oder drei gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, Hydroxy, Halogen, Trifluormethyl, Nitro, Methylendioxy, Ethylendioxy, Hydroxycarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy-carbonyl, Aminocarbonyl, Cyan, Phenyl, Phenoxy und Benzoyloxy substituierten Phenylrest oder Naphthylrest, einen Pyridylrest, einen (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkylrest, einen (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkenylrest, einen (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkynylrest oder einen (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-Cycloalkylrest steht, und insbesondere R<sup>3</sup> für einen unsubstituierten oder substituierten Phenylrest oder Naphthylrest steht;

R<sup>10</sup> für Hydroxy oder (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, insbesondere (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkoxy, steht und bevorzugt R<sup>10</sup> für einen Rest aus der Reihe Hydroxy, Methoxy, Ethoxy, Propoxy und Isopropoxy steht;

R<sup>13</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-Cycloalkyl oder Benzyl, insbesondere Methyl, steht;

b, c und d für 1 stehen und e, f und g für 0 stehen;

h für 1 oder 2, bevorzugt für 1, steht;

in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.

## 12. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 und 3 bis 6, worin gleichzeitig

W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) steht;

Y für eine Carbonylgruppe steht;

Z für N(R<sup>0</sup>) steht;

A für Ethylen, Trimethylen, Tetramethylen, Pentamethylen, Cyclohexylen, Phenylen, Phenylenmethyl, Methylene-phenyl, Methylenphenylmethyl steht;

B für einen unsubstituierten oder substituierten Methylenrest oder Ethylenrest steht;

D für C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>) steht;

E für R<sup>10</sup>CO steht;

R für Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl, insbesondere Wasserstoff, Methyl oder Ethyl, steht;

R<sup>0</sup> für (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl steht;

R<sup>1</sup> für einen der Reste -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

-O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

-O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,


-N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>,

-N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

-N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>,

-N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,


-C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> oder Cyano steht oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel




## EP 0 842 945 B1

- steht, in der  
 $Q^1$  für  $-C(R^{21})_2-$ ,  $=C(R^{21})-$ ,  $-N(R^{28})-$ ,  $-O-$  oder  $-S-$  steht;  
 $Q^2$  für  $-S(O)-$  oder  $-S(O)_2-$  steht;  
 $Q^3$  für  $-C(R^{21})_2-$ ,  $=C(R^{21})-$ ,  $-N(R^{28})-$ ,  $-O-$ ,  $-S-$ ,  $-C(R^{21})(-)-$  oder  $-N(-)-$  steht,  
 5 wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für  $Q^3$  stehenden Gruppen  $-C(R^{21})(-)-$  oder  $-N(-)-$  oder über ein beliebiges anderes Ringkohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;  
 $R^2$  für Wasserstoff steht;  
 $R^3$  für  $R^{11}NH$  steht;  
 10  $R^{10}$  für Hydroxy oder  $(C_1-C_6)$ -Alkoxy, insbesondere  $(C_1-C_4)$ -Alkoxy, steht und bevorzugt  $R^{10}$  für einen Rest aus der Reihe Hydroxy, Methoxy, Ethoxy, Propoxy und Isopropoxy steht;  
 $R^{13}$  für  $(C_1-C_6)$ -Alkyl,  $(C_3-C_7)$ -Cycloalkyl oder Benzyl, insbesondere Methyl, steht;  
 15 b, c, d und e für 1 stehen und f und g für 0 stehen;  
 h für 0 steht;  
 in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.
- 20 13. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1, 3, 4, 5, 6 und 12, worin  
 worin  $R^{11}$  für  $R^{12a}$ ,  $R^{12a}CO$ ,  $R^{12a}O-CO$ ,  $R^{12b}CO$ ,  $R^{12b}CS$  oder  $R^{12a}S(O)_2$  steht;  
 $R^{12a}$  für  $(C_1-C_{10})$ -Alkyl,  $(C_2-C_8)$ -Alkenyl,  $(C_2-C_8)$ -Alkynyl,  $(C_3-C_{12})$ -Cycloalkyl,  $(C_3-C_{12})$ -Cycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl,  
 gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{14})$ -Aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl,  
 gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes  
 25 Heteroaryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl oder den Rest  $R^{15}$  steht;  
 $R^{12b}$  für  $R^{12a}NH$  steht;  
 in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.
- 30 14. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 und 2 bis 13, worin ein für die Gruppe B stehender substituiertes Methylenrest oder substituiertes Ethylenrest als Substituenten einen Rest aus der Reihe  
 $(C_1-C_8)$ -Alkyl,  $(C_2-C_6)$ -Alkenyl,  $(C_2-C_6)$ -Alkynyl,  $(C_3-C_8)$ -Cycloalkyl, insbesondere  $(C_5-C_6)$ -Cycloalkyl,  $(C_3-C_8)$ -Cycloalkyl- $(C_1-C_4)$ -alkyl, insbesondere  $(C_5-C_6)$ -Cycloalkyl- $(C_1-C_4)$ -alkyl, gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{10})$ -Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes  $(C_6-C_{10})$ -Aryl- $(C_1-C_4)$ -alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl und im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl- $(C_1-C_4)$ -alkyl trägt; in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.  
 35
15. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 und 2 bis 14, worin B für einen unsubstituierten Methylenrest steht oder für einen Methylenrest steht, der durch einen  $(C_1-C_8)$ -Alkylrest substituiert ist;  
 40 in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.
16. Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 15, worin  $R^1$  für einen der Reste  
 $-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,  $-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{29})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$  oder Cyano steht;  
 45 in allen ihren stereoisomeren Formen und Mischungen davon in allen Verhältnissen, sowie ihre physiologisch verträglichen Salze.
17. Verfahren zur Herstellung von Verbindungen der Formel I gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 16,  
 50 **dadurch gekennzeichnet, daß** man eine Fragmentkondensation einer Verbindung der Formel II

## EP 0 842 945 B1




mit einer Verbindung der Formel III



ausführt, wobei W, Y, Z, B, D, E und R sowie b, d, e, f, g und h wie in den Ansprüchen 1 bis 16 angegeben definiert sind und G für Hydroxycarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkoxycarbonyl, aktivierte Carbonsäurederivate, wie Säurechloride, Aktivester oder gemischte Anhydride, oder für Isocyanato steht.

18. Verbindungen der Formel Ib,




worin

- W für R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) oder R<sup>1</sup>-A-CH=C steht;
- Y für eine Carbonyl-, Thiocarbonyl- oder Methylengruppe steht;
- Z für N(R<sup>0</sup>), Sauerstoff, Schwefel oder eine Methylengruppe steht;
- A einen zweiwertigen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)(C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkylen, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen-(C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, Phenylen, Phenylen-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen-phenyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen-phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, Phenylen-(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl oder einen zweiwertigen Rest eines 5- oder 6-gliedrigen gesättigten oder ungesättigten Ringes, der 1 oder 2 Stickstoffatome enthalten und ein- oder zweifach durch (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkyl oder doppelt gebundenen Sauerstoff oder Schwefel substituiert sein kann, bedeutet oder für eine direkte Bindung steht;
- B einen zweiwertigen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkenylen, Phenylen, Phenylen-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, -alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-Alkylen-phenyl bedeutet, wobei der zweiwertige (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-Alkylen-Rest unsubstituiert oder durch einen Rest aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl und im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl substituiert sein kann;
- D für C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>), N(R<sup>3</sup>) oder CH=C(R<sup>3</sup>) steht;
- E Tetrazolyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), HOS(O)<sub>2</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> oder R<sup>10</sup>CO bedeutet;
- R Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor ein- oder mehrfach substituiert sein können;

## EP 0 842 945 B1

- R<sup>0</sup>** für Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, CHO, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl-CO, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-CO, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-CO, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-CO, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-Tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-S(O)<sub>n</sub>, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-S(O)<sub>n</sub> oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub> steht, wobei n für 1 oder 2 steht;
- R<sup>1</sup>** einen der Reste -S-R<sup>21</sup>, -S-S-R<sup>21</sup>, -S(O)-R<sup>22</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -S-OR<sup>21</sup>, -S(O)-OR<sup>21</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -S-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(O)-R<sup>21</sup>, -S-C(O)-OR<sup>22</sup>, -S-C(S)-SR<sup>22</sup>, -S-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(S)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -O-S(O)-R<sup>22</sup>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-SR<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,
- Cyano, Halogen, Nitro oder Methylendioxy bedeutet oder für den Rest eines gegebenenfalls substituierten, 5- bis 14-gliedrigen, mono- oder polycyclischen, gesättigten oder ungesättigten heterocyclischen Rings der Formel



- steht, in der
- Q<sup>1</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- oder -S- steht;
- Q<sup>2</sup> für -S(O)- oder -S(O)<sub>2</sub>- steht;
- Q<sup>3</sup> für -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- steht,
- wobei der heterocyclische Ring über die freie Bindung in den für Q<sup>3</sup> stehenden Gruppen -C(R<sup>21</sup>)(-)- oder -N(-)- oder über ein beliebiges anderes Ring-Kohlenstoffatom an die Gruppe A gebunden sein kann und wobei, wenn der heterocyclische Ring an ein in der Gruppe A enthaltenes Ringsystem gebunden ist, der heterocyclische Ring auch über zwei benachbarte Atome an das Ringsystem in der Gruppe A anelliert sein kann;
- R<sup>2</sup>** Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;
- R<sup>3</sup>** Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenylcarbonyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkynylcarbonyl, Pyridyl, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>15</sup> oder CONHR<sup>15</sup> bedeutet;
- R<sup>4</sup>** Wasserstoff oder (C<sub>1</sub>-C<sub>28</sub>)-Alkyl bedeutet, das gegebenenfalls ein- oder mehrfach durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe Hydroxy, Hydroxycarbonyl, Aminocarbonyl, Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-aminocarbonyl, Amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, Amino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl-phenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonyl-amino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylphenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonyl-amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxycarbonyl, das im Arylrest auch substituiert sein kann, Amino, Mercapto, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxycarbonyl, Het-CO, gege-

## EP 0 842 945 B1

- benenfalls substituiertes (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl, HOS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, Tetrazolyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, Halogen, Nitro, Trifluormethyl und den Rest R<sup>5</sup> substituiert sein kann;
- 5 R<sup>5</sup> gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, einen mono- oder bicyclischen 5- bis 12-gliedrigen heterocyclischen Ring, der aromatisch, teilhydriert oder vollständig hydriert sein kann und der ein, zwei oder drei gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann, einen Rest R<sup>6</sup> oder einen Rest R<sup>6</sup>CO- bedeutet, wobei der Aryl- und unabhängig davon der Heterozyklus-Rest ein- oder mehrfach durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino oder Trifluormethyl substituiert sein können;
- 10 R<sup>6</sup> für R<sup>7</sup>R<sup>8</sup>N, R<sup>7</sup>O oder R<sup>7</sup>S steht oder eine Aminosäureseitenkette, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu -NH-CH<sub>2</sub>- reduziert sein kann, sowie deren Ester und Amide bedeutet, wobei anstelle freier funktioneller Gruppen gegebenenfalls Wasserstoff oder Hydroxymethyl stehen kann und/oder wobei freie funktionelle Gruppen durch in der Peptidchemie übliche Schutzgruppen geschützt sein können;
- 15 R<sup>7</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylcarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy-carbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylcarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylcarbonyl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyloxy-carbonyl, wobei die Alkylgruppen gegebenenfalls durch eine Aminogruppe substituiert und/oder wobei die Arylreste ein- oder mehrfach, vorzugsweise einfach, durch gleiche oder verschiedene Reste aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkoxy, Halogen, Nitro, Amino und Trifluormethyl substituiert sein können, einen natürlichen oder unnatürlichen Aminosäure-, Iminosäure-, gegebenenfalls N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten oder N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylierten) Azaaminosäure- oder einen Dipeptid-Rest, der im Arylrest auch substituiert und/oder bei dem die Peptidbindung zu -NH-CH<sub>2</sub>- reduziert sein kann, bedeutet;
- 20 R<sup>8</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, das im Arylrest auch substituiert sein kann, bedeutet;
- 25 R<sup>9</sup> Wasserstoff, Aminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkylaminocarbonyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkylaminocarbonyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Arylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl bedeutet;
- 30 R<sup>10</sup> Hydroxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, das im Arylrest auch substituiert sein kann, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryloxy, Amino oder Mono- oder Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino bedeutet;
- R<sup>11</sup> für Wasserstoff, R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, H-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO, R<sup>12b</sup>-CS, R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub> oder R<sup>12b</sup>-S(O)<sub>2</sub> steht;
- 35 R<sup>12a</sup> (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-Alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl, im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder den Rest R<sup>15</sup> bedeutet;
- R<sup>12b</sup> Amino, Di-((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino oder R<sup>12a</sup>-NH bedeutet;
- R<sup>13</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl oder (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet;
- 40 R<sup>15</sup> für R<sup>16</sup>-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl oder für R<sup>16</sup> steht;
- R<sup>16</sup> für einen 6- bis 24-gliedrigen bicyclischen oder tricyclischen Rest steht, der gesättigt oder teilweise ungesättigt ist und der auch ein, zwei, drei oder vier gleiche oder verschiedene Heteroatome aus der Reihe Stickstoff, Sauerstoff und Schwefel enthalten kann und der auch durch einen oder mehrere gleiche oder verschiedene Substituenten aus der Reihe (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-Alkyl und Oxo substituiert sein kann;
- 45 R<sup>21</sup> Wasserstoff, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste R<sup>21</sup> bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;
- 50 R<sup>22</sup> (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkyl, Hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-Alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-Cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl, im Arylrest gegebenenfalls substituiertes (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-Aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl oder im Heteroarylrest gegebenenfalls substituiertes Heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl bedeutet, wobei Alkylreste durch Fluor einfach oder mehrfach substituiert sein können und die Reste R<sup>22</sup> bei mehrfachem Auftreten gleich oder verschieden sein können;
- 55 R<sup>28</sup> für einen der Reste R<sup>21</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- oder R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))- steht;
- R<sup>29</sup> für einen der Reste R<sup>22</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- oder R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))- steht;



**EP 0 842 945 B1**

5

10

15

20

25

30

## 35

40




50

55

## EP 0 842 945 B1

- B is a bivalent radical from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkylene, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenylene, phenylene, phenylene-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylenephenyl, where the bivalent (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkylene radical can be unsubstituted or substituted by a radical from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkynyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl and heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical;
- D is C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>), N(R<sup>3</sup>) or CH=C(R<sup>3</sup>);
- E is tetrazolyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), HOS(O)<sub>2</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> or R<sup>10</sup>CO;
- R is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl or heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical, where alkyl radicals can be mono- or polysubstituted by fluorine;
- R<sup>0</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-bicycloalkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-tricycloalkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl, heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical, CHO, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-CO, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-bicycloalkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-tricycloalkyl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-CO, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl-CO, heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-CO optionally substituted in the heteroaryl radical, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-bicycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-bicycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-tricycloalkyl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>)-tricycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub>, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-S(O)<sub>n</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub> optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl-S(O)<sub>n</sub> or heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl-S(O)<sub>n</sub> optionally substituted in the heteroaryl radical, where n is 1 or 2;
- R<sup>1</sup> is one of the radicals -S-R<sup>21</sup>, -S-S-R<sup>21</sup>, -S(O)-R<sup>22</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -S-OR<sup>21</sup>, -S(O)-OR<sup>21</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -S-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(O)-R<sup>21</sup>, -S-C(O)-OR<sup>22</sup>, -S-C(S)-SR<sup>22</sup>, -S-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(S)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -O-S(O)-R<sup>22</sup>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>-N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-SR<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, cyano, halogen, nitro or methylenedioxy or the radical of an optionally substituted, 5- to 14-membered, mono- or polycyclic, saturated or unsaturated heterocyclic ring of the formula



in which

Q<sup>1</sup> is -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- or -S-;

Q<sup>2</sup> is -S(O)- or -S(O)<sub>2</sub>-;

Q<sup>3</sup> is -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- or -N(-)-,

where the heterocyclic ring can be bonded to the group A via the free bond in the groups -C(R<sup>21</sup>)(-)- or -N(-)- representing Q<sup>3</sup> or via any other desired ring carbon atom and where, if the heterocyclic ring is bonded to a ring system contained in the group A, the heterocyclic ring can also be fused in the group A via two adjacent atoms on the ring system;

R<sup>2</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical or (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl;

R<sup>3</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally sub-

## EP 0 842 945 B1

- stituted in the aryl radical, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkynyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenylcarbonyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkynylcarbonyl, pyridyl, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>15</sup> or CONHR<sup>15</sup>;
- 5 R<sup>4</sup> is hydrogen or (C<sub>1</sub>-C<sub>28</sub>)-alkyl which can optionally be mono- or polysubstituted by identical or different radicals from the group consisting of hydroxyl, hydroxycarbonyl, aminocarbonyl, mono- or di((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)aminocarbonyl, amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, amino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylphenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylcarbonylamino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylphenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylcarbonylamino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxycarbonyl which can also be substituted in the aryl radical, amino, mercapto, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxycarbonyl, Het-CO, optionally substituted (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl, HOS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, tetrazolyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, halogen, nitro, trifluoromethyl and the radical R<sup>5</sup>;
- 10 R<sup>5</sup> is optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, a mono- or bicyclic 5- to 12-membered heterocyclic ring which can be aromatic, partially hydrogenated or completely hydrogenated and which can contain one, two or three identical or different heteroatoms from the group consisting of nitrogen, oxygen and sulfur, a radical R<sup>6</sup> or a radical R<sup>6</sup>CO-, where the aryl and, independently thereof, the heterocyclic radical can be mono- or polysubstituted by identical or different radicals from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxy, halogen, nitro, amino or trifluoromethyl;
- 15 R<sup>6</sup> is R<sup>7</sup>R<sup>8</sup>N, R<sup>7</sup>O or R<sup>7</sup>S or an amino acid side chain, a natural or unnatural amino acid, imino acid, optionally N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylated or N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylated) azaamino acid or a dipeptide radical which can also be substituted in the aryl radical and/or in which the peptide bond can be reduced to -NH-CH<sub>2</sub>-, and their esters and amides, where instead of free functional groups there can optionally be hydrogen or hydroxymethyl and/or where free functional groups can be protected by protective groups customary in peptide chemistry;
- 20 R<sup>7</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylcarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxycarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-arylcarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylcarbonyl or (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyloxycarbonyl, where the alkyl groups can optionally be substituted by an amino group and/or where the aryl radicals can be mono- or polysubstituted, preferably monosubstituted, by identical or different radicals from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, halogen, nitro, amino and trifluoromethyl, a natural or unnatural amino acid, imino acid, optionally N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylated or N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylated) azaamino acid or a dipeptide radical which can also be substituted in the aryl radical and/or in which the peptide bond can be reduced to -NH-CH<sub>2</sub>-;
- 25 R<sup>8</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl or (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl which can also be substituted in the aryl radical;
- 30 R<sup>9</sup> is hydrogen, aminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkylaminocarbonyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-arylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl or (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl;
- R<sup>10</sup> is hydroxyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy which can also be substituted in the aryl radical, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryloxy, amino or mono- or di((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)amino;
- 40 R<sup>11</sup> is hydrogen, R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, H-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO, R<sup>12b</sup>-CS, R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub> or R<sup>12b</sup>-S(O)<sub>2</sub>;
- R<sup>12a</sup> is (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkynyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl, heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical or the radical R<sup>15</sup>;
- 45 R<sup>12b</sup> is amino, di((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)amino or R<sup>12a</sup>-NH;
- R<sup>13</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl or (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl;
- R<sup>15</sup> is R<sup>16</sup>-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl or R<sup>16</sup>;
- 50 R<sup>16</sup> is a 6- to 24-membered bicyclic or tricyclic radical which is saturated or partially unsaturated and which can also contain one, two, three or four identical or different heteroatoms from the group consisting of nitrogen, oxygen and sulfur and which can also be substituted by one or more identical or different substituents from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl and oxo;
- R<sup>21</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl or heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical, where alkyl radicals can be monosubstituted or polysubstituted by fluorine and the radicals R<sup>21</sup> can be identical or different if they occur two or more times;
- 55 R<sup>22</sup> is (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-

## EP 0 842 945 B1

alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl or heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical, where alkyl radicals can be monosubstituted or polysubstituted by fluorine and the radicals R<sup>22</sup> can be identical or different if they occur two or more times;

5 R<sup>28</sup> is one of the radicals R<sup>21</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- or R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))-;

R<sup>29</sup> is one of the radicals R<sup>22</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- or R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))-;

10 Het is the radical of a 5- to 10-membered, monocyclic or polycyclic heterocycle bonded via a nitrogen atom, which can be aromatic or partially unsaturated or saturated and which can contain one, two, three or four identical or different additional ring heteroatoms from the group consisting of oxygen, nitrogen and sulfur and which can be optionally substituted on carbon atoms and on additional ring nitrogen atoms, where there can be identical or different radicals R<sup>h</sup>, R<sup>h</sup>CO or R<sup>h</sup>O-CO as substituents on additional ring nitrogen atoms and R<sup>h</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl or (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical;

b, c, d and f independently of one another are 0 or 1, but cannot all simultaneously be 0;

e, g and h independently of one another are 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 6;

in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts;

20 where, however, if simultaneously W is 4-cyanophenyl-C(R<sup>13</sup>), Y is a carbonyl group, Z is NR<sup>0a</sup>, B is an unsubstituted methylene group, R is R<sup>a</sup>, b, c and d are 1 and e, f and g are 0, then D cannot be C(R<sup>2a</sup>)(R<sup>3a</sup>), where

R<sup>0a</sup>, R<sup>a</sup> and R<sup>2a</sup> independently of one another are hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical or (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl and

25 R<sup>3a</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl or 2-, 3- or 4-pyridyl.

## 2. A compound of the formula I as claimed in claim 1, in which

30 W is R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) or R<sup>1</sup>-A-CH=C;

Y is a carbonyl, thiocarbonyl or methylene group;

Z is N(R<sup>0</sup>), oxygen, sulfur or a methylene group;

35 A is a bivalent radical from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkylene, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkylene, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkylene-(C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, phenylene, phenylene-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkylenephényl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkylenephényl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, phenylene-(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl or a bivalent radical of a 5- or 6-membered saturated or unsaturated ring which can contain 1 or 2 nitrogen atoms and can be mono- or disubstituted by (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl or doubly bonded oxygen or sulfur, or is a direct bond;

B is a bivalent radical from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkylene, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyfene, phenylene, phenylene-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylenephényl;

40 D is C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>), N(R<sup>3</sup>) or CH=C(R<sup>3</sup>);

E is tetrazolyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), HOS(O)<sub>2</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> or R<sup>10</sup>CO;


45 R and R<sup>0</sup> independently of one another are hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl or heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical, where alkyl radicals can be mono- or polysubstituted by fluorine;

50 R<sup>1</sup> is one of the radicals -S-R<sup>21</sup>, -S-S-R<sup>21</sup>, -S(O)-R<sup>22</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -S-OR<sup>21</sup>, -S(O)-OR<sup>21</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -S-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(O)-R<sup>21</sup>, -S-C(O)-OR<sup>22</sup>, -S-C(S)-SR<sup>22</sup>, -S-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(S)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -O-S(O)-R<sup>22</sup>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-SR<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

cyano, halogen, nitro or methylenedioxy or the radical of an optionally substituted, 5- to 14-membered,

## EP 0 842 945 B1

mono- or polycyclic, saturated or unsaturated heterocyclic ring of the formula



in which

Q<sup>1</sup> is -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- or -S-;

Q<sup>2</sup> is -S(O)- or -S(O)<sub>2</sub>-;

Q<sup>3</sup> is -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- or -N(-)-,

where the heterocyclic ring can be bonded to the group A via the free bond in the groups -C(R<sup>21</sup>)(-)- or -N(-)- representing Q<sup>3</sup> or via any other desired ring carbon atom and where, if the heterocyclic ring is bonded to a ring system contained in the group A, the heterocyclic ring can also be fused in the group A via two adjacent atoms on the ring system;

R<sup>2</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical or (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl;

R<sup>3</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkynyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl-carbonyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkynylcarbonyl, pyridyl, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>15</sup> or CONHR<sup>15</sup>;

R<sup>4</sup> is hydrogen or (C<sub>1</sub>-C<sub>28</sub>)-alkyl which can optionally be mono- or polysubstituted by identical or different radicals from the group consisting of hydroxyl, hydroxycarbonyl, aminocarbonyl, mono- or di((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)aminocarbonyl, amino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, amino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylphenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylcarbonylamino-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylphenyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylcarbonylamino-(C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxycarbonyl which can also be substituted in the aryl radical, amino, mercapto, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxy, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxy-carbonyl, optionally substituted (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl, HOS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, tetrazolyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, halogen, nitro, trifluoromethyl and the radical R<sup>5</sup>;

R<sup>5</sup> is optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, a mono- or bicyclic 5- to 12-membered heterocyclic ring which can be aromatic, partially hydrogenated or completely hydrogenated and which can contain one, two or three identical or different heteroatoms from the group consisting of nitrogen, oxygen and sulfur, a radical R<sup>6</sup> or a radical R<sup>6</sup>CO-, where the aryl and, independently thereof, the heterocyclic radical can be mono- or polysubstituted by identical or different radicals from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxy, halogen, nitro, amino or trifluoromethyl;

R<sup>6</sup> is R<sup>7</sup>R<sup>8</sup>N, R<sup>7</sup>O or R<sup>7</sup>S or an amino acid side chain, a natural or unnatural amino acid, imino acid, optionally N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylated or N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylated) azaamino acid or a dipeptide radical which can also be substituted in the aryl radical and/or in which the peptide bond can be reduced to -NH-CH<sub>2</sub>-, and their esters and amides, where instead of free functional groups there can optionally be hydrogen or hydroxymethyl and/or where free functional groups can be protected by protective groups customary in peptide chemistry;

R<sup>7</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylcarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxycarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-arylcarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylcarbonyl or (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyloxy-carbonyl, where the alkyl groups can optionally be substituted by an amino group and/or where the aryl radicals can be mono- or polysubstituted, preferably monosubstituted, by identical or different radicals from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, halogen, nitro, amino and trifluoromethyl, a natural or unnatural amino acid, imino acid, optionally N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylated or N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylated) azaamino acid or a dipeptide radical which can also be substituted in the aryl radical and/or in which the peptide bond can be reduced to -NH-CH<sub>2</sub>-;

R<sup>8</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl or (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl which can also be substituted in the aryl radical;

R<sup>9</sup> is hydrogen, aminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkylaminocarbonyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-arylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl or (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl;

## EP 0 842 945 B1


- R<sup>10</sup> is hydroxyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy which can also be substituted in the aryl radical, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryloxy, amino or mono- or di((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)amino;
- R<sup>11</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, R<sup>12</sup>CO, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-S(O)<sub>2</sub>, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl-S(O)<sub>2</sub>, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> or the radical R<sup>15</sup>;
- 5 R<sup>12</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkynyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy which can also be substituted in the aryl radical, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryloxy, amino or mono- or di((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)amino, the radical R<sup>15</sup> or the radical R<sup>15</sup>-O-;
- R<sup>13</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical or (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl;
- 10 R<sup>15</sup> is R<sup>16</sup>-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl or R<sup>16</sup>;
- R<sup>16</sup> is a 6- to 24-membered bicyclic or tricyclic radical which is saturated or partially unsaturated and which can also contain one to four identical or different heteroatoms from the group consisting of nitrogen, oxygen and sulfur and which can also be substituted by one or more identical or different substituents from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl and oxo;
- 15 R<sup>21</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl or heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical, where alkyl radicals can be monosubstituted or polysubstituted by fluorine and the radicals R<sup>21</sup> can be identical or different if they occur two or more times;
- 20 R<sup>22</sup> is (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl or heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical, where alkyl radicals can be monosubstituted or polysubstituted by fluorine and the radicals R<sup>22</sup> can be identical or different if they occur two or more times;
- 25 R<sup>28</sup> is one of the radicals R<sup>21</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- or R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))-;
- R<sup>29</sup> is one of the radicals R<sup>22</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- or R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))-;

b, c, d and f independently of one another are 0 or 1, but cannot all simultaneously be 0;

e, g and h independently of one another are 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 6;

in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.

- 35 3. A compound of the formula I as claimed in claim 1 and/or 2, in which R<sup>1</sup> is one of the radicals
- S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,
- 40 -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> or cyano or the radical of an optionally substituted, 5- to 14-membered, mono- or polycyclic, saturated or unsaturated heterocyclic ring of the formula



50 in which

Q<sup>1</sup> is -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- or -S-;

Q<sup>2</sup> is -S(O)- or -S(O)<sub>2</sub>-;


Q<sup>3</sup> is -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- or -N(-)-,

55 where the heterocyclic ring can be bonded to the group A via the free bond in the groups -C(R<sup>21</sup>)(-)- or -N(-)- representing Q<sup>3</sup> or via any other desired ring carbon atom and where, if the heterocyclic ring is bonded to a ring system contained in the group A, the heterocyclic ring can also be fused in the group A via two adjacent atoms on the ring system;

in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.

## EP 0 842 945 B1

4. A compound of the formula I as claimed in one or more of claims 1 to 3, in which  $R^0$  is  $(C_1-C_8)$ -alkyl,  $(C_3-C_{12})$ -cycloalkyl,  $(C_3-C_{12})$ -cycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl, optionally substituted  $(C_6-C_{14})$ -aryl,  $(C_6-C_{14})$ -aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl or heteroaryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical, preferably biphenylmethyl, naphthylmethyl or benzyl, each of which is unsubstituted or monosubstituted or polysubstituted in the aryl radical; in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.
5. A compound of the formula I as claimed in one or more of claims 1, 3 and 4, in which simultaneously  
 W is  $R^1-A-CH=C$  and therein A is a phenylene radical or a methylenephenyl radical or W is  $R^1-A-C(R^{13})$  and therein A is a bivalent radical from the group consisting of methylene, ethylene, trimethylene, tetramethylene, pentamethylene, cyclohexylene, phenylene, phenylenemethyl, methylenephenyl, methylenephenylmethyl;  
 B is a bivalent radical from the group consisting of methylene, ethylene, trimethylene, tetramethylene, vinylene, phenylene, or substituted methylene or ethylene;  
 E is  $R^{10}CO$ ;  
 R is hydrogen,  $(C_1-C_6)$ -alkyl or benzyl;  
 $R^0$  is  $(C_1-C_8)$ -alkyl,  $(C_3-C_8)$ -cycloalkyl, optionally substituted  $(C_6-C_{14})$ -aryl or  $(C_6-C_{14})$ -aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl optionally substituted in the aryl radical;  
 $R^1$  is one of the radicals  $-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,  $-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-O-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-N(R^{28})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-R^{21}$ ,  
 $-N(R^{28})-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-N(R^{28})-S(O)_2-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)_2-OR^{21}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-OR^{21}$ ,  
 $-N(R^{28})-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  
 $-C(S)-R^{21}$ ,  $-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$  or cyano or the radical of an optionally substituted, 5- to 14-membered, mono- or polycyclic, saturated or unsaturated heterocyclic ring of the formula




- in which  
 $Q^1$  is  $-C(R^{21})_2-$ ,  $=C(R^{21})-$ ,  $-N(R^{28})-$ ,  $-O-$  or  $-S-$ ;  
 $Q^2$  is  $-S(O)-$  or  $-S(O)_2-$ ;  
 $Q^3$  is  $-C(R^{21})_2-$ ,  $=C(R^{21})-$ ,  $-N(R^{28})-$ ,  $-O-$ ,  $-S-$ ,  $-C(R^{21})(-)-$  or  $-N(-)-$ ,  
 where the heterocyclic ring can be bonded to the group A via the free bond in the groups  $-C(R^{21})(-)-$  or  $-N(-)-$  representing  $Q^3$  or via any other desired ring carbon atom and where, if the heterocyclic ring is bonded to a ring system contained in the group A, the heterocyclic ring can also be fused in the group A via two adjacent atoms on the ring system;
- $R^2$  is hydrogen or  $(C_1-C_8)$ -alkyl;  
 $R^3$  is  $(C_1-C_8)$ -alkyl, optionally substituted  $(C_6-C_{14})$ -aryl,  $(C_6-C_{14})$ -aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl,  $(C_3-C_8)$ -cycloalkyl,  $(C_2-C_8)$ -alkenyl,  $(C_2-C_8)$ -alkynyl, pyridyl,  
 $R^{11}NH$ ,  $R^4CO$ ,  $COOR^4$ ,  $CONHR^4$ ,  $CSNHR^4$ ,  $COOR^{15}$  and  $CONHR^{15}$ ;  
 and e, g and h independently of one another are the numbers 0, 1, 2 or 3;
- in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.
6. A compound of the formula I as claimed in one or more of claims 1 to 5, in which W is  $R^1-A-C(R^{13})$  and  $R^{13}$  is  $(C_1-C_6)$ -alkyl,  $(C_6-C_{14})$ -aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl optionally substituted in the aryl radical or  $(C_3-C_8)$ -cycloalkyl; in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.
7. A compound of the formula I as claimed in one or more of claims 1 and 3 to 6, in which  $R^3$  is optionally substituted  $(C_6-C_{14})$ -aryl,  $COOR^4$ ,  $R^{11}NH$  or  $CONHR^4$ , where  $-NHR^4$  is the radical of an  $\alpha$ -amino acid, its  $\omega$ -amino- $(C_2-C_8)$ -alkylamide, its  $(C_1-C_8)$ -alkyl ester, its  $(C_6-C_{14})$ -aryl- $(C_1-C_4)$ -alkyl ester or its derivative in which the carboxylic acid

## EP 0 842 945 B1

group is converted into the group Het-CO, preferably the radical of the  $\alpha$ -amino acids valine, lysine, phenylglycine, phenylalanine or tryptophan or their (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl esters, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl esters or Het-CO derivative; in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.

8. A compound of the formula I as claimed in one or more of claims 1 and 3 to 7, in which simultaneously
- W is R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>);
- Y is a carbonyl group;
- Z is N(R<sup>0</sup>);
- A is ethylene, trimethylene, tetramethylene, pentamethylene, cyclohexylene, phenylene, phenylenemethyl, methylenephenyl or methylenephenylmethyl;
- B is an unsubstituted or substituted methylene radical;
- D is C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>);
- E is R<sup>10</sup>CO;
- R is hydrogen or (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, in particular hydrogen, methyl or ethyl;
- R<sup>0</sup> is (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl or (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical;
- R<sup>1</sup> is one of the radicals -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> or cyano;
- R<sup>2</sup> is hydrogen;
- R<sup>3</sup> is the radical CONHR<sup>4</sup>;
- R<sup>4</sup> is methyl which is substituted by hydroxycarbonyl and a radical from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, phenyl and benzyl, or is methyl which is substituted by (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxycarbonyl, preferably (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkoxycarbonyl, and a radical from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, phenyl and benzyl, or is methyl which is substituted by Het-CO and a radical from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, phenyl and benzyl;
- R<sup>10</sup> is hydroxyl or (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, preferably (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkoxy;
- R<sup>13</sup> is (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-cycloalkyl or benzyl, in particular methyl;
- b, c and d are 1 and e, f and g are 0;
- h is 1 or 2, preferably 1;
- in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.

9. A compound of the formula I as claimed in one or more of claims 1, 3, 4 and 5, in which simultaneously
- W is R<sup>1</sup>-A-CH=C and therein A is a phenylene radical or a methylenephenyl radical or W is R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) and therein A is a bivalent radical from the group consisting of methylene, ethylene, trimethylene, tetramethylene, pentamethylene, cyclohexylene, phenylene, phenylenemethyl, methylenephenyl, methylenephenylmethyl;
- B is a bivalent radical from the group consisting of methylene, ethylene, trimethylene, tetramethylene, vinylene, phenylene or substituted methylene or ethylene;
- E is R<sup>10</sup>CO;
- R is hydrogen or (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl;
- R<sup>0</sup> is (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl or (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical;
- R<sup>1</sup> is one of the radicals -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> or cyano or the radical of an optionally substituted, 5- to 14-membered, mono- or polycyclic, saturated or unsaturated heterocyclic ring of the formula



in which



## EP 0 842 945 B1

$Q^1$  is  $-C(R^{21})_2$ ,  $=C(R^{21})$ -,  $-N(R^{28})$ -,  $-O$ - or  $-S$ -;

$Q^2$  is  $-S(O)$ - or  $-S(O)_2$ -;

$Q^3$  is  $-C(R^{21})_2$ -,  $=C(R^{21})$ -,  $-N(R^{28})$ -,  $-O$ -,  $-S$ -,  $-C(R^{21})(-)$ - or  $-N(-)$ -,

where the heterocyclic ring can be bonded to the group A via the free bond in the groups  $-C(R^{21})(-)$ - or  $-N(-)$ - representing  $Q^3$  or via any other desired ring carbon atom and where, if the heterocyclic ring is bonded to a ring system contained in the group A, the heterocyclic ring can also be fused in the group A via two adjacent atoms on the ring system;

$R^2$  is hydrogen or  $(C_1-C_8)$ -alkyl;

$R^3$  is  $CONHR^{15}$  or  $CONHR^4$ , where  $R^4$  herein is a  $(C_1-C_6)$ -alkyl radical which is unsubstituted or substituted by one or more  $(C_6-C_{14})$ -aryl radicals;

$R^{15}$  is  $R^{16}$ -( $C_1-C_6$ )-alkyl or  $R^{16}$ , where  $R^{16}$  is a 7- to 12-membered bridged bicyclic or tricyclic radical which is saturated or partially unsaturated and which can also contain one to four identical or different heteroatoms from the group consisting of nitrogen, oxygen and sulfur and which can also be substituted by one or more identical or different substituents from the group consisting of  $(C_1-C_4)$ -alkyl and oxo, and in particular  $R^{15}$  is an adamantyl radical or an adamantylmethyl radical;

and e, g and h independently of one another are the numbers 0, 1, 2 or 3 and b, c and d are 1;

in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.

10. A compound of the formula I as claimed in one or more of claims 1, 3, 4, 5, 6 and 9, in which simultaneously

W is  $R^1$ -A-C( $R^{13}$ );

Y is a carbonyl group;

Z is  $N(R^0)$ ;

A is ethylene, trimethylene, tetramethylene, pentamethylene, cyclohexylene, phenylene, phenylenemethyl, methylenephenyl or methylenephenylmethyl;

B is an unsubstituted or substituted methylene radical;

D is  $C(R^2)(R^3)$ ;

E is  $R^{10}CO$ ;

R is hydrogen or  $(C_1-C_4)$ -alkyl, in particular hydrogen, methyl or ethyl;

$R^0$  is  $(C_1-C_8)$ -alkyl,  $(C_3-C_8)$ -cycloalkyl, optionally substituted  $(C_6-C_{14})$ -aryl or  $(C_6-C_{14})$ -aryl-( $C_1-C_8$ )-alkyl optionally substituted in the aryl radical;

$R^1$  is one of the radicals  $-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,  $-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{29})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$  or cyano;

$R^2$  is hydrogen;

$R^3$  is  $CONHR^{15}$  or  $CONHR^4$ , where  $R^4$  herein is a  $(C_1-C_6)$ -alkyl radical which is unsubstituted or substituted by one or more  $(C_6-C_{10})$ -aryl radicals;

$R^{10}$  is hydroxyl or  $(C_1-C_8)$ -alkoxy, preferably  $(C_1-C_4)$ -alkoxy;

$R^{13}$  is  $(C_1-C_6)$ -alkyl,  $(C_3-C_7)$ -cycloalkyl or benzyl, in particular methyl;

$R^{15}$  is an adamantyl radical or an adamantylmethyl radical;

b, c and d are 1 and e, f and g are 0;

h is 1 or 2, preferably 1;

in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.

11. A compound of the formula I as claimed in one or more of claims 1 and 3 to 6, in which simultaneously

W is  $R^1$ -A-C( $R^{13}$ );

Y is a carbonyl group;

Z is  $N(R^0)$ ;

A is ethylene, trimethylene, tetramethylene, pentamethylene, cyclohexylene, phenylene, phenylenemethyl, methylenephenyl, methylenephenylmethyl;

B is an unsubstituted or substituted methylene radical or ethylene radical;

D is  $C(R^2)(R^3)$ ;

E is  $R^{10}CO$ ;


R is hydrogen or  $(C_1-C_4)$ -alkyl, in particular hydrogen, methyl or ethyl;

$R^0$  is  $(C_1-C_8)$ -alkyl,  $(C_3-C_8)$ -cycloalkyl, optionally substituted  $(C_6-C_{14})$ -aryl or  $(C_6-C_{14})$ -aryl-( $C_1-C_8$ )-alkyl which is optionally substituted in the aryl radical;

$R^1$  is one of the radicals  $-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,  $-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{29})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-R^{21}$ ,

## EP 0 842 945 B1

-N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
 -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>,  
 -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
 -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> or cyano or the radical of an optionally substituted, 5- to 14-membered, mono- or  
 polycyclic, saturated or unsaturated heterocyclic ring of the formula



in which

Q<sup>1</sup> is -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- or -S-;

Q<sup>2</sup> is -S(O)- or -S(O)<sub>2</sub>-;

Q<sup>3</sup> is -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- or -N(-)-,

where the heterocyclic ring can be bonded to the group A via the free bond in the groups -C(R<sup>21</sup>)(-)- or -N(-)-  
 representing Q<sup>3</sup> or via any other desired ring carbon atom and where, if the heterocyclic ring is bonded to a ring  
 system contained in the group A, the heterocyclic ring can also be fused in the group A via two adjacent atoms on  
 the ring system;

R<sup>2</sup> is hydrogen;

R<sup>3</sup> is an unsubstituted phenyl radical or naphthyl radical, a phenyl radical or naphthyl radical substituted by one,  
 two or three identical or different radicals from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkoxy, hydroxyl,  
 halogen, trifluoromethyl, nitro, methylenedioxy, ethylenedioxy, hydroxycarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkoxycarbonyl, aminoc-  
 arboxyl, cyano, phenyl, phenoxy and benzyloxy, a pyridyl radical, a (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl radical, a (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-alkenyl radical,  
 a (C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>)-alkynyl radical or a (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-cycloalkyl radical, and in particular R<sup>3</sup> is an unsubstituted or substituted  
 phenyl radical or naphthyl radical;

R<sup>10</sup> is hydroxyl or (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, in particular (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkoxy, and preferably R<sup>10</sup> is a radical from the group con-  
 sisting of hydroxyl, methoxy, ethoxy, propoxy and isopropoxy;

R<sup>13</sup> is (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-cycloalkyl or benzyl, in particular methyl;

b, c and d are 1 and e, f and g are 0;

h is 1 or 2, preferably 1;

in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.

12. A compound of the formula I as claimed in one or more of claims 1 and 3 to 6, in which simultaneously

W is R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>);

Y is a carbonyl group;

Z is N(R<sup>0</sup>);

A is ethylene, trimethylene, tetramethylene, pentamethylene, cyclohexylene, phenylene, phenylenemethyl, meth-  
 ylenephenyl, methylenephenylmethyl;

B is an unsubstituted or substituted methylene radical or ethylene radical;

D is C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>);

E is R<sup>10</sup>CO;

R is hydrogen or (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, in particular hydrogen, methyl or ethyl;

R<sup>0</sup> is (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl or (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally  
 substituted in the aryl radical;

R<sup>1</sup> is one of the radicals -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

-O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

-O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

-N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>,


-N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>

-N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>,

-N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,

-C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> or cyano or the radical of an optionally substituted, 5- to 14-membered, mono- or  
 polycyclic, saturated or unsaturated heterocyclic ring of the formula

## EP 0 842 945 B1



in which

Q<sup>1</sup> is -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- or -S-;

Q<sup>2</sup> is -S(O)- or -S(O)<sub>2</sub>-;

Q<sup>3</sup> is -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- or -N(-)-,

where the heterocyclic ring can be bonded to the group A via the free bond in the groups -C(R<sup>21</sup>)(-)- or -N(-)- representing Q<sup>3</sup> or via any other desired ring carbon atom and where, if the heterocyclic ring is bonded to a ring system contained in the group A, the heterocyclic ring can also be fused in the group A via two adjacent atoms on the ring system;

R<sup>2</sup> is hydrogen;

R<sup>3</sup> is R<sup>11</sup>NH;

R<sup>10</sup> is hydroxyl or (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, in particular (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkoxy, and

preferably R<sup>10</sup> is a radical from the group consisting of hydroxyl, methoxy, ethoxy, propoxy and isopropoxy;

R<sup>13</sup> is (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub>)-cycloalkyl or benzyl, in particular methyl;

b, c, d and e are 1 and f and g are 0;

h is 0;

in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.

13. A compound of the formula I as claimed in one or more of claims 1, 3, 4, 5, 6 and 12, in which

R<sup>11</sup> is R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO, R<sup>12b</sup>-CS or R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub>;

R<sup>12a</sup> is (C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkynyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl, heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical or the radical R<sup>15</sup>;

R<sup>12b</sup> is R<sup>12a</sup>-NH;

in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.

14. A compound of the formula I as claimed in one or more of claims 1 and 2 to 13, in which a substituted methylene radical or substituted ethylene radical representing the group B carries as a substituent a radical from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkynyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl, in particular (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, in particular (C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl and heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical; in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.

15. A compound of the formula I as claimed in one or more of claims 1 and 2 to 14, in which B is an unsubstituted methylene radical or a methylene radical which is substituted by a (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl radical;


in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.

16. A compound of the formula I as claimed in one or more of claims 1 to 15, in which R<sup>1</sup> is one of the radicals -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> or cyano;


in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts.

17. A process for the preparation of compounds of the formula I as claimed in one or more of claims 1 to 16, which comprises carrying out a fragment condensation of a compound of the formula II

## EP 0 842 945 B1




with a compound of the formula III



where W, Y, Z, B, D, E and R, and b, d, e, f, g and h are defined as indicated in claims 1 to 16 and G is hydroxy-carbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkoxycarbonyl, activated carboxylic acid derivatives, such as acid chlorides, active esters or mixed anhydrides, or isocyanato.

18. A compound of the formula Ib



in which

- W is R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) or R<sup>1</sup>-A-CH=C;  
 Y is a carbonyl, thiocarbonyl or methylene group;  
 Z is N(R<sup>0</sup>), oxygen, sulfur or a methylene group;  
 A is a bivalent radical from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkylene, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkylene, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkylene-(C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, phenylene, phenylene-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkylenepheryl, (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkylenepheryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, phenylene-(C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenyl or a bivalent radical of a 5- or 6-membered, saturated or unsaturated ring which can contain 1 or 2 nitrogen atoms and can be mono- or disubstituted by (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl or doubly bonded oxygen or sulfur or is a direct bond;  
 B is a bivalent radical from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkylene, (C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>)-alkenylene, phenylene, phenylene-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkylenepheryl, where the bivalent (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkylene radical can be unsubstituted or substituted by a radical from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkynyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl and heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical;  
 D is C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>), N(R<sup>3</sup>) or CH=C(R<sup>3</sup>);  
 E is tetrazolyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), HOS(O)<sub>2</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> or R<sup>10</sup>CO;  
 R is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl or heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical, where alkyl radicals can


## EP 0 842 945 B1

be mono- or polysubstituted by fluorine;

$R^0$  is hydrogen,  $(C_1-C_8)$ -alkyl,  $(C_3-C_{12})$ -cycloalkyl,  $(C_3-C_{12})$ -cycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl,  $(C_6-C_{12})$ -bicycloalkyl,  $(C_6-C_{12})$ -bicycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl,  $(C_6-C_{12})$ -tricycloalkyl,  $(C_6-C_{12})$ -tricycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl, optionally substituted  $(C_6-C_{14})$ -aryl,  $(C_6-C_{14})$ -aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl, heteroaryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical, CHO,  $(C_1-C_8)$ -alkyl-CO,  $(C_3-C_{12})$ -cycloalkyl-CO,  $(C_3-C_{12})$ -cycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl-CO,  $(C_6-C_{12})$ -bicycloalkyl-CO,  $(C_6-C_{12})$ -bicycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl-CO,  $(C_6-C_{12})$ -tricycloalkyl-CO,  $(C_6-C_{12})$ -tricycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl-CO, optionally substituted  $(C_6-C_{14})$ -aryl-CO,  $(C_6-C_{14})$ -aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl-CO optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl-CO, heteroaryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl-CO optionally substituted in the heteroaryl radical,  $(C_1-C_8)$ -alkyl- $S(O)_n$ ,  $(C_3-C_{12})$ -cycloalkyl- $S(O)_n$ ,  $(C_3-C_{12})$ -cycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl- $S(O)_n$ ,  $(C_6-C_{12})$ -bicycloalkyl- $S(O)_n$ ,  $(C_6-C_{12})$ -bicycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl- $S(O)_n$ ,  $(C_6-C_{12})$ -tricycloalkyl- $S(O)_n$ ,  $(C_6-C_{12})$ -tricycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl- $S(O)_n$ , optionally substituted  $(C_6-C_{14})$ -aryl- $S(O)_n$ ,  $(C_6-C_{14})$ -aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl- $S(O)_n$  optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl- $S(O)_n$  or heteroaryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl- $S(O)_n$  optionally substituted in the heteroaryl radical, where n is 1 or 2;

$R^1$  is one of the radicals  $-S-R^{21}$ ,  $-S-S-R^{21}$ ,  $-S(O)-R^{22}$ ,  $-S(O)_2-R^{22}$ ,  $-S-OR^{21}$ ,  $-S(O)-OR^{21}$ ,  $-S(O)_2-OR^{21}$ ,  $-S-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-S-C(O)-R^{21}$ ,  $-S-C(O)-OR^{22}$ ,  $-S-C(S)-SR^{22}$ ,  $-S-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-S-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(S)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,  $-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-S(O)_2-OR^{21}$ ,  $-O-S(O)-OR^{21}$ ,  $-O-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-S(O)_2-R^{22}$ ,  $-O-S(O)-R^{22}$ ,  $-O-P(O)(OR^{21})_2$ ,  $-O-P(O)(OR^{21})-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-P(O)(N(R^{21})-R^{28})_2$ ,  $-N(R^{28})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(O)-SR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-SR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-R^{21}$ ,  $-N(R^{28})-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)_2-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)_2-OR^{21}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-OR^{21}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-P(O)(OR^{21})_2$ ,  $-N(R^{28})-P(O)(OR^{21})-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-P(O)(N(R^{21})-R^{28})_2$ ,  $-N(R^{28})-P(O)(R^{22})-OR^{21}$ ,  $-N(R^{28})-P(O)(R^{22})-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-P(O)(R^{22})_2$ ,  $-P(O)(OR^{21})_2$ ,  $-P(O)(OR^{21})-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-P(O)(N(R^{21})-R^{28})_2$ ,  $-P(O)(R^{22})-OR^{21}$ ,  $-P(O)(R^{22})-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-P(O)(R^{22})_2$ ,  $-C(S)-R^{21}$ ,  $-C(S)-SR^{21}$ ,  $-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,

cyano, halogen, nitro or methylenedioxy or the radical of an optionally substituted, 5- to 14-membered, mono- or polycyclic, saturated or unsaturated heterocyclic ring of the formula



in which

$Q^1$  is  $-C(R^{21})_2-$ ,  $=C(R^{21})-$ ,  $-N(R^{28})-$ ,  $-O-$  or  $-S-$ ;

$Q^2$  is  $-S(O)-$  or  $-S(O)_2-$ ;

$Q^3$  is  $-C(R^{21})_2-$ ,  $=C(R^{21})-$ ,  $-N(R^{28})-$ ,  $-O-$ ,  $-S-$ ,  $-C(R^{21})(-)-$  or  $-N(-)-$

where the heterocyclic ring can be bonded to the group A via the free bond in the groups  $-C(R^{21})(-)-$  or  $-N(-)-$  representing  $Q^3$  or via any other desired ring carbon atom and where, if the heterocyclic ring is bonded to a ring system contained in the group A, the heterocyclic ring can also be fused in the group A via two adjacent atoms on the ring system;

$R^2$  is hydrogen,  $(C_1-C_8)$ -alkyl, optionally substituted  $(C_6-C_{14})$ -aryl,  $(C_6-C_{14})$ -aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl optionally substituted in the aryl radical or  $(C_3-C_8)$ -cycloalkyl;

$R^3$  is hydrogen,  $(C_1-C_8)$ -alkyl, optionally substituted  $(C_6-C_{14})$ -aryl,  $(C_6-C_{14})$ -aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl optionally substituted in the aryl radical,  $(C_3-C_8)$ -cycloalkyl,  $(C_2-C_8)$ -alkenyl,  $(C_2-C_8)$ -alkynyl,  $(C_2-C_8)$ -alkenylcarbonyl,  $(C_2-C_8)$ -alkynylcarbonyl, pyridyl,  $R^{11}NH$ ,  $R^4CO$ ,  $COOR^4$ ,  $CON(CH_3)R^4$ ,  $CONHR^4$ ,  $CSNHR^4$ ,  $COOR^{15}$ ,  $CON(CH_3)R^{15}$  or  $CONHR^{15}$ ;

$R^4$  is hydrogen or  $(C_1-C_{28})$ -alkyl which can optionally be mono- or polysubstituted by identical or different radicals from the group consisting of hydroxyl, hydroxycarbonyl, aminocarbonyl, mono- or di- $((C_1-C_{18})$ -alkyl)aminocarbonyl, amino- $(C_2-C_{18})$ -alkylaminocarbonyl, amino- $(C_1-C_3)$ -alkylphenyl- $(C_1-C_3)$ -alkylaminocarbonyl,  $(C_1-C_{18})$ -alkylcarbonylamino- $(C_1-C_3)$ -alkylphenyl- $(C_1-C_3)$ -alkylaminocarbonyl,  $(C_1-C_{18})$ -alkylcarbonylamino- $(C_2-C_{18})$ -alkylaminocarbonyl,  $(C_6-C_{14})$ -aryl- $(C_1-C_8)$ -alkoxycarbonyl which can also be substituted in the aryl radical, amino, mercapto,  $(C_1-C_{18})$ -alkoxy,  $(C_1-C_{18})$ -alkoxycarbonyl, Het-CO,

## EP 0 842 945 B1

- optionally substituted (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl, HOS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub>-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, tetrazolyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>)-alkyl, halogen, nitro, trifluoromethyl and the radical R<sup>5</sup>;
- 5 R<sup>5</sup> is optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, a mono- or bicyclic 5- to 12-membered heterocyclic ring which can be aromatic, partially hydrogenated or completely hydrogenated and which can contain one, two or three identical or different heteroatoms from the group consisting of nitrogen, oxygen and sulfur, a radical R<sup>6</sup> or a radical R<sup>6</sup>CO-, where the aryl and, independently thereof, the heterocyclic radical can be mono- or polysubstituted by identical or different radicals from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxy, halogen, nitro, amino or trifluoromethyl;
- 10 R<sup>6</sup> is R<sup>7</sup>R<sup>8</sup>N, R<sup>7</sup>O or R<sup>7</sup>S or an amino acid side chain, a natural or unnatural amino acid, imino acid, optionally N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylated or N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylated) azaamino acid or a dipeptide radical which can also be substituted in the aryl radical and/or in which the peptide bond can be reduced to -NH-CH<sub>2</sub>-, and their esters and amides, where instead of free functional groups there can optionally be hydrogen or hydroxymethyl and/or where free functional groups can be protected by protective groups customary in peptide chemistry;
- 15 R<sup>7</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylcarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxycarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-arylcarbonyl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylcarbonyl or (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyloxycarbonyl, where the alkyl groups can optionally be substituted by an amino group and/or where the aryl radicals can be mono- or polysubstituted, preferably monosubstituted, by identical or different radicals from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy, halogen, nitro, amino and trifluoromethyl, a natural or unnatural amino acid, imino acid, optionally N-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylated or N-((C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkylated) azaamino acid or a dipeptide radical which can also be substituted in the aryl radical and/or in which the peptide bond can be reduced to -NH-CH<sub>2</sub>-;
- 20 R<sup>8</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl or (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl which can also be substituted in the aryl radical;
- 25 R<sup>9</sup> is hydrogen, aminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkylaminocarbonyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkylaminocarbonyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-arylaminocarbonyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl or (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl;
- 30 R<sup>10</sup> is hydroxyl, (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkoxy, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkoxy which can also be substituted in the aryl radical, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryloxy, amino or mono- or di((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)amino;
- R<sup>11</sup> is hydrogen, R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>.CO, H-CO, R<sup>12a</sup>.O-CO, R<sup>12b</sup>.CO, R<sup>12b</sup>.CS, R<sup>12a</sup>.S(O)<sub>2</sub> or R<sup>12b</sup>.S(O)<sub>2</sub>;
- R<sup>12a</sup> is (C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkynyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl, heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical or the radical R<sup>15</sup>;
- 35 R<sup>12b</sup> is amino, di((C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-alkyl)-amino or R<sup>12a</sup>.NH;
- R<sup>13</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl or (C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl;
- R<sup>15</sup> is R<sup>16</sup>-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl or R<sup>16</sup>;
- 40 R<sup>16</sup> is a 6- to 24-membered, bicyclic or tricyclic radical which is saturated or partially unsaturated and which can also contain one, two, three or four identical or different heteroatoms from the group consisting of nitrogen, oxygen and sulfur and which can also be substituted by one or more identical or different substituents from the group consisting of (C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>)-alkyl and oxo;
- 45 R<sup>21</sup> is hydrogen, (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl or heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical, where alkyl radicals can be monosubstituted or polysubstituted by fluorine and the radicals R<sup>21</sup> can be identical or different if they occur two or more times;
- 50 R<sup>22</sup> is (C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, hydroxy-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, (C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>)-alkenyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl, (C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>)-cycloalkyl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl, optionally substituted (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl, (C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>)-aryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the aryl radical, optionally substituted heteroaryl or heteroaryl-(C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>)-alkyl optionally substituted in the heteroaryl radical, where alkyl radicals can be monosubstituted or polysubstituted by fluorine and the radicals R<sup>22</sup> can be identical or different if they occur two or more times;
- 55 R<sup>28</sup> is one of the radicals R<sup>21</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- or R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))-;
- R<sup>29</sup> is one of the radicals R<sup>22</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- or R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))-;
- Het is the radical of a 5- to 10-membered, monocyclic or polycyclic heterocycle bonded via a nitrogen atom,

## EP 0 842 945 B1

which can be aromatic or partially unsaturated or saturated and which can contain one, two, three or four identical or different additional ring heteroatoms from the group consisting of oxygen, nitrogen and sulfur and which can be optionally substituted on carbon atoms and on additional ring nitrogen atoms, where there can be identical or different radicals  $R^h$ ,  $R^hCO$  or  $R^hO-CO$  as substituents on additional ring nitrogen atoms and  $R^h$  is hydrogen,  $(C_1-C_6)$ -alkyl,  $(C_3-C_8)$ -cycloalkyl,  $(C_3-C_8)$ -cycloalkyl- $(C_1-C_8)$ -alkyl, optionally substituted  $(C_6-C_{14})$ -aryl or  $(C_6-C_{14})$ -aryl- $(C_1-C_8)$ -alkyl optionally substituted in the aryl radical;

b, c, d and f independently of one another are 0 or 1, but cannot all simultaneously be 0;

e, g and h independently of one another are 0, 1, 2, 3, 4, 5 or 6;

in all its stereoisomeric forms and mixtures thereof in all ratios, or its physiologically tolerable salts; for use as a pharmaceutical.

19. A compound of the formula Ib as claimed in claim 18 and/or its physiologically tolerable salts as an agent for the suppression of inflammation.


20. The use of compounds of the formula Ib as claimed in claim 18 and/or their physiologically tolerable salts for the production of pharmaceuticals for the treatment or prophylaxis of illnesses in which leucocyte adhesion and/or leucocyte migration exhibits an undesired extent, or of illnesses in which VLA-4-dependent adhesion processes play a part.

21. The use of compounds of the formula Ib as claimed in claim 18 and/or their physiologically tolerable salts for the production of pharmaceuticals for the treatment or prophylaxis of rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease, systemic lupus erythematosus, inflammatory disorders of the central nervous system, asthma, allergies, cardiovascular disorders, arteriosclerosis, restenoses, diabetes, for the prevention of damage to organ transplants, for the inhibition of tumor growth or tumor metastasis, for the therapy of malaria or for the inhibition of inflammation.

22. A pharmaceutical preparation which comprises one or more compounds of the formula Ib as claimed in claim 18 and/or their physiologically tolerable salts in addition to pharmaceutically innocuous excipients and/or additives.

## Revendications

### 1. Composés de formule I



où

W représente  $R^1-A-C(R^{13})$  ou  $R^1-A-CH=C$ ;

Y représente un groupe carbonyle, thiocarbonyle ou méthylène;


Z représente  $N(R^0)$ , l'oxygène, le soufre ou un groupe méthylène;

A représente un reste divalent de la série alkylène en  $C_1-C_6$ , cycloalkylène en  $C_3-C_{12}$ , alkylène en  $C_1-C_6$ -cycloalkyle en  $C_3-C_{12}$ , phénylène, phénylène-alkyle en  $C_1-C_6$ , alkylène en  $C_1-C_6$ -phényle, alkylène en  $C_1-C_6$ -phényl-alkyle en  $C_1-C_6$ , phénylène-alcényle en  $C_2-C_6$  ou un reste divalent d'un cycle saturé ou insaturé à 5 ou 6 chaînons, qui peut contenir 1 ou 2 atomes d'azote et qui peut être substitué 1 ou 2 fois par alkyle en  $C_1-C_6$  ou l'oxygène ou le soufre doublement lié, ou représente une liaison directe;

B représente un reste divalent de la série alkylène en  $C_1-C_6$ , alcénylène en  $C_2-C_6$ , phénylène, phénylène-alkyle en  $C_1-C_6$ , alkylène en  $C_1-C_6$ -phényle, où le reste alkylène en  $C_1-C_6$  divalent peut être non substitué ou substitué par un reste de la série alkyle en  $C_1-C_6$ , alcényle en  $C_2-C_6$ , alcynyle en  $C_2-C_6$ , cycloalkyle en  $C_3-C_{10}$ , cycloalkyle en  $C_3-C_{10}$ -alkyle en  $C_1-C_6$ , aryle en  $C_6-C_{14}$  éventuellement substitué, aryle en  $C_6-C_{14}$ -alkyle en  $C_1-C_6$  éventuellement substitué dans la partie aryle, hétéroaryle éventuellement substitué et hé-

## EP 0 842 945 B1

- téroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle ;
- D représente C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>), N(R<sup>3</sup>) ou CH=C(R<sup>3</sup>) ;
- E représente tétrazole, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), HOS(O)<sub>2</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> ou R<sup>10</sup>CO ;
- R représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué ou hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, où les restes alkyle peuvent être substitués une ou plusieurs fois par le fluor ;
- R<sup>0</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, bicycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>, bicycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, tricycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>, tricycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué, hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, CHO, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-CO, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-CO, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-CO, bicycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-CO, bicycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-CO, tricycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-CO, tricycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-CO, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-CO éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-CO éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryl-CO éventuellement substitué, hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-CO éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-S(O)<sub>n</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-S(O)<sub>n</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-S(O)<sub>n</sub>, bicycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-S(O)<sub>n</sub>, bicycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-S(O)<sub>n</sub>, tricycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-S(O)<sub>n</sub>, tricycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-S(O)<sub>n</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-S(O)<sub>n</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-S(O)<sub>n</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryl-S(O)<sub>n</sub> éventuellement substitué, ou hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-S(O)<sub>n</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, où n représente 1 ou 2 ;
- R<sup>1</sup> représente l'un des restes -S-R<sup>21</sup>, -S-S-R<sup>21</sup>, -S(O)-R<sup>22</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -S-OR<sup>21</sup>, -S(O)-OR<sup>21</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -S-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(O)-R<sup>21</sup>, -S-C(O)-OR<sup>22</sup>, -S-C(S)-SR<sup>22</sup>, -S-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(S)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O<sub>2</sub>)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -O-S(O)-R<sup>22</sup>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-SR<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, cyano, halogène, nitro ou méthylènedioxy ou représente le reste d'un cycle hétérocyclique mono- ou polycyclique, saturé ou insaturé à 5 à 14 chaînons, éventuellement substitué, de formule



- où
- Q<sup>1</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- ou -S-,
- Q<sup>2</sup> représente -S(O)- ou -S(O)<sub>2</sub>- ;
- Q<sup>3</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)-, où le cycle hétérocyclique peut être lié au groupe A par la liaison libre dans les groupes -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)- représentant Q<sup>3</sup> ou par un autre atome de carbone cyclique quelconque et où, quand le cycle hétérocyclique est lié à un système cyclique contenu dans le groupe A, le cycle hétérocyclique peut aussi être condensé au système cyclique dans le groupe A par deux atomes voisins ;
- R<sup>2</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle ou cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> ;
- R<sup>3</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, alcynyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-carbonyle, alcynyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-carbonyle, pyridyle, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>15</sup>



## EP 0 842 945 B1

- ou CONHR<sup>15</sup>;
- R<sup>4</sup>** représente l'hydrogène ou alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>28</sub>, qui peut éventuellement être substitué une ou plusieurs fois par des restes identiques ou différents de la série hydroxyle, hydroxycarbonyle, aminocarbonyle, mono- ou di(alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)aminocarbonyle, aminoalkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-aminocarbonyle, aminoalkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-phényl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-aminocarbonyle, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-carbonylamino-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-phényl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-aminocarbonyle, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-carbonylamino-alkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-aminocarbonyle, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-carbonyle, qui peut aussi être substitué dans le reste aryle, amino, mercapto, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-carbonyle, Het-CO, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué, HOS(O)<sub>2</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, tétrazolyl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, halogène, nitro, trifluorométhyle et le reste R<sup>5</sup>;
- R<sup>5</sup>** représente aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, un cycle hétérocyclique mono- ou bicyclique à 5 à 12 chaînons qui peut être aromatique, partiellement hydrogéné ou totalement hydrogéné, qui peut contenir 2 ou 3 hétéroatomes identiques ou différents de la série de l'azote, de l'oxygène et du soufre, un reste R<sup>6</sup> ou un reste R<sup>6</sup>CO-, où le reste aryle et, indépendamment de celui-ci, le reste hétérocyclique peuvent être substitués ou une plusieurs fois par des restes identiques ou différents de la série alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, halogène, nitro, amino ou trifluorométhyle;
- R<sup>6</sup>** représente R<sup>7</sup>R<sup>8</sup>N, R<sup>7</sup>O ou R<sup>7</sup>S ou une chaîne latérale d'acide aminé, un reste naturel ou non naturel d'acide aminé, d'iminoacide, d'azacide aminé N-alkylé par alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ou N-alkylé par aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ou un reste de dipeptide qui peut aussi être substitué dans la partie aryle et/ou dans lequel la liaison peptidique peut être réduite en -NH-CH<sub>2</sub>-, ainsi que leurs esters et amides, où l'hydrogène ou hydroxyméthyle peut éventuellement remplacer des groupes fonctionnels libres et/ou des groupes fonctionnels libres peuvent être protégés par des groupes protecteurs courants en chimie des peptides;
- R<sup>7</sup>** représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-carbonyle, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-carbonyle, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-carbonyle, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-carbonyle ou aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-oxycarbonyle, où les groupes alkyle peuvent éventuellement être substitués par un groupe amino et/ou les restes aryle peuvent éventuellement être substitués une ou plusieurs fois, de préférence une fois, par des restes identiques ou différents de la série alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, halogène, nitro, amino et trifluorométhyle, un reste naturel ou non naturel d'acide aminé, d'iminoacide, d'azacide aminé éventuellement N-alkylé par alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ou N-alkylé par aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ou un reste de dipeptide, qui peut aussi être substitué dans le reste aryle et/ou dans lequel la liaison peptidique peut être réduite en -NH-CH<sub>2</sub>-;
- R<sup>8</sup>** représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué ou aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> qui peut aussi être substitué dans le reste aryle;
- R<sup>9</sup>** représente l'hydrogène, aminocarbonyle, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-aminocarbonyle, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-aminocarbonyle, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-aminocarbonyle éventuellement substitué, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué ou cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>;
- R<sup>10</sup>** représente hydroxyle, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, qui peut aussi être substitué dans le reste aryle, aryloxy en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, amino ou mono- ou di-(alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-amino;
- R<sup>11</sup>** représente l'hydrogène, R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, H-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO, R<sup>12b</sup>-CS, R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub> ou R<sup>12b</sup>-S(O)<sub>2</sub>;
- R<sup>12a</sup>** représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, alcynyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué, hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle ou le reste R<sup>15</sup>;
- R<sup>12b</sup>** représente amino, di-(alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)amino ou R<sup>12a</sup>-NH;
- R<sup>13</sup>** représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> ou cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>;
- R<sup>15</sup>** représente R<sup>16</sup>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ou le reste R<sup>16</sup>;
- R<sup>16</sup>** représente un reste bicyclique ou tricyclique à 6 à 24 chaînons qui est saturé ou partiellement insaturé et qui peut aussi contenir 1, 2, 3 ou 4 hétéroatomes identiques ou différents de la série de l'azote, de l'oxygène et du soufre et qui peut aussi être substitué par un ou plusieurs substi-

## EP 0 842 945 B1

- tuants identiques ou différents de la série alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> et oxo ;
- 5 R<sup>21</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, hydroxyalkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué ou hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, où des restes alkyle peuvent être substitués une ou plusieurs fois par le fluor et les restes R<sup>21</sup>, quand ils apparaissent plusieurs fois, peuvent être identiques ou différents ;
- 10 R<sup>22</sup> représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, hydroxyalkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué ou hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, où des restes alkyle peuvent être substitués une ou plusieurs fois par le fluor et les restes R<sup>22</sup>, quand ils apparaissent plusieurs fois, peuvent être identiques ou différents ;
- 15 R<sup>28</sup> représente l'un des restes R<sup>21</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- ou R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>)) ;
- R<sup>29</sup> représente l'un des restes R<sup>22</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- ou R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>)) ;
- 20 Het représente le reste d'un hétérocycle monocyclique ou polycyclique à 5 à 10 chaînons lié par le biais d'un atome d'azote, qui peut être aromatique ou partiellement insaturé ou saturé et qui peut contenir 1, 2, 3 ou 4 hétéroatomes cycliques supplémentaires identiques ou différents de la série de l'oxygène, de l'azote et du soufre et qui peut éventuellement être substitué sur des atomes de carbone et sur des atomes d'azote cycliques supplémentaires, où des restes R<sup>h</sup>, R<sup>h</sup>CO ou R<sup>h</sup>O-CO identiques ou différents peuvent être situés comme substituants sur des atomes d'azote cycliques supplémentaires et R<sup>h</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué ou aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle ;
- 25 b, c, d et f représentent indépendamment les uns des autres 0 ou 1 mais ne peuvent pas tous représenter simultanément 0 ;
- 30 e, g et h représentent indépendamment les uns des autres 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ;
- sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables ;
- où, cependant, quand, simultanément, W représente 4-cyanophényl -C(R<sup>13</sup>), Y représente un groupe carbonyle, Z représente NR<sup>0a</sup>, B représente un groupe méthylène non substitué, R représente R<sup>a</sup>, b, c et d représentent 1 et e, f et g représentent 0, D ne peut pas représenter C(R<sup>2a</sup>)(R<sup>3a</sup>), où
- 35 R<sup>0a</sup>, R<sup>a</sup> et R<sup>2a</sup> représentent indépendamment les uns des autres l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle ou cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> et
- 40 R<sup>3a</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> ou 2-, 3- ou 4-pyridyle.


## 2. Composés de formule I selon la revendication 1 où

- 45 W représente R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) ou R<sup>1</sup>-A-CH=C ;
- Y représente un groupe carbonyle, thiocarbonyle ou méthylène ;
- Z représente N(R<sup>0</sup>), l'oxygène, le soufre ou un groupe méthylène ;
- 50 A représente un reste divalent de la série alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, cycloalkylène en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, phénylène, phénylène-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-phénylène, alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-phényl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, phénylène-alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> ou un reste divalent d'un cycle saturé ou insaturé à 5 ou 6 chaînons, qui peut contenir 1 ou 2 atomes d'azote et qui peut être substitué 1 ou 2 fois par alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ou l'oxygène ou le soufre doublement lié, ou représente une liaison directe ;
- 55 B représente un reste divalent de la série alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alcénylène en C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, phénylène, phénylène-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-phénylène ;
- D représente C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>), N(R<sup>3</sup>) ou CH=C(R<sup>3</sup>) ;
- E représente tétrazolyle, (R<sup>0</sup>O)<sub>2</sub>P(O), HOS(O)<sub>2</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> ou R<sup>10</sup>CO ;
- R et R<sup>0</sup> représentent indépendamment l'un de l'autre l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>.

## EP 0 842 945 B1

cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué ou hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, où les restes alkyle peuvent être substitués une ou plusieurs fois par le fluor ;

5 R<sup>1</sup> représente l'un des restes -S-R<sup>21</sup>, -S-S-R<sup>21</sup>, -S(O)-R<sup>22</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -S-OR<sup>21</sup>, -S(O)-OR<sup>21</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -S-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(O)-R<sup>21</sup>, -S-C(O)-OR<sup>22</sup>, -S-C(S)-SR<sup>22</sup>, -S-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(S)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -O-S(O)-R<sup>22</sup>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -C(S)-SR<sup>21</sup>, -C(S)-SR<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, cyano, halogène, nitro ou méthylènedioxy ou représente le reste d'un cycle hétérocyclique mono- ou polycyclique, saturé ou insaturé à 5 à 14 chaînons, éventuellement substitué, de formule



20

25 où

Q<sup>1</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- ou -S-,  
 Q<sup>2</sup> représente -S(O)- ou -S(O)<sub>2</sub>- ;  
 30 Q<sup>3</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)-, où le cycle hétérocyclique peut être lié au groupe A par la liaison libre dans les groupes -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)- représentant Q<sup>3</sup> ou par un autre atome de carbone cyclique quelconque et où, quand le cycle hétérocyclique est lié à un système cyclique contenu dans le groupe A, le cycle hétérocyclique peut aussi être condensé au système cyclique dans le groupe A par deux atomes voisins ;  
 35 R<sup>2</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle ou cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> ;  
 R<sup>3</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, alcyne en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-carbonyl, alcyne en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-carbonyl, pyridyle, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>15</sup> ou CONHR<sup>15</sup> ;  
 40 R<sup>4</sup> représente l'hydrogène ou alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>28</sub>, qui peut éventuellement être substitué une ou plusieurs fois par des restes identiques ou différents de la série hydroxyle, hydroxycarbonyl, aminocarbonyl, mono- ou di(alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)aminocarbonyl, aminoalkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-aminocarbonyl, aminoalkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-phényl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-aminocarbonyl, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-carbonylamino-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-phényl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-aminocarbonyl, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-carbonylamino-alkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-aminocarbonyl, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-carbonyl, qui peut aussi être substitué dans le reste aryle, amino, mercapto, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-carbonyl, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué, HOS(O)<sub>2</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, tétrazolylalkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, halogène, nitro, trifluorométhyle et le reste R<sup>5</sup> ;  
 45 R<sup>5</sup> représente aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, un cycle hétérocyclique mono- ou bicyclique à 5 à 12 chaînons qui peut être aromatique, partiellement hydrogéné ou totalement hydrogéné et qui peut contenir 1, 2 ou 3 hétéroatomes identiques ou différents de la série de l'azote, de l'oxygène et du soufre, un reste R<sup>6</sup> ou un reste R<sup>6</sup>CO-, où le reste aryle et, indépendamment de celui-ci, le reste hétérocyclique peuvent être substitués ou une plusieurs fois par des restes identiques ou différents de la série alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, halogène, nitro, amino ou trifluorométhyle ;  
 50 R<sup>6</sup> représente R<sup>7</sup>R<sup>8</sup>N, R<sup>7</sup>O ou R<sup>7</sup>S ou une chaîne latérale d'acide aminé, un reste naturel ou non naturel d'acide aminé, d'iminoacide, d'azaaminoacide éventuellement N-alkylé par alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ou N-

55


## EP 0 842 945 B1

- alkylé par aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ou un reste de dipeptide qui peut aussi être substitué dans la partie aryle et/ou dans lequel la liaison peptidique peut être réduite en -NH-CH<sub>2</sub>-, ainsi que leurs esters et amides, où l'hydrogène ou hydroxyméthyle peut éventuellement remplacer des groupes fonctionnels libres et/ou des groupes fonctionnels libres peuvent être protégés par des groupes protecteurs courants en chimie des peptides ;
- 5 R<sup>7</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-carbonyle, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-carbonyle, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-carbonyle, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-carbonyle ou aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-oxycarbonyle, où les groupes alkyle peuvent éventuellement être substitués par un groupe amino et/ou les restes aryle peuvent éventuellement être substitués une ou plusieurs fois, de préférence une fois, par des restes identiques ou différents de la série
- 10 alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, halogène, nitro, amino et trifluorométhyle, un reste naturel ou non naturel d'acide, d'iminoacide, d'azaaminoacide éventuellement N-alkylé par alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ou N-alkylé par aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ou un reste de dipeptide, qui peut aussi être substitué dans le reste aryle et/ou dans lequel la liaison peptidique peut être réduite en -NH-CH<sub>2</sub>-;
- 15 R<sup>8</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué ou aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> qui peut aussi être substitué dans le reste aryle ;
- R<sup>9</sup> représente l'hydrogène, aminocarbonyle, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-aminocarbonyle, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-aminocarbonyle, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-aminocarbonyle éventuellement substitué, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué ou cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> ;
- 20 R<sup>10</sup> représente hydroxyle, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, qui peut aussi être substitué dans le reste aryle, aryloxy en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, amino ou mono- ou di-(alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-amino ;
- R<sup>11</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, R<sup>12</sup>CO, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-S(O)<sub>2</sub> éventuellement substitué, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-S(O)<sub>2</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> ou le reste R<sup>15</sup> ;
- 25 R<sup>12</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, alcynyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> qui peut aussi être substitué dans le reste aryle, aryloxy en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>, amino ou mono- ou di-(alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)-amino, le reste R<sup>15</sup> ou le reste ou le reste R<sup>15</sup>-O- ;
- 30 R<sup>13</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle ou cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> ;
- R<sup>15</sup> représente R<sup>16</sup>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ou le reste R<sup>16</sup> ;
- R<sup>16</sup> représente un reste bicyclique ou tricyclique à 6 à 24 chaînons qui est saturé ou partiellement insaturé et qui peut aussi contenir 1 à 4 hétéroatomes identiques ou différents de la série de l'azote, de
- 35 l'oxygène et du soufre et qui peut aussi être substitué par un ou plusieurs substituants identiques ou différents de la série alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> et oxo ;
- R<sup>21</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, hydroxyalkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué ou hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, où des restes alkyle peuvent être substitués une ou plusieurs fois par le fluor et les restes R<sup>21</sup>, quand ils apparaissent plusieurs fois, peuvent être identiques ou différents ;
- 40 R<sup>22</sup> représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, hydroxyalkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué ou hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, où des restes alkyle peuvent être substitués une ou plusieurs fois par le fluor et les restes R<sup>22</sup>, quand ils apparaissent plusieurs fois, peuvent être identiques ou différents ;
- 45 R<sup>28</sup> représente l'un des restes R<sup>21</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- ou R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>)) ;
- 50 R<sup>29</sup> représente l'un des restes R<sup>22</sup>-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-, R<sup>21</sup>C(O)-, R<sup>22</sup>O-C(O)-, R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(O)- ou R<sup>21</sup>N(R<sup>21</sup>)-C(=N(R<sup>21</sup>))-
- b, c, d et f représentent indépendamment les uns des autres 0 ou 1 mais ne peuvent pas tous représenter simultanément 0 ;
- 55 e, g et h représentent indépendamment les uns des autres 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ;

sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables.

## EP 0 842 945 B1

3. Composés de formule I selon la revendication 1 et/ou 2 où R<sup>1</sup> représente l'un des restes  
 -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
 -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N  
 (R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)  
 -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> ou cyano ou représente le reste d'un  
 cycle hétérocyclique mono- ou polycyclique, saturé ou insaturé à 5 à 14 chaînons, éventuellement substitué, de  
 formule



où

Q<sup>1</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- ou -S-,

Q<sup>2</sup> représente -S(O)- ou -S(O)<sub>2</sub>- ;

Q<sup>3</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)-, où le cycle hétérocyclique peut être  
 lié au groupe A par la liaison libre dans les groupes -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)- représentant Q<sup>3</sup> ou par un autre  
 atome de carbone cyclique quelconque et où, quand le cycle hétérocyclique est lié à un système cyclique  
 contenu dans le groupe A, le cycle hétérocyclique peut aussi être condensé au système cyclique dans le  
 groupe A par deux atomes voisins ;

sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physio-  
 logiquement acceptables.

4. Composés de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1 à 3 où R<sup>0</sup> représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, cy-  
 cloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en  
 C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué ou  
 hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, de préférence biphenylméthyle,  
 naphthylméthyle ou benzyle non substitué ou substitué une fois ou plusieurs fois dans le reste aryle ;  
 sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physio-  
 logiquement acceptables.

5. Composés de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1, 3 et 4 où simultanément  
 W représente R<sup>1</sup>-A-CH=C et dans celui-ci A représente un reste phénylène ou un reste méthylènenphénylène ou W  
 représente R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) et dans celui-ci A représente un reste divalent de la série méthylène, éthylène, triméthyl-  
 ène, tétraméthylène, pentaméthylène, cyclohexylène, phénylène, phénylèneméthyle, méthylènenphénylène,  
 méthylènenphénylméthyle ;

B représente un reste divalent de la série méthylène, éthylène, triméthylène, tétraméthylène, vinylène, phénylène  
 ou représente méthylène ou éthylène substitué ;

E représente R<sup>10</sup>CO ;


R représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ou benzyle ;

R<sup>0</sup> représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué ou aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-  
 alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle ;

R<sup>1</sup> représente l'un des restes

-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>,  
 -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N  
 (R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)  
 -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> ou cyano ou représente le reste d'un  
 cycle hétérocyclique mono- ou polycyclique, saturé ou insaturé à 5 à 14 chaînons, éventuellement substitué, de  
 formule

## EP 0 842 945 B1



où

Q<sup>1</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- ou -S-,

Q<sup>2</sup> représente -S(O)- ou -S(O)<sub>2</sub>- ;

Q<sup>3</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N-(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)-, où le cycle hétérocyclique peut être lié au groupe A par la liaison libre dans les groupes -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)- représentant Q<sup>3</sup> ou par un autre atome de carbone cyclique quelconque et où, quand le cycle hétérocyclique est lié à un système cyclique contenu dans le groupe A, le cycle hétérocyclique peut aussi être condensé au système cyclique dans le groupe A par deux atomes voisins ;

R<sup>2</sup> représente l'hydrogène ou alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ;

R<sup>3</sup> représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, alcynyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, pyridyle, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup> et CONHR<sup>15</sup> ;

et e, g et h représentent indépendamment les uns des autres les nombres 0, 1, 2 ou 3 ;  
sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables.

6. Composés de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1 à 5 où W représente R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) et R<sup>13</sup> représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle ou cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> ;

sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables.

7. Composés de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1 à 3 où R<sup>3</sup> représente aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, COOR<sup>4</sup>, R<sup>11</sup>NH ou CONHR<sup>4</sup>, où -NHR<sup>4</sup> représente le reste d'un α-aminoacide, son ω-aminoalkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-amide, son ester d'alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, son aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-ester ou son dérivé où le groupe acide carboxylique est converti en le groupe Het-CO, de préférence le reste des α-aminoacides valine, lysine, phénylglycine, phénylalanine ou tryptophane ou de leur ester d'alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, de leur aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-ester ou de leur dérivé Het-CO ;

sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables.

8. Composés de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1 et 3 à 7 où simultanément

W représente R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) ;

Y représente un groupe carbonyle ;

Z représente N(R<sup>0</sup>) ;

A représente éthylène, triméthylène, tétraméthylène, pentaméthylène, cyclohexylène, phénylène, phénylèneméthyle, méthylènenphényle ou méthylènenphénylméthyle ;

B représente un reste méthylène non substitué ou substitué ;

D représente C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>) ;

E représente R<sup>10</sup>CO ;

R représente l'hydrogène ou alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, en particulier l'hydrogène, méthyle ou éthyle ;

R<sup>0</sup> représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué ou aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle ;

R<sup>1</sup> représente l'un des restes -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> ou cyano ;

R<sup>2</sup> représente l'hydrogène ;

R<sup>3</sup> représente le reste CONHR<sup>4</sup> ;

R<sup>4</sup> représente méthyle, qui est substitué par hydroxycarbonyle et un reste de la série alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, phényle et

## EP 0 842 945 B1

benzyle, ou représente méthyle, qui est substitué par alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-carbonyle, de préférence alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-carbonyle, et un reste de la série alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, phényle et benzyle, ou représente méthyle, qui est substitué par Het-CO et un reste de la série alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, phényle et benzyle ;

R<sup>10</sup> représente hydroxyle ou alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, de préférence alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>;

5 R<sup>13</sup> représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub> ou benzyle, en particulier méthyle ;

b, c et d représentent 1 et e, f et g représentent 0 ;

h représente 1 ou 2, de préférence 1 ;

sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables.

10

9. Composés de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1, 3, 4 et 5 où simultanément

W représente R<sup>1</sup>-A-CH=C et dans celui-ci A représente un reste phénylène ou un reste méthylène-phénylène ou W représente R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) et dans celui-ci A représente un reste divalent de la série méthylène, éthylène, triméthylène, tétraméthylène, pentaméthylène, cyclohexylène, phénylène, phénylène-méthyle, méthylène-phénylène, méthylène-phénylméthyle ;

15

B représente un reste divalent de la série méthylène, éthylène, triméthylène, tétraméthylène, vinylène, phénylène ou représente méthylène ou éthylène substitué ;

E représente R<sup>10</sup>CO ;

R représente l'hydrogène ou alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ;


20

R<sup>0</sup> représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué ou aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle ;

R<sup>1</sup> représente l'un des restes -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> ou cyano ou représente le reste d'un cycle hétérocyclique mono- ou polycyclique, saturé ou insaturé à 5 à 14 chaînons, éventuellement substitué, de formule

25

30



35

où

Q<sup>1</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- ou -S-,

Q<sup>2</sup> représente -S(O)- ou -S(O)<sub>2</sub>- ;

40

Q<sup>3</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)-, où le cycle hétérocyclique peut être lié au groupe A par la liaison libre dans les groupes -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)- représentant Q<sup>3</sup> ou par un autre atome de carbone cyclique quelconque et où, quand le cycle hétérocyclique est lié à un système cyclique contenu dans le groupe A, le cycle hétérocyclique peut aussi être condensé au système cyclique dans le groupe A par deux atomes voisins ;

45

R<sup>2</sup> représente l'hydrogène ou alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ;

R<sup>3</sup> représente CONHR<sup>15</sup> ou CONHR<sup>4</sup>, où R<sup>4</sup> représente un reste alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> non substitué ou substitué par un ou plusieurs restes aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> ;

50

R<sup>15</sup> représente R<sup>16</sup>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ou le reste R<sup>16</sup>, où R<sup>16</sup> représente un reste bicyclique ou tricyclique ponté à 7 à 12 chaînons qui est saturé ou partiellement insaturé et qui peut aussi contenir 1 à 4 hétéroatomes identiques ou différents de la série de l'azote, de l'oxygène et du soufre et qui peut aussi être substitué par un ou plusieurs substituants identiques ou différents de la série alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> et oxo, et en particulier R<sup>15</sup> représente un reste adamantyle ou un reste adamantylméthyle ;

et e, g et h représentent indépendamment les uns des autres les nombres

55


0, 1, 2 ou 3 et b, c et d représentent 1 ;

sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables.

## EP 0 842 945 B1

10. Composés de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1, 3, 4, 5, 6 et 9 où simultanément  
W représente  $R^1-A-C(R^{13})$  ;  
Y représente un groupe carbonyle ;  
Z représente  $N(R^0)$  ;  
5 A représente éthylène, triméthylène, tétraméthylène, pentaméthylène, cyclohexylène, phénylène, phénylèneméthyle, méthylènenaphényle ou méthylènenaphénylméthyle ;  
B représente un reste méthylène substitué ou non substitué ;  
D représente  $C(R^2)(R^3)$  ;  
E représente  $R^{10}CO$  ;  
10 R représente l'hydrogène ou alkyle en  $C_1-C_4$ , en particulier l'hydrogène, méthyle ou éthyle ;  
 $R^0$  représente alkyle en  $C_1-C_8$ , cycloalkyle en  $C_3-C_8$ , aryle en  $C_6-C_{14}$  éventuellement substitué ou aryle en  $C_6-C_{14}$ -alkyle en  $C_1-C_8$  éventuellement substitué dans le reste aryle ;
- 15  $R^1$  représente l'un des restes  $-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,  $-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{29})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$  ou cyano ;  
 $R^2$  représente l'hydrogène ;  
 $R^3$  représente  $CONHR^{15}$  ou  $CONHR^4$ , où  $R^4$  représente un reste alkyle en  $C_1-C_6$  non substitué ou substitué par un ou plusieurs restes aryle en  $C_6-C_{10}$  ;  
 $R^{10}$  représente hydroxyle ou alcoxy en  $C_1-C_8$ , de préférence alcoxy en  $C_1-C_4$  ;  
20  $R^{13}$  représente alkyle en  $C_1-C_6$ , cycloalkyle en  $C_3-C_7$  ou benzyle, en particulier méthyle ;  
 $R^{15}$  représente un reste adamantyle ou un reste adamantylméthyle ;
- b, c et d représentent 1 et e, f et g représentent 0 ;  
h représente 1 ou 2, de préférence 1 ;  
25 sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables.

11. Composés de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1 et 3 à 6 où simultanément  
W représente  $R^1-A-C(R^{13})$  ;  
30 Y représente un groupe carbonyle ;  
Z représente  $N(R^0)$  ;  
A représente éthylène, triméthylène, tétraméthylène, pentaméthylène, cyclohexylène, phénylène, phénylèneméthyle, méthylènenaphényle, méthylènenaphénylméthyle ;  
B représente un reste méthylène substitué ou non substitué ou un reste éthylène ;  
35 D représente  $C(R^2)(R^3)$  ;  
E représente  $R^{10}CO$  ;  
R représente l'hydrogène ou alkyle en  $C_1-C_4$ , en particulier l'hydrogène, méthyle ou éthyle ;  
 $R^0$  représente alkyle en  $C_1-C_8$ , cycloalkyle en  $C_3-C_8$ , aryle en  $C_6-C_{14}$  éventuellement substitué ou aryle en  $C_6-C_{14}$ -alkyle en  $C_1-C_8$  éventuellement substitué dans le reste aryle ;  
40  $R^1$  représente l'un des restes  $-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-C(O)-R^{21}$ ,  $-O-C(O)-OR^{22}$ ,  $-O-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-O-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{29})-C(O)-OR^{22}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-OR^{21}$ ,  $-N(R^{28})-C(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)_2-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-R^{22}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)_2-OR^{21}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-OR^{21}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)_2-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-N(R^{28})-S(O)-N(R^{21})-R^{28}$ ,  $-C(S)-R^{21}$ ,  $-C(S)-N(R^{21})-R^{28}$  ou cyano ou  
45 représente le reste d'un cycle hétérocyclique mono- ou polycyclique, saturé ou insaturé à 5 à 14 chaînons, éventuellement substitué, de formule



- où
- 55  $Q^1$  représente  $-C(R^{21})_2-$ ,  $=C(R^{21})-$ ,  $-N(R^{28})-$ ,  $-O-$  ou  $-S-$  ;  
 $Q^2$  représente  $-S(O)-$  ou  $-S(O)_2-$  ;  
 $Q^3$  représente  $-C(R^{21})_2-$ ,  $=C(R^{21})-$ ,  $-N(R^{28})-$ ,  $-O-$ ,  $-S-$ ,  $-C(R^{21})(-)-$  ou  $-N(-)-$ , où le cycle hétérocyclique peut



## EP 0 842 945 B1


être lié au groupe A par la liaison libre dans les groupes -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)- représentant Q<sup>3</sup> ou par un autre atome de carbone cyclique quelconque et où, quand le cycle hétérocyclique est lié à un système cyclique contenu dans le groupe A, le cycle hétérocyclique peut aussi être condensé au système cyclique dans le groupe A par deux atomes voisins ;

- 5 R<sup>2</sup> représente l'hydrogène ;  
 R<sup>3</sup> représente un reste phényle ou un reste naphtyle non substitué, un reste phényle ou un reste naphtyle substitué par un deux ou trois restes identiques ou différents de la série alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, hydroxyle, halogène, trifluorométhyle, nitro, méthylènedioxy, éthylènedioxy, hydroxycarbonyle, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>-carbonyle, aminocarbonyle, cyano, phényle, phénoxy et benzyloxy, un reste pyridyle, un reste alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, un reste alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub>, un reste alcynyle en C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> ou un reste cycloalkyle en C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>, et en particulier R<sup>3</sup> représente un reste phényle ou un reste naphtyle non substitué ou substitué ;  
 10 R<sup>10</sup> représente hydroxyle ou alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, en particulier alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, et de préférence R<sup>10</sup> représente un reste de la série hydroxyle, méthoxy, éthoxy, propoxy et isopropoxy ;  
 R<sup>13</sup> représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub> ou benzyle, en particulier méthyle ;

15 b, c et d représentent 1 et e, f et g représentent 0 ;  
 h représente 1 ou 2, de préférence 1 ;  
 sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables.

- 20 12. Composés de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1 et 3 à 6 où simultanément  
 W représente R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) ;  
 Y représente un groupe carbonyle ;  
 Z représente N(R<sup>0</sup>) ;

- 25 A représente éthylène, triméthylène, tétraméthylène, pentaméthylène, cyclohexylène, phénylène, phénylèneméthyle, méthylènenphényle, méthylènenphénylméthyle ;  
 B représente un reste méthylène substitué ou non substitué ou un reste éthylène ;  
 D représente C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>) ;  
 E représente R<sup>10</sup>CO ;  
 30 R représente l'hydrogène ou alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, en particulier l'hydrogène, méthyle ou éthyle ;  
 R<sup>0</sup> représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué ou aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle ;  
 R<sup>1</sup> représente l'un des restes -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> ou cyano ou  
 35 représente le reste d'un cycle hétérocyclique mono- ou polycyclique, saturé ou insaturé à 5 à 14 chaînons, éventuellement substitué, de formule



- 45 où
- 50 Q<sup>1</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- ou -S-,  
 Q<sup>2</sup> représente -S(O)- ou -S(O)<sub>2</sub>- ;  
 Q<sup>3</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)-, où le cycle hétérocyclique peut être lié au groupe A par la liaison libre dans les groupes -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)- représentant Q<sup>3</sup> ou par un autre atome de carbone cyclique quelconque et où, quand le cycle hétérocyclique est lié à un système cyclique contenu dans le groupe A, le cycle hétérocyclique peut aussi être condensé au système cyclique dans le groupe A par deux atomes voisins ;  
 55 R<sup>2</sup> représente l'hydrogène ;  
 R<sup>3</sup> représente R<sup>11</sup>NH ;

## EP 0 842 945 B1

R<sup>10</sup> représente hydroxyle ou alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, en particulier alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, et de préférence R<sup>10</sup> représente un reste de la série hydroxyle, méthoxy, éthoxy, propoxy et isopropoxy ;  
 R<sup>13</sup> représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>7</sub> ou benzyle, en particulier méthyle ;

5 b, c, d et e représentent 1 et f et g représentent 0 ;  
 h représente 0 ;

sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables.

10 13. Composé de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1, 3, 4, 5, 6 et 12 où

R<sup>11</sup> représente R<sup>12a</sup>, R<sup>12a</sup>-CO, R<sup>12a</sup>-O-CO, R<sup>12b</sup>-CO, R<sup>12b</sup>-CS ou R<sup>12a</sup>-S(O)<sub>2</sub> ;

15 R<sup>12a</sup> représente alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>10</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, alcynyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué, hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle ou le reste R<sup>15</sup> ;

R<sup>12b</sup> représente R<sup>12a</sup>-NH ;

20 sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables.


25 14. Composés de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1 et 2 à 13 où un reste méthylène substitué ou un reste éthylène substitué représentant le groupe B porte comme substituant un reste de la série alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, alcynyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, en particulier cycloalkyle en C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, en particulier cycloalkyle en C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>10</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué et hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle ;  
 sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables.

30 15. Composés de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1 et 2 à 14 où B représente un reste méthylène non substitué ou un reste méthylène qui est substitué par un reste alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ;  
 sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables.

35 16. Composés de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1 à 15 où R<sup>1</sup> représente l'un des restes -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup> ou cyano ;  
 sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables.

40 17. Procédé de préparation de composés de formule I selon une ou plusieurs des revendications 1 à 16 caractérisé en ce que l'on réalise une condensation de fragments d'un composé de formule II

45




50

avec un composé de formule III


55

## EP 0 842 945 B1



10 où W, Y, Z, B, D, E et R ainsi que b, d, e, f, g et h sont définis de la manière indiquée dans les revendications 1 à 16 et G représente hydroxycarbonyle, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-carbonyle, des dérivés d'acide carboxylique activés, comme des chlorures d'acide, des esters actifs ou des anhydrides mixtes, ou représente isocyanato.

## 18. Composés de formule Ib




25 où

- W représente R<sup>1</sup>-A-C(R<sup>13</sup>) ou R<sup>1</sup>-A-CH=C ;  
 Y représente un groupe carbonyle, thiocarbonyle ou méthylène ;  
 Z représente N(R<sup>0</sup>), l'oxygène, le soufre ou un groupe méthylène ;  
 30 A représente un reste divalent de la série alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, cycloalkylène en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, phénylène, phénylène-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-phényle, alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>-phényl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, phénylène-alcénylène en C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub> ou un reste divalent d'un cycle saturé ou insaturé à 5 ou 6 chaînons, qui peut contenir 1 ou 2 atomes d'azote et qui peut être substitué 1 ou 2 fois par alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> ou l'oxygène ou le soufre doublement lié, ou représente une liaison directe ;  
 35 B représente un reste divalent de la série alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, alcénylène en C<sub>2</sub>-C<sub>6</sub>, phénylène, phénylène-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-phényle, où le reste alkylène en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> divalent peut être non substitué ou substitué par un reste de la série alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, alcénylène en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, alcynyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>10</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> éventuellement substitué dans la partie aryle, hétéroaryle éventuellement substitué et hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle ;  
 40 D représente C(R<sup>2</sup>)(R<sup>3</sup>), N(R<sup>3</sup>) ou CH=C(R<sup>3</sup>) ;  
 E représente tétrazolylo, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O), HOS(O)<sub>2</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub> ou R<sup>10</sup>CO ;  
 R représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué ou hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, où les restes alkyle peuvent être substitués une ou plusieurs fois par le fluor ;  
 45 R<sup>0</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, bicycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>, bicycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, tricycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>, tricycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué, hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, CHO, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-CO, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-CO, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-CO, bicycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-CO, bicycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-CO, tricycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-CO, tricycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-CO, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-CO éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-CO éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryl-CO éventuellement substitué, hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-CO éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-S(O)<sub>n</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-S(O)<sub>n</sub>, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-S(O)<sub>n</sub>, bicycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-S(O)<sub>n</sub>, bicycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-S(O)<sub>n</sub>, tricycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-S(O)<sub>n</sub>, tricycloalkyle en C<sub>6</sub>-C<sub>12</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-S(O)<sub>n</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-S(O)<sub>n</sub> éventuellement

## EP 0 842 945 B1

substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-S(O)<sub>n</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryl-S(O)<sub>n</sub> éventuellement substitué, ou hétéroaryl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-S(O)<sub>n</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, où n représente 1 ou 2 ;

5 R<sup>1</sup> représente l'un des restes -S-R<sup>21</sup>, -S-S-R<sup>21</sup>, -S(O)-R<sup>22</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -S-OR<sup>21</sup>, -S(O)-OR<sup>21</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -S-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(O)-R<sup>21</sup>, -S-C(O)-OR<sup>22</sup>, -S-C(S)-SR<sup>22</sup>, -S-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -S-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(O)-R<sup>21</sup>, -O-C(S)-R<sup>21</sup>, -O-C(O)-OR<sup>22</sup>, -O-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O<sub>2</sub>)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)-OR<sup>21</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -O-S(O)-R<sup>22</sup>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -O-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -O-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>29</sup>)-C(O)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-OR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-SR<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-R<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-R<sup>22</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)<sub>2</sub>-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-S(O)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -N(R<sup>28</sup>)-P(O)(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(OR<sup>21</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>)<sub>2</sub>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-OR<sup>21</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, -P(O)(R<sup>22</sup>)<sub>2</sub>, -C(S)-R<sup>21</sup>, -C(S)-SR<sup>21</sup>, -C(S)-N(R<sup>21</sup>)-R<sup>28</sup>, cyano, halogène, nitro ou méthylènedioxy ou représente le reste d'un cycle hétérocyclique mono- ou polycyclique, saturé ou insaturé à 5 à 14 chaînons, éventuellement substitué, de formule



25 où

Q<sup>1</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O- ou -S- ;  
 Q<sup>2</sup> représente -S(O)- ou -S(O)<sub>2</sub>- ;  
 30 Q<sup>3</sup> représente -C(R<sup>21</sup>)<sub>2</sub>-, =C(R<sup>21</sup>)-, -N(R<sup>28</sup>)-, -O-, -S-, -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)-, où le cycle hétérocyclique peut être lié au groupe A par la liaison libre dans les groupes -C(R<sup>21</sup>)(-)- ou -N(-)- représentant Q<sup>3</sup> ou par un autre atome de carbone cyclique quelconque et où, quand le cycle hétérocyclique est lié à un système cyclique contenu dans le groupe A, le cycle hétérocyclique peut aussi être condensé au système cyclique dans le groupe A par deux atomes voisins ;  
 35 R<sup>2</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle ou cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> ;  
 R<sup>3</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, alcynyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>, alcényle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-carbonyle, alcynyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-carbonyle, pyridyle, R<sup>11</sup>NH, R<sup>4</sup>CO, COOR<sup>4</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>4</sup>, CONHR<sup>4</sup>, CSNHR<sup>4</sup>, COOR<sup>15</sup>, CON(CH<sub>3</sub>)R<sup>15</sup> ou CONHR<sup>15</sup> ;  
 40 R<sup>4</sup> représente l'hydrogène ou alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>28</sub>, qui peut éventuellement être substitué une ou plusieurs fois par des restes identiques ou différents de la série hydroxyle, hydroxycarbonyle, aminocarbonyle, mono- ou di(alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>)aminocarbonyle, aminoalkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>8</sub>-aminocarbonyle, aminoalkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-phényl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-aminocarbonyle, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-carbonylamino-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-phényl-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>-aminocarbonyle, alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-carbonylamino-alkyle en C<sub>2</sub>-C<sub>18</sub>-aminocarbonyle, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub>-carbonyle, qui peut aussi être substitué dans le reste aryle, amino, mercapto, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>-carbonyle, Het-CO, cycloalkyle en C<sub>3</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué, HOS(O)<sub>2</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, R<sup>9</sup>NHS(O)<sub>2</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, (R<sup>8</sup>O)<sub>2</sub>P(O)-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, tétrazoly-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>3</sub>, halogène, nitro, trifluorométhyle et le reste R<sup>5</sup> ;  
 45 R<sup>5</sup> représente aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, un cycle hétérocyclique mono- ou bicyclique à 5 à 12 chaînons qui peut être aromatique, partiellement hydrogéné ou totalement hydrogéné, qui peut contenir 2 ou 3 hétéroatomes identiques ou différents de la série de l'azote, de l'oxygène et du soufre, un reste R<sup>6</sup> ou un reste R<sup>6</sup>CO-, où le reste aryle et, indépendamment de celui-ci, le reste hétérocyclique peuvent être substitués ou une plusieurs fois par des restes identiques ou différents de la série alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>18</sub>, halogène, nitro, amino ou trifluorométhyle ;  
 50 R<sup>6</sup> représente R<sup>7</sup>R<sup>8</sup>N, R<sup>7</sup>O ou R<sup>7</sup>S ou une chaîne latérale d'acide aminé, un reste naturel ou non naturel d'acide aminé, d'iminoacide, d'azaaminoacide N-alkylé par alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ou N-alkylé par aryle en C<sub>6</sub>-C<sub>14</sub>-alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>8</sub> ou un reste de dipeptide qui peut aussi être substitué dans la partie aryle et/ou dans lequel

**EP 0 842 945 B1**

		la liaison peptidique peut être réduite en -NH-CH <sub>2</sub> -, ainsi que leurs esters et amides, où l'hydrogène ou hydroxyméthyle peut éventuellement remplacer des groupes fonctionnels libres et/ou des groupes fonctionnels libres peuvent être protégés par des groupes protecteurs courants en chimie des peptides ;
5	R <sup>7</sup>	représente l'hydrogène, alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>18</sub> , aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>18</sub> -carbonyle, alcoxy en C <sub>1</sub> -C <sub>18</sub> -carbonyle, aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> -carbonyle, aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> -carbonyle ou aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>18</sub> -oxycarbonyle, où les groupes alkyle peuvent éventuellement être substitués par un groupe amino et/ou les restes aryle peuvent éventuellement être substitués une ou plusieurs fois, de préférence une fois, par des restes identiques ou différents de la série alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , alcoxy en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , halogène, nitro, amino et trifluorométhyle, un reste naturel ou non naturel d'acide aminé, d'iminoacide, d'azaaminoacide éventuellement N-alkylé par alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> ou N-alkylé par aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> ou un reste de dipeptide, qui peut aussi être substitué dans le reste aryle et/ou dans lequel la liaison peptidique peut être réduite en -NH-CH <sub>2</sub> - ;
10	R <sup>8</sup>	représente l'hydrogène, alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>18</sub> , aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> éventuellement substitué ou aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> qui peut aussi être substitué dans le reste aryle ;
15	R <sup>9</sup>	représente l'hydrogène, aminocarbonyle, alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>18</sub> -aminocarbonyle, cycloalkyle en C <sub>3</sub> -C <sub>8</sub> -aminocarbonyle, aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> -aminocarbonyle éventuellement substitué, alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>18</sub> , aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> éventuellement substitué ou cycloalkyle en C <sub>3</sub> -C <sub>8</sub> ;
20	R <sup>10</sup>	représente hydroxyle, alcoxy en C <sub>1</sub> -C <sub>18</sub> , aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> -alcoxy en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , qui peut aussi être substitué dans le reste aryle, aryloxy en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> éventuellement substitué, amino ou mono- ou di-(alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>18</sub> )-amino ;
	R <sup>11</sup>	représente l'hydrogène, R <sup>12a</sup> , R <sup>12a</sup> -CO, H-CO, R <sup>12a</sup> -O-CO, R <sup>12b</sup> -CO, R <sup>12b</sup> -CS, R <sup>12a</sup> -S(O) <sub>2</sub> ou R <sup>12b</sup> -S(O) <sub>2</sub> ;
	R <sup>12a</sup>	représente alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>18</sub> , alcényle en C <sub>2</sub> -C <sub>8</sub> , alcynyle en C <sub>2</sub> -C <sub>8</sub> , cycloalkyle en C <sub>3</sub> -C <sub>12</sub> , cycloalkyle en C <sub>3</sub> -C <sub>12</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué, hétéroaryl-alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle ou le reste R <sup>15</sup> ;
25	R <sup>12b</sup>	représente amino, di-(alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>18</sub> )amino ou R <sup>12a</sup> -NH ;
	R <sup>13</sup>	représente l'hydrogène, alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, cycloalkyle en C <sub>3</sub> -C <sub>8</sub> ou cycloalkyle en C <sub>3</sub> -C <sub>8</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> ;
30	R <sup>15</sup>	représente R <sup>16</sup> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> ou le reste R <sup>16</sup> ;
	R <sup>16</sup>	représente un reste bicyclique ou tricyclique à 6 à 24 chaînons qui est saturé ou partiellement insaturé et qui peut aussi contenir 1, 2, 3 ou 4 hétéroatomes identiques ou différents de la série de l'azote, de l'oxygène et du soufre et qui peut aussi être substitué par un ou plusieurs substituants identiques ou différents de la série alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>4</sub> et oxo ;
35	R <sup>21</sup>	représente l'hydrogène, alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , hydroxyalkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , alcényle en C <sub>2</sub> -C <sub>8</sub> , cycloalkyle en C <sub>3</sub> -C <sub>12</sub> , cycloalkyle en C <sub>3</sub> -C <sub>12</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué ou hétéroaryl-alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, où des restes alkyle peuvent être substitués une ou plusieurs fois par le fluor et les restes R <sup>21</sup> , quand ils apparaissent plusieurs fois, peuvent être identiques ou différents ;
40	R <sup>22</sup>	représente alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , hydroxyalkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , alcényle en C <sub>2</sub> -C <sub>8</sub> , cycloalkyle en C <sub>3</sub> -C <sub>12</sub> , cycloalkyle en C <sub>3</sub> -C <sub>12</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> éventuellement substitué, aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle, hétéroaryle éventuellement substitué ou hétéroaryl-alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste hétéroaryle, où des restes alkyle peuvent être substitués une ou plusieurs fois par le fluor et les restes R <sup>22</sup> , quand ils apparaissent plusieurs fois, peuvent être identiques ou différents ;
45	R <sup>28</sup>	représente l'un des restes R <sup>21</sup> -, R <sup>21</sup> N(R <sup>21</sup> )-, R <sup>21</sup> C(O)-, R <sup>22</sup> O-C(O)-, R <sup>21</sup> N(R <sup>21</sup> )-C(O)- ou R <sup>21</sup> N(R <sup>21</sup> )-C(=N(R <sup>21</sup> )) ;
50	R <sup>29</sup>	représente l'un des restes R <sup>22</sup> -, R <sup>21</sup> N(R <sup>21</sup> )-, R <sup>21</sup> C(O)-, R <sup>22</sup> O-C(O)-, R <sup>21</sup> N(R <sup>21</sup> )-C(O)- ou R <sup>21</sup> N(R <sup>21</sup> )-C(=N(R <sup>21</sup> )) ;
55	Het	représente le reste d'un hétérocycle monocyclique ou polycyclique à 5 à 10 chaînons lié par le biais d'un atome d'azote, qui peut être aromatique ou partiellement insaturé ou saturé et qui peut contenir 1, 2, 3 ou 4 hétéroatomes cycliques supplémentaires identiques ou différents de la série de l'oxygène, de l'azote et du soufre et qui peut éventuellement être substitué sur des atomes de carbone et sur des atomes d'azote cycliques supplémentaires, où des restes R <sup>h</sup> , R <sup>h</sup> CO ou R <sup>h</sup> O-CO identiques ou différents peuvent être situés comme substituants sur des atomes d'azote cycliques supplémentaires et R <sup>h</sup> représente l'hydrogène, alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , cycloalkyle en C <sub>3</sub> -C <sub>8</sub> , cycloalkyle en C <sub>3</sub> -C <sub>8</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> , aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> éventuellement substitué ou aryle en C <sub>6</sub> -C <sub>14</sub> -alkyle en C <sub>1</sub> -C <sub>8</sub> éventuellement substitué dans le reste aryle ;

**EP 0 842 945 B1**

b, c, d et f représentent indépendamment les uns des autres 0 ou 1 mais ne peuvent pas tous représenter simultanément 0 ;

e, g et h représentent indépendamment les uns des autres 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ;

sous toutes leurs formes stéréoisomériques et leurs mélanges en toutes proportions, ainsi que leurs sels physiologiquement acceptables ; destinés à être utilisés comme médicaments.

5

19. Composés de formule Ib selon la revendication 18 et/ou leurs sels physiologiquement acceptables comme agents pour inhiber les inflammations.

10

20. Utilisation de composés de formule Ib selon la revendication 18 et/ou de leurs sels physiologiquement acceptables pour la production de médicaments pour le traitement ou la prophylaxie de maladies dans lesquelles l'adhésion des leucocytes et/ou la migration des leucocytes présente une ampleur indésirable, ou de maladies dans lesquelles les processus d'adhésion dépendants de VLA-4 jouent un rôle.

15

21. Utilisation de composés de formule Ib selon la revendication 18 et/ou de leurs sels physiologiquement acceptables pour la production de médicaments pour le traitement ou la prophylaxie de la polyarthrite rhumatoïde, des affections intestinales inflammatoires non spécifiques, du lupus érythémateux aigu disséminé, des maladies inflammatoires du système nerveux central, de l'asthme, des allergies, des maladies cardiovasculaires, de l'artériosclérose, les resténoses, du diabète, pour éviter une lésion des greffes d'organes, pour inhiber la croissance tumorale ou les métastases tumorales, pour la thérapie de la malaria ou pour inhiber les inflammations.

20

22. Préparation pharmaceutique **caractérisée en ce qu'elle** contient un ou plusieurs composés de formule Ib selon la revendication 18 et/ou leurs sels physiologiquement acceptables ainsi que des supports et/ou additifs pharmaceutiquement irréprochables.

25

30

35

40

45

50

55